

· BIBLIOTECA ·
· LVCCHESI · PALLI ·



Grande Sala O. S. 8. VIII 13

III 8 VIII 13



DESCRIZIONE
DI GENOVA
E
DEL GENOVESATO

Se quel dettato, che affisso leggevasi sur una parete del tempio di Apollo in Delfo — *conosci te stesso* — è altissimo precetto di morale sapienza per li singoli uomini, egli non è men fecondo di politica utilità per le città, e per le nazioni. Infatti l'uomo, che fa sincera dissamina di sè non solo viene a conoscere le buone qualità, che ha, e quelle di cui è privo, ma ne è posto in grado di meglio usare le prime, e di acquistar le seconde. In somigliante guisa i popoli quando istituiscono così fatti esami non possono che sentirsi vivamente spinti a migliorare le facoltà loro, e a procurarsi quelle, che per avventura lor mancano, ed a supplirle in quanto possono, se dalla natura lor sono imperiosamente negate, o scarsamente impartite. Pertanto con sapiente consiglio le città

d'Italia, che nell'esultante lor seno accolsero gli Scienziati, che di ogni terra specialmente Italiana annualmente convengono per discorrere, e provvedere sul progresso delle discipline naturali ordinarono, onde presentarne gli Ospiti illustri, il ragguaglio delle proprie condizioni, tanto ricevute dalla natura, quanto dalle vicende succedutesi in esse, ed intorno ad esse. Ed invero quale più conveniente soggetto alle meditazioni dei saggi, e dotti intelletti, che il prospetto del suolo, dell'aria, delle acque, delle piante, e degli animali, vario, e dovizioso patrimonio dato dalla natura o meglio dalla Provvidenza a suoi figli Italiani, ove più, ove meno lodevolmente coltivato, ed accresciuto? Quale più vasto, e proprio argomento ad utili, e nobili studi, che la narrazione ordinata delle origini, delle accessioni, delle vicende religiose, civili, e guerriere, de' costumi, delle arti, delle scienze, dei commerci, delle peregrinazioni di ogni genere, delle varie opere erettesi ad utilità pubblica, e privata, a coltura di belle arti, o a testimonio di splendidi fatti, o di affezioni particolari? Così fatte cose, che sono la serie de' fasti dell'universa italica famiglia, fasti talor gloriosi, e talora dolenti, meritan tutte però di esser richiamate soventi volte alla mente, ed al cuore de' membri suoi. Tale fu al certo l'intendimento, con che sono state concepite, e disegnate le descrizioni infino ad or pubblicate. Per queste non solo i viaggiatori, che non hanno attitudine o inclinazione ad osservare, possono andarne istruiti degli oggetti, che

visitarono, effetto invero di sol che mediocre valore, ma i dotti, e diligenti visitatori ne hanno comodità nella quiete delle domestiche stanze, sciolti già dalle amorevoli prevenzioni dell'ospitalità, di richiamare al pensiero, e di sottoporre ad esame imparziale le cose, e i fatti, che visitando conobbero. Non pochi pure, che fur ritenuti dal recarsi alle Anfizioniche adunanze della dottrina Italiana, han modo di attingere dalle relazioni uscite in luce adatte nozioni locali, e prender parte così all'avanzamento delle scienze, e ad ogni altra inquisizione degli annuali dotti convegni.

Ma i risultamenti, che abbiamo enunciati riuscirebbero a vana pompa di amor patrio, od a sterile aumento della ricchezza scientifica, se il vero motore delle ricerche, e delle narrative, di che si compongono le relazioni mentovate, quello non fosse di rendere più vantaggiosa alla special gente, cui riguarda ciascuna relazione, la conoscenza delle proprie facoltà, dinotando l'uso migliore di esse, i danni, cui possono soggiacere, gli ostacoli, che incontrano sì nel loro impiego, come nel loro progresso, i mezzi infine di supplir quelle, di che in tutto, o in parte essa ha difetto. E non è men lodevole intendimento ed anzi è migliore di assai quello di attemperare l'utilità particolare alla pubblica, facendo scala del ben essere della gente, che si descrive, a quello dell'intero popolo italiano. Nè all'utilità fisica, e morale si arresti chi le speciali notizie raccoglie, ed espone, ma intanto che

prende a porre insieme i pregi, e le memorie onorate di quel ramo di che egli è nato, renda l'intento suo più puro, ed eletto volgendo i pregi particolari a splendore, ed a lode dell'universa famiglia, e non si adonti se alcun ramo, o molti pure superino il suo d'illustrazione, e dove che sia, di merito ancora, pensando, che è merito, ed illustrazion di fratelli, e che la propria gente può in futuro salire alla sua volta in fama maggiore, e, quel che più monta, può maggiormente avanzare in valore, e virtù, salvo che l'occasione, o meglio Iddio dia poi il potere, e la gloria. Somigliantemente chi legge quelle relazioni, astengasi dal giudicare siccome compiacenza di un orgoglio distrettuale l'esposizione delle cose, e de' fatti lodati, ma ritengala siccome atto di filiale pietà intesa a crescere preziosità, e bellezza alla corona della grande itala Madre.

Ed ecco ciò che i Genovesi per questa solenne occasione recano in mezzo, siccome loro parte al tesoro intellettuale della nazione Italiana.

Dopo avere additati i termini piantati dalla natura al lembo marittimo della Italia settentrionale, che correndo da ponente a levante presenta al mediterraneo l'arcata fronte, al vago, ed odorifero paese chiuso tra il Varo, il mar, la Macra, e il monte, si descrive la sotterranea struttura del suolo, la diversa formazione de' suoi strati, o terreni, le reliquie vegetabili, ed animali, che racchiude la sostanza delle sue rocce, la configurazione della sua

superficie, e de' suoi rilievi, la condizion delle terre di coltura, il corso, e la proprietà delle acque che lo frastagliano, la diversa profondità del mare che lo bagna, la qualità dell'aria, la serie delle vicende atmosferiche, infine la multiforme influenza di quel fluido, se pure è, o se è uno, che percorrendo l'aria, e la terra, per lo più tacito, ed invisibile, ma talor prorompendo a subiti tremendi impeti di luce, e di suono, produce pur sempre per l'attento osservatore mirabili svariati fenomeni.

Lasciati quindi gli oggetti naturali che non hanno, o non appalesan organi, si rassegnano gli organizzati. Questi così fatti oggetti vegetabili, ed animali non assumon tra noi aspetto singolare, o molto diverso da quello che hanno nella circostante Italia. Alcuni pesci però, e parecchi altri minori abitanti delle acque sembrano aver caratteri particolari. La Flora nostra ha copiosi, e varj soggetti di belle forme, di vago colore, di grato odore, e ne procedono frutti di squisito gusto, e di uso, e profitto qual si può desiderare. Pure benchè arricchita più volte di doni dalle più lontane sorelle non si discosta gran fatto dalle finitime. Non pertanto si dà di ciascuna parte dei regni vegetabile, ed animale speciale elenco, onde chi attende a questi studj scerna quello, che gli parrà degno di considerazione.

Compimento della natura organizzata è, e per certo sel reputa, l'uomo. Ma la *parte divina*, che *in cima siede* della sua *natura* anzi che la sua struttura migliore som-

ministra argomento lungo, e diverso alla terza divisione del nostro lavoro. Come fu abitato il nostro suolo, come l'uomo il ridusse alla coltura, come egli poi si resse, si difese, aggregò altri a sè, come si attemperò a religione, a governo, ad istruzione, come si addestrò ad arti, a negozj, a navigazioni, come si estese a colonie, ad acquisti, a conquiste, come poi obbedendo alla legge delle cose mortali decrebbe, fu perdente, mutò sorti, quale ora egli è, quale può essere, quale sotto gli auspicii di sapiente, e generoso Monarca dee venire, se non manca a se stesso, così vario, e vasto subbietto richiedeva, ed ottenne lunga, e diversa trattazione.

Infine i monumenti, sian dessi innalzati per rendere omaggio alla religione, per celebrare il valore guerriero o la migliore saviezza, che pose leggi, e le mantenne, e fermò paci, ed alleanze, o per provvedere alla pubblica, ed alla privata utilità, o veramente siano non inerti nè ignobili ozj fatti alle belle arti da cuor generosi, formano il quarto, ed ultimo ripartimento della nostra descrizione. Primo di tempo per noi tra i lavori delle arti, come primo tra i documenti della nostra storia è per certo l'iscrizione scolpita in rame sotto il consolato di L. Cecilio Metello detto il *Diademato* e di Q. Muzio Scevola il Giureconsulto, cioè l'anno 637 di Roma, e 117 anni avanti l'era volgare. Essa, la qual contiene l'arbitrato di due delegati del Senato Romano per decidere un litigio sorto tra piccoli popoli vicini a Genova, prova, che questa era centro,

e capo di tali popoli, poichè ne risulta, che ivi serbavasi il pubblico erario, e forse eraivi pure il tribunale, e le carceri. L'estrinseca parte, quella, che interessa le arti, cioè a dire il taglio, e la forma delle lettere, senza essere al tutto rozza dimostra però l'antichità del monumento. Nè in diversa condizione ne è la lingua, e l'ortografia, sebbene a que' giorni fosse già vissuto chi a giudizio di alcuni eruditi a Cicerone solo cede la palma dell'eleganza latina. Benchè gli altri monumenti e le produzioni delle belle arti, che si ricordan di poi, non siano saliti in isplendida fama, come è avvenuto di altri di simil genere, che si ammirano in altre città e provincie, o perchè quelli non furono avvertiti, o bene apprezzati da scrittori dotati di perizia tecnica, e di fine gusto, o perchè tra noi si fatti scrittori non hanno acquistato un'estesa rinomanza, pure nè pochi sono, nè ristretti a breve età, nè immeritevoli di lode, e di durevol memoria. Ma la fortuna ha pur dominio sulle celebrità, ed ancora, o piuttosto l'uomo non sa molte volte dar buona ragione di alcuni fatti contraddittorj che ha pur sotto gli occhi frequentemente.

Noi confidiamo, che torneranno gradite, ed utili le notizie, che son raccolte nelle due prime parti, come quelle, che riguardano immediatamente lo studio della natura, e non men quelle della terza, che concernono specialmente l'uomo, non solo per quel detto — *Homo sum, nihil humani a me alienum puto* — ma perciocchè ancora, secondo che già abbiamo indicato, la cognizione

dell'uomo è il vero compimento dello studio della natura, siccome ne è lo scopo. Ma giusta singolare estimazione de' saggi, e dotti lettori, a cui per decreto del Comune nostro renduto autorevole, ed altamente solenne dall' approvazione Reale sono specialmente dedicati questi volumi, ci muove a credere, che non riuscirà loro mal gradita neppure la quarta, sì perchè ogni cosa, che si attiene all' umana intelligenza, ha stretto legame tra sè, sì perchè a' buoni, e sinceri amatori delle opere della natura debbe venire a grado la rappresentazione obbiettiva di queste, come pure delle altre opere con cui l' ingegno dell' uomo si studiò di render le prime più durevoli, più utili, o più apparenti.

Portiam poi ferma persuasione, che gli egregii cultori delle cognizioni naturali, storiche ed artistiche, i quali con solerzia, ed amore rispondendo arrendevoli all' invito onorato, che ad essi ne fecero i loro concittadini adunati in Congrega Municipale, posero mente, cuore, e mano al desiderato lavoro, saranno grandemente soddisfatti della durata nobil fatica, se dagli eletti accorrenti al ben augurato scientifico Consesso sarà giudicato, che per essa siasi in qualche parte accresciuta la facoltà, la dottrina, o l' illustrazione Italiana.

LA DEPUTAZIONE DECURIONALE.

La descrizione di Genova, e del Genovesato ha quattro parti distribuite in III volumi.

La prima parte riguarda la natura non organizzata.

La seconda la natura organica.

La terza l'uomo.

La quarta i monumenti, e le produzioni delle belle arti.

Le due prime parti formano il I. volume.

La terza il II.

E la quarta il III.

Il primo volume contiene inoltre la carta geologica della Liguria marittima, la carta idrobatica, o della profondità dell'acqua nel golfo di Genova, e n.º 9 tavole di oggetti vegetabili, ed animali.

Il secondo contiene la mappa, o carta topografica della città di Genova.

Il terzo contiene n.º 14 incisioni, o litografie di oggetti di arte, e monumenti.

Si sono graziosamente incaricati della prima parte il March. LORENZO PARETO, avendosi assunto per collaboratore il Prof. Cav. Sac. GIACOMO GARIBALDI, e dopo la morte di esso il D. Sac. FORTUNATO CIOCCA.

Della seconda parte il March. MASSIMILIANO SPINOLA sceltosi avendo per collaboratori

Il March. CARLO DURAZZO :

Il Prof. AGOSTINO SASSI

Il Prof. GIUSEPPE DENOTARIS

Ed il Sig. GIO. BATTA VERANY.

Della terza il Sig. March. CARLO PALLAVICINO, datisi per collaboratori i

Sigg. AVV. MICHELE GIUSEPPE CANALE
 AVV. EMANUELE CELESIA
 DOTT. DAVID CHIOSSONE
 GER. CAV. LUIGI ZENONE QUAGLIA
 GIUSEPPE PAPA
 DOTT. ETTORE COSTA
 PROF. ANGELO BO
 GIO. BATTA GANDOLFI di Cristoforo
 SOC. FRANCESCO POGGI
 AVV. PIETRO TORRE
 AVV. ANTONIO CAVERI
 AVV. NICOLÒ MAGIONCALDA
 GIACOMO CEVASCO

E della quarta il Sig. AVV. CAV. CRISTOFORO GANDOLFI, che per suoi collaboratori ha presi i

Sigg. AVV. MICHELE GIUSEPPE CANALE suddetto
 AVV. FEDERIGO ALIZERI
 March. FRANCESCO PALLAVICINO
 PITT. GIUSEPPE ISOLA
 PITT. GIUSEPPE FRASCHERI
 SCULT. GIO. BATTA CEVASCO
 SCULT. SANTO VARNI
 Archit. CAV. CELESTINO FOPPIANI
 DOTT. DAVID CHIOSSONE suddetto.

La carta geologica è stata tracciata dal March. LORENZO PARETO.

La carta idrostatica è stata disegnata, e procurata graziosamente dal Contr' Ammiraglio Maggiore Generale CAV. D. GIUSEPPE ALBINI.

E la carta topografica della Città è opera pur graziosa del Sig. Architetto Ingegnere CAV. CELESTINO FOPPIANI.

La cura della stampa delle due parti scientifiche è stata affidata alla gentile diligenza del Sig. Ab. GIUSEPPE OLIVIERI Bibliotecario Supplimentario nella libreria della Città, e Maestro nelle Pubbliche Scuole.

Il Sig. AVVOCATO MICHELE GIUSEPPE CANALE benemerito collaboratore nella terza, e quarta parte ha pur dato assidue cure alla compilazione, ed alla stampa delle notizie che compongono queste due parti.

PARTE PRIMA

TOPOGRAFIA E IDROGRAFIA

Sulla giogaia che ad ostro si prolunga del monte Viso, sta una vetta di forma piramidale le cui facce inviano acqua a tre diversi bacini: da Maestro a quello della Duranza, affluente del Rodano, da Greco a quello della Stura o dell'Adriatico, da mezzogiorno a quello della Tinea o del Varo. Gli spigoli di questa piramide si legano al vertice di tre catene di monti diversamente dirette; al Nord alle Alpi, a ponente ai monti della Provenza, all'Est alla giogaia che va a formare il dorso di tutta l'Italia, all'Apennino cioè, di cui puossi ragionevolmente fissare l'origine a questa vetta, chiamata del Lauzanier, di preferenza a qualunque altro punto che piacque ai geografi d'indicare. Quanto a levante di questo monte piove sulla catena che se ne diparte, da un lato per lungo corso all'Adriatico, dall'altro per brevissimo al Mediterraneo si divalla. Ripido è il pendio da questa parte, lungo e più declive dall'altra. Una stretta zona di terra da mezzogiorno sta tra il mare e il sommo vertice, e questa zona limitata dal Varo e dalla Magra, è la Liguria marittima.

Pertanto i confini di questa sono da tramontana il sinuoso vertice dell'Apennino dalle sorgenti della Tinea a quelle della Magra. A ponente il corso della Tinea fino al suo confluyente col Varo, e quindi

questo fiume fluo alla sua imboccatura nel mare. Da mezzogiorno il Mediterraneo, e da levante finalmente il corso tutto della Magra.

Questa zona di terra disposta quasi come un semicircolo, nel suo incurvarsi abbraccia il Golfo di Genova, e colla parte sua più meridionale toccando all'incirca il parallelo $43^{\circ} 59'$ raggiunge verso il N. il $44^{\circ} 33'$, mentre da ponente a levante si estende dal $4^{\circ} 32'$ al $7^{\circ} 30'$ di longitudine orientale dal meridiano di Parigi. Montuoso tutto questo tratto di paese e quasi costituito da perpetuo avvicinarsi di vallate e di catene secondarie, che si dipartono dalla principale giogaia e arrivano al mare, presenta però diverse conformazioni, e ora ne è l'aspetto assolutamente alpino, ora i monti non sollevandosi che ad una minore altezza, hanno forme meno ardite e sono più tondeggianti, ora quasi non sono più che colline i cui piedi vengono lambiti dal mare.

La catena centrale dell'Apenino ligure allo staccarsi dalle Alpi corre dapprima per circa 51 chilometri nella direzione del S. E. fino al Nord del villaggio d'Isola nella valle della Tinea. Le montagne che la compongono, e di cui le principali cime sono il *Pe' Brun* e la *Cima d'Orgias* che superano l'altitudine di 2500 metri, inviano dal lato meridionale le loro acque alla Tinea, che scorre ai loro piedi in una specie di valle longitudinale, mentre invece dalla parte di tramontana le mandano alla Stura per mezzo di varii affluenti che questo fiume riceve sulla sua destra.

Poco distante dal nominato villaggio d'Isola e da quello di S. Martin di Lantosca verso il colle di Molieres e la cima di *Frema Morta*, una lunga catena secondaria si diparte dalla giogaia principale verso il mezzogiorno e forma la separazione tra il bacino della Tinea e quello della Vesubia, siccome all'incirca allo stesso punto; ma verso il Nord si stacca un altro ramo, il quale forma la divisione tra il piovante della Stura e quello del Gesso.

Dopo questa specie di nodo la catena centrale cambia alquanto di direzione, camminando più decisamente verso l'Est, nel qual senso continua fino al di là del colle di Tenda; in questo tratto giunge essa alla massima sua altezza, superando il picco di Crapier e la cima della Maledetta sopra Entraigues i tre mila metri. Sul fianco settentrionale di questa vetta si mostrano alcuni ghiacciai non paragonabili però con quelli delle grandi Alpi. Si è poi da queste cime le quali sovrastano al Santuario della Madonna di Finestre in val

di Vesubia, che si stacca un contrafforte o sperone di gran dimensione ed è quello che dirigendosi verso mezzogiorno per le cime del monte Bego e di Raus, forma la separazione dei bacini del Varo e del Roia e colla sua biforcazione dà origine alla valle del Paglione che scende a Nizza.

A due chilometri all'incirca a levante di queste stesse punte, che veniamo di menzionare, e che hanno ai loro piedi i piccioli laghi di Vermasca, trovasi la cima della Biscia, alta circa due mila ottocento metri, la quale domina il passo del colle di Cornio, ossia colle di Tenda, il quale trovasi poco di là distante verso l'Est e che ha quasi 1800 metri di altitudine sopra il Mediterraneo. A levante di questo colle i monti si sostengono ancora ad una notevole elevazione, giacchè il monte Carsino, che è la punta principale di questo tratto della catena centrale, ha tuttavia un'altezza di circa 2684 metri.

Allato di questo monte, donde sul piovente Nord si separa l'alto masso delle Viosenne e del Pizzo d'Ormea, che da tutte le sue parti manda acqua mediamente o immediatamente al Tanaro e che giganteggia anco sopra la giojaia centrale, la linea di partizione tra il Mediterraneo e l'Adriatico piega, ma per brevissimo tratto, verso il S. S. E. prendendo poco dopo, cioè alle sorgenti dell'Aroschia, la direzione dell'Est, che cambia tosto in quella del N. E. la quale conserva fino alle spalle di Genova, seguendo così all'incirca i contorni del Golfo Ligustico, il quale dopo il capo Mele si addentra molto verso il Nord. Presso queste sorgenti dell'Aroschia, alle quali corrispondono sul piovente di tramontana quelle del Tanaro, la catena centrale si abbassa considerabilmente, giacchè le più alte punte, come Caprauna e monte Galet, non giungono più all'altitudine di mille ottocento metri, e i colli, come quelli di Nava e di S. Bernardo non sorpassano quella di 950 metri. Più lungi discende la rocca Barbena e monte Calvo a 1500 metri, e dopo Settepani si abbassa ancor maggiormente, giacchè il colle di Cadibona non supera i 460, e le punte che circondano il Barracone e monte Alto, poco da quel colle discoste ed alle spalle di Savona hanno appena un'altitudine media di 900 metri.

Dopo questo punto e le montagne basse di pian del Merlo, quelle un poco più alte di Cadiferé e il colle di S.^{ta} Giustina, si vede nuovamente un rialzo della catena, giacchè il masso dell'Armetta, della Beigua e del Faiallo, così nel suo vertice ravvicinato alle

sponde del Mediterraneo, giunge colle sue più alte cime a 1200 metri; i colli poi che a questo conseguono e che sono al N. di Voltri, si tengono tra i 390 e i 670 metri; siccome il masso di montagne che si trova subito dopo a levante di questi, cioè presso le sorgenti della Varennà e della Polcevera e a ponente della Bocchetta si alza nuovamente al colmo di Leco a 1080 metri. Al colle de' Giovi poi, ove passa l'attuale strada che conduce in Lombardia, avviene il massimo ribasso di questa parte dell'Apennino, giacchè questo passo supera di poco i 400 metri. Quivi la catena centrale subisce una leggiera inflessione verso l'Est e l'E. S. E. e dopo la Scofera continua a dirigersi, facendo bensì qualche sinuosità verso l'Est, fino alle sorgenti della Magra. Quanto poi all'elevazione di questa parte della catena ridiviene assai notevole, giacchè dopo il mentovato colle di Scofera, donde scende il torrente Bisagno che bagna le mura di Genova, le cime di *Lavagneura*, Licciorno, Ariona, monte Goto ec. si alzano dai 1000 ai 1700 metri, mentre che i colli frapposti non discendono mai al disotto degli 800 metri. Al di là poi dei limiti che ci siamo prefissi per questa descrizione, cioè al di là delle sorgenti della Magra e a levante del colle della Cisa, l'Apennino acquista un'altezza ancor maggiore e il suo vertice piegando più verso il S. E. forma nella Lunigiana il masso dei monti Orsaio e Camporaghena, non lungi dal punto ove si diparte la sì notevole appendice dei monti carraresi ossia Alpi Apuane.

L'aspetto di una catena di sì grande estensione qual'è l'Apennino Ligure, e formata come vedremo da un gran numero di rocce di diversa natura, deve necessariamente variare secondo i punti ove si osserva. Così nella parte occidentale in cui si trovano le massime altezze e ove dominano rocce che subiscono una particolare decomposizione, presenta l'aspetto delle Alpi: le cime si alzano in grandi piramidi difficilmente accessibili e di una configurazione imponente e maestosa. Progredendo verso levante i dossi de' monti si allungano e si deprimono, e non si vedono più se non che poche punte sorgere al disopra della linea delle altezze medie. Soltanto qualche cima composta di Serpentina, come la Penna, presenta l'aspetto di una piramide o guglia, oppure quello di grandi cupole, ma nude e scoscese e quasi sprovviste di vegetazione.

Quanto si è detto fin qui non concerne che la direzione e le altitudini del vertice, ossia della linea di partizione tra il Mediterraneo

e l'Adriatico; ma per dare un'idea esatta della topografia del paese è necessario di aggiungere qualche particolarità su quelle catene secondarie o speroni che si staccano dalla catena maestra, e i quali servono a loro vece di divisione tra i bacini dei vari torrenti che da questa si partono e vengono a sboccare nel mare Mediterraneo.

Il primo, cominciando da ponente, di questi speroni che abbia qualche importanza, si è quello che presso il colle di Molieres si stacca dalla catena centrale verso mezzogiorno, separando il corso della Tinea da quello della Vesubia. Esso si sostiene ad una notevole altezza alla sua origine sopra la Bollina e S. Dalmazzo il piano, e quindi abbassandosi di alcuo poco, viene poi a terminare assai ripidamente per mezzo delle alture di Clars e di Utele al confluente della Vesubia e del Varo: questo sperone o contrafforte è assai semplice e dà origine a pochissime diramazioni.

Più estesa assai e di maggiore importanza è la catena secondaria che s'incontra tosto progredendo verso levante, ed è quella che separa il bacino del Roia da quello del Varo. Questa si diparte dalla catena centrale a ponente del colle di Teuda alla punta di monte Crapier, e si sostiene ad un'altezza considerevole il monte Bego che ne fa parte, avendo quasi 2870 metri di altitudine. Questo sperone dopo aver corso direttamente a mezzogiorno fino alle sorgenti del torrente Bevera, si divide in varie diramazioni di minore importanza; una di queste, ed è la più orientale continuando a dirigersi al S. S. E., va a terminare al confluente della Bevera e del Roia; l'altra che serpeggia, per così dire, tra il Paglione e la Bevera, corre più direttamente verso mezzogiorno e va a finire sulle sponde del mare, al capo scosceso della Turbia, a quello di Saut l'Ospizio presso Nizza da un lato, e a Vintimiglia dall'altro: l'ultima la più occidentale è quella che trovasi tra il torrente Paglione e gli affluenti del Varo, e che termina nelle ridenti colline le quali estendonsi da Nizza all'imboccatura di questo fiume.

A levante del corso del Roia e sopra il borgo della Briga accanto al monte di Tanarello sulla catena centrale, si staccano altri due speroni, i quali sono separati tra di loro dalla valle dell'Argentina o fiume di Taggia; il più occidentale forma le montagne che trovansi a ponente di Triora, abbraccia l'origine della valle della Nervia e costeggia il corso del Roia fin dirimpetto a Vintimiglia. La sua direzione è all'incirca dal N. al S.; conserva desso un'assai

grande altezza. La suddivisione poi che se ne stacca e che trovasi a levante del corso della Nervia, anch'essa diretta come la precedente, viene a terminare al mare tra S. Remo e la Bordighiera. Il monte Ceppo alto 1650 metri ne è una delle punte più notevoli.

La più orientale poi delle due catene secondarie che abbiamo detto aver principio accanto alle sorgenti di Taggia, è quella che per mezzo delle sue diverse ramificazioni dà origine alle numerose valli, che si veggono scendere al mare dalla riva di Taggia fino ad Albenga. La massima sua lunghezza dai monti Tanarello e Frontero presso le contigue sorgenti del Tanaro e dell'Aroschia, fino al capo Mele e al capo S.^{ta} Croce, può essere all'incirca di 45 chilometri; assai alta nei punti che si avvicinano alla catena centrale, giacchè il *Corno di Vedona* che ne fa parte, ha 2000 metri, e il monte Grande ne ha 1400; si abbassa in seguito di molto accostandosi al mare. Essa costeggia a ponente il corso dell'Aroschia o del Centa. La sua principale direzione è dal N. O. al S. E. a cominciare dalla catena centrale fino a monte Grande; ma da questo punto fino ad Albenga la linea di partizione di acque tra il Centa e le molteplici valli che scendono direttamente al mare, segue più decisamente una direzione che si avvicina alla direzione dall'O. all'E.

A levante del colle di Nava situato verso le origini dell'Aroschia e per cui si passa dalla valle di questo fiume in quella del Tanaro si diparte un altro sperone, il quale seguita il corso del primo di questi fiumi, fino al punto in cui riceve il più grosso de' suoi influenti la Nervia; questo sperone è in generale di una minore altezza che il precedente, e segue una direzione parallela alla sua, almeno nella parte inferiore, cioè corre presso a poco anch'esso dall'Ovest all'Est.

Le diramazioni secondarie che s'incontrano dopo quella che abbiamo testè accennato, come sarebbero quelle del capo S.^{to} Spirito, della Capra Zoppa, e del capo Noli, quantunque si staccino dalla principale giogaia, hanno tutte una piccola estensione, giacchè il sommo vertice si accosta molto al mare.

Lo stesso accade di quasi tutti gli speroni che s'incontrano fin presso Genova, la loro lunghezza supera appena le cinque miglia: pertanto sarebbe inutile darne il nome e notarne i particolari. Quanto alla loro direzione si può dire per quelli che s'incontrano tra Albenga e Finale, che generalmente corrono dal N. O. al S. E., ma

quelli che si veggono da Savona a Genova ne hanno una più marcata dal N. N. E. al S. S. O.

Presso Genova e al N. di questa città, la catena centrale staccandosi un poco più dal mare, le diramazioni che se ne dipartono acquistano una tal qual maggiore importanza ed hanno anche una mediocre altezza; così accade del ramo del monte di Nostra Donna della Guardia alto quasi 820 metri, il quale si trova all'O. della valle della Polcevera, correndo nella direzione del S. S. O. al N. N. E.

Si è fra due rami di una simil catena secondaria o contrafforte che è fabbricata in anfiteatro la città di Genova la di cui latitudine è al Collegio di Marina 44.° 25' 4", e la longitudine orientale dal meridiano di Parigi 6.° 33' 8". La diramazione su cui siede, si stacca dalla catena centrale a ponente del monte Matallo, che domina il piano di Cretto all'altezza di 613 metri. Si abbassa questa alla lunga cresta che è sopra Pino e Torrazza, si rialza quindi considerabilmente andando verso mezzogiorno ai monti su cui sono situate le fortezze del Diamante e dei due Fratelli; si abbassa poi nuovamente, e infine si divide al forte dello Sperone in due rami, uno de' quali correndo verso il S. S. O. va a terminare al capo di Faro ove è posto il fanale o lanterna, l'altro piegando più verso il S. S. E. va a formare le ridenti colline di Carignano per terminare ai dirupi che si estendono a levante del porto sotto le batterie della Strega e della Cava.

Dopo questo sperone e fra le sorgenti del Bisagno e quelle della Lavagna, *la bella fumana che fra Sestri e Chiavari s'adima*, si stacca dal sommo vertice una nuova catena secondaria, la quale è notevole per le numerose sue suddivisioni. Dessa infatti dopo aver formato una specie di cresta non molto alta al suo punto di attacco presso Scofera e Bargagli, si slarga in seguito all'O. e all'E. per formare le montagne e le colline che si estendono per lo spazio di circa trenta miglia lungo il mare dalla foce del Bisagno sotto le mura di Genova fino a quella del fiume di Chiavari. Fra tutte le diramazioni subalterne che ne fan parte, la più importante è quella che costituisce alla sua estremità l'alto capo o monte di Portofino, che si avvanza sì pittorescamente nel mare a 14 miglia circa a levante della città. Questo ramo di monti invia le sue acque da un lato direttamente al mare, e dall'altro or nel Bisagno, or nella valle longitudinale della Fontanabuona ossia della Lavagna. La direzione di

questa catena quando non è ancor suddivisa è all'incirca dal N. al Sud; ma dopo la biforcazione una parte corre all' O. un poco al N. l'altra verso l' Est S. E.

Di un eguale aspetto, ma presentando ancor maggiori dimensioni, è finalmente la catena secondaria, che ha la sua origine tra le sorgenti della Vara e quelle della Sturla, uno dei rami del fiume di Chiavari, non lungi dal paese di Borzonasca. Questa catena assai semplice dapprima si estende aneb' essa notevolmente, giacchè di essa fan parte sopra una lunghezza di 60 chilometri le montagne della costa da Chiavari fluo al capo Corvo, punta che termina a levante il golfo della Spezia e non è lontana dall'imboccatura della Magra.

Questo sistema di monti nella sua parte occidentale invia le sue acque alla Sturla, in seguito verso il mezzogiorno direttamente al mare, prima come uelle vicinanze di Sestri per mezzo di torrenti che possono avere il corso di qualche miglia, e poi per mezzo di rivoli di brevissimo corso: quanto alla parte settentrionale e orientale della medesima catena, si è alla Vara, e in seguito alla Magra che paga il tributo delle sue acque.

La cresta di divisione di questa diramazione è dopo Sestri molto più accostata al mare che alla Vara; pertanto il pendio meridionale è molto ripido soprattutto verso lo Cinque Terre, ove gli scoscendimenti sono quasi verticali. Questi monti che separano così il corso della Vara dal Mediterraneo, si sollevano a 506 e più metri come al colle tra Piguone e Vernazza, e varii capi che ne fan parte hanno un' altezza niente minore. Del resto questo gruppo che forma la costa, non è profondamente incavato che dal golfo della Spezia il quale vi s' interna quasi lo spazio di tre leghe; la direzione di questo ramo di monti prendendola da Borzonasca, punto della sua origine fino al capo Corvo, è all' incirca O. N. O. E. S. E.

L'ultimo sperone che s'incontra, nei limiti che ci siamo assegnati, ma di minore importanza che i precedenti, si è quello che trovasi tra la Vara e la Magra: si stacca desso dalle vicinanze del monte Goto ed ha una lunghezza molto minore. Giacchè la prima parte del corso della Vara ha luogo in una valle longitudinale, e dal punto in cui questa diramazione si diparte, fino al confluyente dei due fiumi vi sono appena trenta chilometri: è desso nondimeno di assai notevole altezza, poichè il monte di Cornoviglio, che ne fa parte, giunge a circa 1190 metri.

Fiu qui siamo andati delineando quali direzioni e quali altezze abbiano le principali catene secondarie, che staccandosi dalla giogaia principale verso mezzogiorno, segnano le parti alte del rilievo del paese. Per conoscere poi appieno questo medesimo rilievo, fa d'uopo sapere quali siano le valli che si frappongono a queste catene, come si comportino, e all'incirca quali altitudini abbiano esse nelle diverse parti della loro lunghezza, affinchè quasi vi sia un confronto continuo tra la serie de' punti di massima altezza, e quelli di minima, che si trovano in una data regione. Ma siccome la descrizione delle vallate a riguardo delle loro altitudini e della loro direzione mal si disgiunge da quella dei fiumi o corsi di acque che le percorrono, così nel medesimo tempo accenneremo per quanto è possibile tutto quello che spetta al regime dei fiumi, o torrenti dai quali le vallate prendono il nome.

La valle della Tinca è la prima di cui ci tocca a favellare. Il fiume di questo nome nasce al colle di Pouriac, e ai piedi del monte del Lauzanier; piccolo ruscello durante lo spazio di una mezza lega è ingrossato al luogo detto *li Pras* da un torrente che viene a raggiungerlo dalla parte dell'O., corre in una profonda fenditura fino al disopra di S.^{to} Stefano; poco sopra a questa piccola città riceve sulla sua destra un affluente assai notevole, il quale scende dai monti che circondano il villaggio di S. Dalmazzo il selvatico. La direzione della Tinca fino all'Isola, è dal N. O. al S. E. all'incirca come quella della porzione di giogaia centrale, che vi corrisponde, e ai piedi della quale questo fiume ha preso il suo corso.

Fra il borgo di S.^{to} Stefano e il villaggio d'Isola, la Tinca riceve ancora sulla sua destra due grossi torrenti, che le vengono dalle montagne che separano il suo bacino da quello dell'alto Varo; ma sulla sinistra non è ingrossata che da rivi di un corso assai breve. Al detto villaggio d'Isola cambia essa alquanto di direzione piegando più verso il Sud; e dopo aver passato questo luogo, il suo corso è ingrossato da un torrente rapidissimo, che scende dalla catena centrale particolarmente dalla cima di Orgias e dal colle di Chatillon alto circa 2332 metri sopra il livello del mare. Più basso ancora a una lega sopra il paese di S. Salvatore riceve ugualmente sulla sinistra un altro affluente considerabile, il quale bagna il vallone di Molieres e scende dalle alture del colle di *Frema Morta* alto 2627 metri e dal colle di Molieres che fa parte della diramazione secon-

daria che separa le acque della Vesubia da quelle della Tinea. Alla sua giunzione col torrente di Molieres il letto del fiume è alto circa 666 metri sopra il Mediterraneo, e a S. Salvatore non è più alto che 485 metri. Presso quest'ultimo villaggio la Tinea riceve sulla destra il torrente Roubion, e più basso sulla sinistra le acque di Clans e di Torre, che scendono dai monti a levante della valle. Il corso di questo fiume, che ha circa 13 leghe di lunghezza, è molto rapido, poichè soprattutto nella parte superiore le sue acque si precipitano a modo di cascate in un letto ristrettissimo per mezzo a dirupi di una notevole altezza.

Il Varo in cui viene a perdersi la Tinea nasce fuori dei limiti della regione che ci siam prescritti di far conoscere; esso ha la sua sorgente ai piedi delle montagne di *Garret* sopra Astench. Ha un corso di circa 26 a 27 leghe; è diretto dapprima dal N. al Sud poi dall'O. all'E. fino al suo confluente colla Tinea, ove prende la direzione di quest'ultimo fiume, cioè da tramontana a mezzogiorno. Esso riceve sulla sua destra la Vaira e l'Esteron, e sulla sinistra il Cians, la Tinea, la Vesubia, e va a gettarsi nel Mediterraneo una lega circa a ponente della città di Nizza. Il suo letto nell'ultima parte del suo corso è molto esteso.

La Vesubia, altro degli affluenti del Varo, è formata alla sua origine da due grossi torrenti che si riuniscono sotto S. Martino di Lantosca, uno, il più orientale; chiamato la Vesubia, o il torrente del Vallon di Finestre, scende dal colle di questo nome alto 2487 metri, l'altro chiamato il Boreon viene dal N. O. Alla giunzione delle due sorgenti della Vesubia, sotto S. Martino, il suo letto è alto sul livello del mare circa 916 metri. Questo fiume vien poi ingrossato sulla sua sinistra dalla Gordolasca, e da altri torrenti che scendono dalla catena di monte Bego e di Raus, e dalla sua prolungazione. Diretto dapprima dal N. al S. il suo corso piega in seguito un poco più verso il S. O. Esso corre dapprima in mezzo a un letto assai largo da S. Martino fino a Lantosca, poi si addentra nelle gole profonde di Duranus e dei Gros, per andare a perdersi nel Varo, a tre chilometri circa sopra il paese di Rocchetta.

Dal Varo andando verso levante, tra questo fiume e il Roia non s'incontra valle di qualche importanza, se non che quella del Paglione, il quale ha la sua foce presso Nizza. Nasce questo torrente nelle diramazioni dello sperone, che separa la Vesubia dalla Bevera

affluente del Roia, ed è formato da due rami principali, il canale di Contes ed il Paglione propriamente detto; quest'ultimo passa a Lescarena, ove il suo letto è alto circa 366 metri sopra il livello del mare. Il suo corso è quasi di sei leghe diretto dal N. al S.

Il Roia che trovasi in seguito, e che ha la sua foce sotto le mura di Vintimiglia, è dopo il Varo e forse la Magra, il più grosso fiume della Liguria marittima; desso nasce dal piovante meridionale del colle di Cornio o di Tenda, e prima di giungere alla piccola città di questo nome, ha già ricevuto varii torrenti, fra gli altri uno di assai importanza detto il Rio freddo, il quale viene sulla sua sinistra, cioè da levante, dai monti Carsino e Bertrand. Il letto del Roia, dopo che le sue sorgenti sono riunite, cioè presso Tenda, è alto sul Mediterraneo metri 766; un poco più giù e presso S. Dalmazzo, riceve all'Est il torrente della Briga, formato dalle acque che scendono da quella porzione della catena centrale, la quale sull'altro piovante abbraccia le origini del Tanaro, e all'Ovest ossia sulla destra è ingrossato dalla Valancia, torrente di maggiore importanza, il quale si precipita dalle sommità di Vermasca e del monte Bego. Al confluente di questi due rami principali del Roia, il suo letto è alto ancora 637 metri sul livello del mare. Più sotto altri torrenti che scendono dai monti di Raus vengono a versare le loro acque in questo fiume. Dopo Tenda, il Roia corre in una ristrettissima valle a pareti verticali, in fondo a cui volge le sue acque di cascata in cascata. La strada maestra da Nizza a Torino, che ne rimonta il corso, per la ristrettezza dello spazio è stata talora scavata nella rocca o sostenuta da archi a fianco, e quasi sul fiume medesimo. Il suo letto si slarga in seguito alcun poco al Fontan, per restringersi nuovamente sotto la distrutta rocca o castello di Saorgio. Quivi il Roia sulla sua destra, è ingrossato da un importante torrente, che scorre il vallone di Cairos, e che scende dal colle di Raus, continuazione della catena di monte Bego; sulla sua sinistra poi ne riceve un altro, il quale viene dai monti di Toragio alle spalle di Triora, e delle sorgenti della Nervia; slargatasi nuovamente la valle del Roia presso la Giandola ove il livello sul mare ne è di 303 metri, si restringe nuovamente a Breglio, per non acquistare una larghezza un poco considerabile se non che a due leghe circa dalla sua foce. La direzione del corso di questo fiume, che è all'incirca dal N. al S. da Tenda a Breglio, piega alquanto verso il S. S. E. dopo questo villaggio. La

lunghezza totale poi del corso può essere di circa 30 chilometri. Il maggiore affluente del Roia è la Bevera, che nasce al vallone del Molinet, passa a Sospello, ove il suo letto è alto circa 347 metri, e dopo un corso di cinque o sei leghe diretto dal N. O. al S. E. entra nel Roia a quattro mila metri dalla sua imboccatura.

Al Roia seguita la Nervia, torrente di circa sette leghe di corso, il quale nasce al colle della Tanarda, corre all'incirca dal N. al S. e rinserrato dapprima in un letto angusto, sotto Pigna e Dolceacqua occupa poi un largo spazio ghiaioso, in cui si disperdono le sue acque, e ove vegetano robusti Nerii, in questa riviera di ponente indigeni e frequentissimi.

A differenza della Nervia, che ha le sue fonti in mezzo a diramazioni secondarie, l'Argentina o fiume di Taggia, che si guada presso la Riva, trae la sua origine dalla catena centrale, e in un punto ove sull'altra pendice scaturisce il Tanaro, e a poca distanza l'Aroschia, che scende ad Albenga e verso all'O. il torrente della Briga che va nel Roia. A Triora piccola città in mezzo ai monti, i due principali rami della fiumara di Taggia, l'uno detto Gerbonte l'altro Capriolo, sono riuniti, e il suo letto al punto di giunzione è alto circa 440 metri, mentre il monte che sovrasta a questo punto cioè il Frontero, è all'incirca elevato 2000 metri sopra il livello del mare. Il corso dell'Argentina è diretto dal N. al S. piegando un poco al S. E. e può avere in lunghezza, circa 19 chilometri. La superficie del bacino di questo fiume è circa 328 chilometri quadrati, e la sua pendenza in mezzo al suo corso è circa di 8 metri sopra duecento, e più basso si riduce a un metro sopra 150.

Dopo la foce dell'Argentina, per gran tratto, i torrenti che s'incontrano, non hanno la loro origine che nelle diramazioni secondarie, le quali si staccano dalla giogaia principale, e sono dessi poco riguardevoli. Quello fra questi che abbia un corso di maggior lunghezza si è l'Impero o torrente di Oneglia, il quale scende da monte Grande e percorre circa 18 chilometri per giungere al mare.

Il primo fiume poi che s'incontri il quale parta dal sommo vertice, si è il Centa o fiumara di Albenga. Due rami lo costituiscono; il più occidentale ossia l'Aroschia, e il più orientale la Nevia. Questi due rami si riuniscono nella pianura d'Albenga (massima tra le poche e picciolissime della Liguria marittima) e il confluente si fa all'incirca a due miglia superiormente alla città.

L'Aroschia nasce ai piedi di monte Frontero sulla catena centrale, passa alla Pieve d'Albenga percorrendo un letto molto ristretto; presso questa piccola città o borgo, chiamata anche Pieve del Tecco, la quale non è lontanissima dalle sorgenti dell'Aroschia, il letto del fiume è alto circa 250 metri sul Mediterraneo; quivi è ingrossato sulla sua sinistra da un torrente che scende da Caprauna e dalla giojaia principale, e più basso, ma sulla destra, dal torrente di Rezzo e inferiormente ancora da quello di Garlenda: entra quindi nella pianura ed è raggiunto dalla Nevia, prendendo allora il nome di Centa. La direzione del corso dell'Aroschia, e di quello del Centa, che ne è la prolungazione, è quasi dall'O. all'E. piegando un poco nel S. E.

Il suo pendio è ripidissimo dapprima, in seguito si riduce a otto o nove metri sopra duecento: nella pianura poi è molto minore; il letto del Centa nella massima sua larghezza giunge quasi a trecento metri.

La Nevia, la quale, come si è detto, si riunisce all'Aroschia poco sopra Albenga, scende dalle montagne di Caprauna, di Nasino e monte Galet e dal giogo di S. Bernardo, ed è formata da due rami principali, che si riuniscono al luogo detto Confiante. Il più occidentale ha il suo corso per certo tratto parallelo a quello dell'Aroschia, cioè dall'O. all'E., l'altro ramo invece, ossia il fiume di Zuccarello, è diretto più dal N. al S.; il letto di ambo questi torrenti è molto incassato e il pendio ripidissimo.

I torrenti che s'incontrano, passata l'imboccatura del Centa fino alle vicinanze di Genova, sono tutti di poca importanza, perchè di brevissimo corso, atteso che la catena centrale si accosta molto alle sponde del Mediterraneo; il più importante fra questi, quello almeno che ha un più lungo corso, è la Sansobbia, la quale scende dai monti dell'Armetta e di S.^{ta} Giustina, e sbocca in mare presso Albissola.

Il torrente che si valica sopra il ponte di Cornigliano, prima di giungere a Genova dalla parte di ponente, è la Polcevera, la quale è di qualche maggiore importanza che i corsi d'acqua, che si trovano per istrada da Albenga fino a Genova. Tre rami principali lo costituiscono, e si chiamano il fossato della Guardia all'O., la Verde in mezzo, e la Secca a levante. La Verde è il ramo principale, nasce a Cravasco sotto il monte Lecco, passa a Isoverde, ove prende il

suo nome, e s'ingrossa di alcuni rivi; rieeve quindi il fossato di S. Martino, e più basso, ma sulla sinistra, il Riccò. Al suo confluyente colla Seeca, il letto è alto circa metri 46 sul livello del mare.

Questo torrente nelle sue piene presenta un notevolc volume d'acqua; ma d'ordinario nell'estate è quasi sempre asciutto, o se conserva qualche filo di acqua, serve questa a mettere in moto le numerose ruote dei molini, o altri stabilimenti industriali, che si trovano sull'una e sull'altra delle sue sponde. Il corso della Polcevera può essere in linea retta di circa venti chilometri; quello della Verde è molto rapido, ma dopo la sua giunzione cogli altri rami, il pendio diventa men forte e la direzione è più decisamente dal N. al S. Il letto di questo torrente dapprima assai ristretto, si allarga in seguito, ed è molto esteso da Tèglia e Rivarolo, fino al mare.

L'altro dei torrenti, tra i quali è rinchiusa la città a levante della medesima, è il Bisagno, il quale nasce al colle della Scofera, e forma dapprima una valle longitudinale molto incassata e ristretta al luogo detto Schiena d'asino, ove si riuniscono i due principali rami di questo torrente cioè il Bargaglio e il canal di Viganego; il suo letto può essere alto circa 145 metri sopra il livello del mare. Si è in questo punto, che è stabilita la principal presa di acqua che alimenta il magnifico acquedotto, il quale sostenuto per arcate lungo le pendici della montagna e traversando per mezzo di altissimi ponti e di ben intesi sifoni le interposte valli, viene a fornir d'acqua la città di Genova. Il torrente Bisagno può avere all'incirca un corso di 20 chilometri, diretto dapprima dall'E. S. E. all'O. N. O., torce poi verso mezzogiorno al luogo detto Mulazzana, la sua valle diventando così perpendicolare alla catena dell'Apennino, mentre nella prima parte vi era parallela.

Da Genova fino a Chiavari, malgrado che s'incontrino per via molti fossati o torrenti, niuno ve ne ha di una tal quale importanza, e niuno che parta dalla catena centrale, tutti provenendo dalla catena secondaria, che all'altezza del monte di Lavagnola si stacca dall'Apennino e forma le diramazioni e catene, che sono lungo la costa da Genova a Chiavari.

Il primo fiume che s'incontra dopo quest'ultima città, è la Lavagna o fiumara di Chiavari. Tre rami principali la costituiscono, il più occidentale, ossia la Lavagna o fiume di Fontanabuona, la Sturka in mezzo, e l'ultimo a levante la Graveglia. Il primo di questi corsi

d'acqua ha le sue sorgenti accanto a quelle del Bisagno e percorre una valle longitudinale detta la Fontanabuona, la quale può avere circa 20 chilometri di lunghezza, e diretta come la catena centrale dall'O., pochi gradi al N. all'E., pochi gradi al Sud. Questa valle è separata dal mare dalla catena costiera di Rapallo e di Zoagli, e sulla sinistra è dominata dai monti di *Lavagnara*, *Acquapendente* e *Licciorno*, situati sulla catena centrale donde scendono i canali di *Neirone*, di *S. Vincenzo*, di *Lorsega*, i quali somministrano la maggior parte dell'acqua onde è ricca la Lavagna.

Il ramo di mezzo componente la fiumara di Chiavari è, come abbiamo detto, la Sturla; scende questa dai monti di Borzonasca, cioè dal gruppo del colle di Bozzale e dall'Ariona, massiccio di monti notevolissimo nell'Appennino Ligure, perchè forse nella riviera di levante il più alto, comprendendo i monti di Mozzolasca e della Penna, donde hanno sorgente sul versante N. varii rimarchevoli corsi di acque come l'Aveto, la Nura, il Ceno e soprattutto il Taro. Ora la Sturla corre dal N. al S., si giunge alla più piccola Graveglia che viene dall'E. e colla Lavagna di cui prende il nome a Carasco, e di là dopo poche miglia va a sboccare nel Mediterraneo tra la città di Chiavari e il grosso borgo di Lavagna.

Da questo paese fino all'imboccatura della Magra i torrenti tutti che s'incontrano lungo la costa scendono dalla rimarchevole diramazione dell'Appennino, che staccasi dalla catena centrale al monte di Satta presso Borzonasca, e viene per monti di S. Bernardo, di Poreile, quelli di colle di Velva, Bracco, monti sopra levante, monte Rosso ec. a formare la catena che sta sopra i paesi di Lavagna, Sestri e sopra le Cinque Terre; ora questi torrenti hanno tutti poca importanza e assai breve corso; il maggiore tra loro è la Casarza che si getta in mare dopo aver traversato le pittoresche gole di Trigoso.

La Magra, fiume più considerabile della Liguria, che solo è pareggiato dal Roia e superato dal Varo, ne segna come quest'ultimo un de' confini. Esso è composto della Magra propriamente detta, e della Vara suo affluente: Di quest'ultima, come più occidentale, ci occuperemo dapprima.

La Vara nasce alle spalle dei monti di Borzonasca e particolarmente al monte di Satta, il quale si trova presso la catena centrale, corre dall'O. all'E. qualche grado al Sud; ai piedi di questa catena

fino a Varese ove il suo letto è alto circa 566 metri sopra il livello del mare, quivi piega per breve tratto al Sud fino a S. Pietro di Vara, e quindi riprende il suo corso nel senso dell'E. S. E. fino al suo confluyente colla Magra. Varii torrenti vengono ad ingrossare la Vara, tanto sulla destra che sulla sinistra; dalla prima parte i principali sono la Borsa, la Torsa, il Trano, la Malacqua e il Riccò, i quali due ultimi scendono dalla catena de' monti che dominano le Cinque Terre. Sulla sinistra riceve il torrente delle Cento Croci, la Caranza, la Gotra, la Mangia e la Cravignola, torrenti i primi dei quali scendono dalla catena centrale, mentre gli ultimi hanno origine nel contrafforte che fiancheggia a ponente la Magra. Il corso della Vara fino al suo confluyente può avere all'incirca 56 chilometri di lunghezza, il suo letto è in generale assai ristretto, ma si slarga in alcuni punti in ispecial modo prima del suo confluyente.

La Magra nasce ai piedi del colle della Cisa e di monte Orsaino al N. di Pontremoli; presso questa città riceve sulla destra il Verde che viene da monte Goto, e più basso è ingrossata sempre dalla stessa parte dalla Gordana e dalla Teglia, e finalmente a Ceparana è raggiunta dalla Vara. Sulla sinistra invece è alimentata dai torrenti che scendono da monte Aento, dal colle dell'Ospitale, da Camporaghena, e da parte delle Alpi di Carrara; i principali sono il Caprio, la Mangiola, il Tavarone e l'Aulella, composta del Rosaro e del torrente che scende da Equi chiamato il Lucido. Il corso della Magra può avere circa 56 a 57 chilometri di lunghezza. Può considerarsi come diretto dal N. al Sud dalle sorgenti fino al confluyente colla Vara, ove piega un poco più verso il S. E. Il letto di questo fiume dopo la riunione è estesissimo e le sue piene sono molto considerabili.

Il modo in cui abbiamo fin qui esaminato la topografia della Liguria marittima, è quello generalmente usato dai geografi nelle descrizioni di un paese; ma sebbene dia questo un'idea assai esatta del terreno, quando si scenda a molti minuti particolari, pure non è capace di fornire una rappresentazione soddisfacente del paese medesimo, se alla descrizione data dei contrafforti e delle valli interposte non si aggiunga, per così dire, una veduta generale che faccia capire come gli accidenti del terreno siano in relazione tra loro, e nel considerare lo stato attuale dei medesimi, non si cerchino i vestigi di quello che potevano essere dapprima, e in certo modo non si vada indicando e segregando le impronte, talora quasi obli-

terate, che le diverse rivoluzioni del globo hanno stampato a varie riprese sur un dato tratto di una regione. Ma non potendo questo nuovo modo di considerare il terreno sempre attenersi all'esame di un tratto di paese ristretto dentro gli attuali confini, e legato all'attuale stato di una porzione della catena, per poter dir qualche cosa che soddisfaccia, è necessario nel nostro caso non restringersi ai confini della Liguria marittima, e fa di mestieri trapassare ben sovente al di là della catena centrale, giacchè alla formazione del rilievo attuale concorsero fenomeni ch'ebbero la loro sede e da una parte e dall'altra della medesima, e fatti osservati sopra uno de' piovanti non hanno il loro complemento e talvolta la loro spiegazione che da fenomeni constatati sul versante opposto. Pertanto anco della parte dell'Apennino che sta sul pendio dell'Adriatico conviene far qualche parola, e intraprendendo un esame di ambi i piovanti sotto questo aspetto, in due grandi divisioni o gruppi è conveniente considerare l'Apennino ligure come bipartito, cioè in un gruppo occidentale, e in un gruppo orientale. Il primo dallo staccarsi delle Alpi, con cui ha più analogia, fino alle vicinanze di Savona può dirsi esteso. L'altro dai monti delle vicinanze di questa città fino a quelli della Lunigiana e alle Alpi carraresi si estenderebbe.

Quando si è sopra una delle punte più alte e più centrali della porzione della giogaia principale che si estende dal colle di Pouriaie alle vicinanze del colle di Tenda, da qualunque lato si girino gli sguardi si vedono a diverse distanze delle punte di montagne, che volgono i loro scoscardimenti verso l'osservatore, mentre i loro piani di più dolce inclinazione pendono generalmente ed estendonsi verso l'esterno. Quindi più lontano ancora, si vedono altre punte nella medesima disposizione, e subito viene l'idea di essere nel centro di una specie di gran circo, più o meno ellittico, di cui quelle sommità disposte a scaglioni formino le esterne e quasi concentriche circonferenze; infatti pare che questa porzione di montagne possa considerarsi come un grande massiccio ellittico, la cui catena centrale occupa all'incirca il grande asse, e la serie di punte più lontane formi la circonferenza di questo circo, che estendesi dal colle di Pouriaie alle vicinanze della cima della Biscia. Una porzione di esso, la meridionale, è bensì compresa nei limiti della Liguria marittima; ma l'altra invece è nel versante Nord: così fanno parte di questo grande circo i monti che da S. Dalmazzo vanno a S. Salva-

tore, quelli che da questo paese vanno a riunirsi alle alture che sono a mezzogiorno di S. Martino, e quindi il monte Bego e la Biscia, e sulla parte Nord le montagne, che da Entraigues vanno a Valdieri, e quindi verso Demonte e Viadito.

Un altro gran circo ellittico più allungato, ma comprendendo monti che si ergono a minore altezza, può considerarsi come posto quasi parallelamente e a poca distanza del precedente; ma disposto a modo di scaglione con esso. L'asse di questo secondo circo passerebbe pei monti, che sono nella valle del Pesio o alla Bresimauda, continuerebbe venendo verso levante pei monti di Frabosa, quindi pel Pizzo Mindin sopra Garesio, i monti della valle di Bormida occidentale, quelli di Settepani, i monti dietro Savona, e quelli che giungono al mare ad Albissola. L'asse di questo circo diretto all'incirca dall'O. pochi gradi al N. all'E., pochi gradi al Sud, taglia obliquamente la catena centrale nei monti alle spalle di Savona e Albissola.

I monti al N. O. al N. e all'Est del colle di Tenda, il Vaccarile superiore in val di Pesio, il Carsino, le montagne all'origine della val di Casotto, monte Galet, Rocca Barbena, monte Calvo, questi ultimi sulla catena centrale, e infine i monti sopra il capo Noli, formerebbero parte della zona meridionale di questo massiccio ellittico, cosicchè di questa zona nella Liguria marittima soltanto la parte che guarda verso mezzogiorno levante verrebbe ad essere compresa.

Nell'intervallo tra i due massicci, i cui grandi assi possono considerarsi come linee di sollevamento, le montagne sono disposte in modo che mostrano aver talora sentita l'influenza dei due movimenti. Nel medesimo intervallo pure vi sarebbero anco uno o due punti di altro particolare sollevamento, come sarebbe il Pizzo d'Ormea sulla sinistra del Tanaro, nel cui circo sarebbe compreso, come faciente parte della zona esterna, il monte di Caprauna sulla catena centrale a destra del detto fiume.

Accanto anche al primo dei massi ellittici, di cui abbiamo parlato, ma più verso il S. O. sempre nella regione di cui stiamo descrivendo la topografia, evvi anco porzione di un altro circo di questo genere, e ad esso appartengono le montagne immediate a Nizza, le quali sembrano far parte di un altro massiccio ellittico, di cui la parte centrale trovasi nel dipartimento del Varo, ed in specie nelle montagne, composte di rocce cristalline, dette *les Maures*, che da

Cannes vanno fin quasi a Tolone; infatti ponendovi ben mente si vede che, non tenuto conto delle posteriori mutazioni, in generale gli scoscendimenti di questa parte della costa, sono rivolti a mezzogiorno o meglio a Libeccio, dimostrando con ciò che quelle montagne si adagiano, o meglio hanno ricevuto un impulso di sollevamento da quella parte.

Ma tornando al secondo gran circo, che è quello a cui appartengono i monti di val di Bormida e delle vicinanze di Savona, la parte sua settentrionale non concorrerebbe che in brevissimi punti a costituire parte del suolo della Liguria marittima, potendo soltanto appartenere a questa zona alena picciola porzione dei monti che da Varagine e Albissola corrono verso la valle dell'Erro. E queste tracce di monti appartenenti a detto sistema, sono ancor rese, per così dire, meno riconoscibili dagli sconvolgimenti posteriori, che altri sistemi di catene dirette in senso diverso vi hanno eagonato. Verso questo punto infatti, la serie delle alture prende una direzione che corre più decisamente dal Sud al N. mentre le cime di cui abbiamo precedentemente favellato, almeno quelle che dipendono dal massiccio, in ispecial modo della val di Bormida, sono di preferenza allineate dall'O. qualche grado al N. all'E., qualche grado al Sud.

È da notare anco, che in questo punto ove per così dire cessa l'influenza dei due massicci neotovati, e che può dirsi in ispecial modo corrispondere all'estremità orientale del secondo dei detti massicci, esiste una delle massime depressioni dell'Apennino, e un tempo doveva essere il punto di comunicazione tra i due bacini Mediterraneo ed Adriatico, e quasi uno stretto di mare tra il gruppo occidentale, che or ora abbiamo descritto, e l'orientale di cui abbiamo adesso a far cenno.

Le montagne sopra Arenzano e sopra Voltri, le quali fan parte della giogaia centrale, riunite ad altre che corrono verso le sorgenti della Stura e della Polcevera, formano una serie di alture dirette all'incirca S. S. O., N. N. E. e possono dirsi intermedie tra il gruppo occidentale ove, come abbiamo indicato, regna le direzioni O., pochi gradi al N. e E., pochi gradi al Sud, e il gruppo orientale ove esiste un diverso intersecarsi di direzioni.

In questo secondo gruppo, se ne toglie un punto estremo dell'orientale riviera, non puoi ravvisare quelle disposizioni orografiche, che presentano serie di altezze disposte simmetricamente intorno ad un

asse centrale; ma qua invece ravvisi delle catene, ossia serie di altezze perpendicolari alla catena centrale, o di partizione di acqua, mentre nel massiccio medesimo ne hai altre ad essa parallele, siccome soprattutto hai delle valli che si trovano come essa dirette.

Se dalle alture che trovansi presso Genova, o immediatamente a ponente di essa, ti volgi verso levante, vedi chiaramente una serie di sommità, che cominciando al mare sembra traversare all'incirca perpendicolarmente la direzione della catena centrale e continuare così verso la Lombardia, andando a morire quasi sulle sponde del Po. Queste alture dirette dal S. S. O. al N. N. E. sono i monti di Fascie, quelli sopra Montobbio e Torriglia, la catena d'Antola, i monti del Chiappo e Giarolo, il Penice e sue diramazioni nelle colline verso Zavatarello, e alle spalle della Stradella; su questa catena in cui sono vari punti, che superano l'altitudine di 1600 metri e che è diretta come abbiain detto S. S. O., N. N. E. esistono delle specie di nodi o rialzi, ove vedi delle porzioni dirette O. qualche gradi al N. all'E., qualche gradi al S., e a questi corrispondono le maggiori altitudini siccome spesso vi corrispondono, e sono con questi rialzi allineate altre serie di alture o catene parziali, dirette in quest'ultimo senso. Onde diresti che la porzione del gruppo orientale dell'Appennino ligure, la quale si accosta più a Genova, sia formata da un intersecarsi di valli e di piccole catene, alcune correuti S. S. O., N. N. E. e altre O. all'E. pochi gradi verso il Sud, e questo tanto più può dirsi quanto che paralleli alla catena dell'Antola vi sono alcuni piccioli rami verso il Portofino e nei monti di S. Oberto.

La parte poi di questo gruppo orientale che più si allontana da Genova, lascia in general travedere, che predomina il sistema dall'O. all'E. Vi è però una serie notevole di alture dirette S. S. O., N. N. E. presso Sestri di levante e le sorgenti della Vara, mentre più in là, cioè fin quasi alla Nagra, il sistema dell'O. all'E., qualche grado al Sud, riprende la sua importanza. In questo gruppo orientale poi, soprattutto nella parte marittima, le grandi valli sono longitudinali e non è che per brevi fenditure a traverso le catene dirette nel medesimo senso, che verso il finire del loro corso prendono il carattere di valli trasversali, e così si avviano al loro sbocco in mare. Nel piovante settentrionale poi, e al di là di una catena secondaria che fiancheggia parallelamente alla medesima la catena centrale, vi sono però molte valli trasversali come, per esempio, sono tutte quelle

che partendo dai monti al N. della valle del Ceno, influente del Taro, vanno a sboccare direttamente nel Po. In questa parte l'Apennino acquista una molto maggiore larghezza di quella, ch'esso abbia nella parte intermedia ai due gruppi, ove, per così dire, si riduce ad un paese montuoso di qualche miglia di estensione, che si può traversare in poche ore per una strada, che mette in contatto il punto più Nord del Mediterraneo, con una delle porzioni della pianura della valle del Po, la quale si avvanza più a mezzogiorno e forma quasi una specie di golfo tra le colline del Monferrato, dipendenze del gruppo occidentale dell'Apennino e le colline del Tortonese, che stanno ai piedi occidentali della catena dell'Antola e perciò possono dirsi dipendenza del gruppo orientale dell'Apennino ligure.

Nel descrivere, siccome abbiamo fatto fin qui, i due gruppi dell'Apennino ligure per riguardo alla disposizione dei massi principali onde sono composti, ci siamo limitati a notare soltanto i preecipui accidenti del terreno, e in generale si è fatta astrazione dalle modificazioni di minore importanza; non sono però queste da tacersi tutte, perchè concorrono a costituire l'attuale fisionomia del paese e sono indizi dei varii movimenti che può avere sofferto il suolo in epoche remote; così nella parte occidentale si osserva, che allo sbocco delle grandi e principali valli i di cui fianchi sono costituiti dai terreni secondarii, esistono delle serie di collinette di una formazione più recente, e che indicano qual frastagliamento diverso alquanto dell'attuale avesse la costa in questi luoghi. Si osserva ancora nella parte più ravvicinata a Savona e a Genova, che sebbene la disposizione dei massi centrali sia dall'O. all'E., porzione della gioiata principale e dei contrafforti è invece diretta S. S. O. N. N. E., cosicchè si vede che vi è stato un movimento posteriore il quale ha determinato quel rialzo e quella direzione.

Si può notare anco nelle vicinanze di Arenzano una specie di depressione, la quale diretta dall'O. all'E. rimontando un poco nel N. fa credere che il movimento comparativamente recente, che hanno sofferto le Alpi orientali, forse si è fatto pur sentire in queste parti; la qual opinione può anche essere convalidata dall'osservazione, che il terreno deposto in quelle cavità è pure di formazione assai recente, e corrisponde a quello, che tranne i banchi diluviali e alluviali è l'ultimo emerso nella valle lombarda. Di più venendo verso Genova è da notarsi una specie di ripiano, che sta ai piedi dei

monti, e che pare costituire sulle sponde del mare una specie di terrazzo il quale si tiene a una non grande altezza sul medesimo.

A terminare poi la descrizione topografica della Liguria marittima, sarebbe anco di mestieri notare quale configurazione ha la costa, passando in rivista i diversi seni e capi della medesima, siccome pure sarebbe prezzo dell'opera, ove fosse possibile, indicare, se molte delle mentovate catene si prolunghino, e in qual direzione nel mare adiacente.

Quanto a quest'ultima parte è però difficile il dire qualche cosa di preciso. Affinchè nondimeno si possa prendere un'idea del comportarsi del fondo del mare giungiamo qui (Tav. 1.^a) una carta di Sonde, lavoro del general Albini, la quale indica le diverse profondità del mare, della porzione del golfo di Genova, compresa tra il capo Noli e il capo di Portofino: da questa carta si vede, che il punto di massima profondità corrisponde all'incirca alla metà della linea che riunisce questi due capi, e che tra le profondità del mare immediatamente lungo la costa, le massime sono quelle corrispondenti al monte di Portofino, il quale s'immerge per così dire a perpendicolo nel mare.

Confrontando poi la serie delle profondità disposte secondo certe linee con altre a loro parallele, pare che si possa osservare, che in certe direzioni vi è una serie di profondità massime, con accanto una serie di profondità minime, e sicchè quasi si potrebbe opinare che vi siano delle vallate e dei dossi o creste allineate in quelle direzioni; non si vedono però quivi quelle notevoli differenze che sul continente si scorgono tra le ordinate dei monti e quelle corrispondenti delle valli, e forse questo perchè dei sedimenti posteriori hanno colmato di più le valli sottomarine e fatto scomparire le maggiori diversità di livello. Così nella porzione del golfo di Genova che trovasi più in dirittura e nel meridiano della città, pare che una serie di massime profondità corrisponda quasi alla valle della Polcevera, e un'altra all'apertura del porto, mentre nella linea del capo di Faro, se ne toglia i punti immediati alla costa, sembra che vi sia una serie di minime profondità e pertanto probabilmente una cresta sottomarina.

Per quanto riguarda poi la descrizione della costa, si può dire che meno in alcuni pochi punti allo sbocco dei torrenti, ove si aprono le vallate, essa è generalmente formata da montagne, le quali si pro-

traggono in capi più o meno alti e più o meno avanzati nel mare medesimo. I più notevoli tra questi capi sono, cominciando da ponente, il capo Sant'Ospizio presso Villafranca, il capo della Turbia che si alza molto sul livello del mare, il capo della Mortola, poi quello della Bordighiera, quello di Berta, quello delle Mele il quale termina a ponente il golfo di Genova, in seguito il capo Noli, che si alza perpendicolarmente sul mare; e in riviera di levante il monte di Portofino che ha circa 600 metri di altezza, poi la punta di Maunara, il Mesco presso Levanto, quindi la punta di Portovenere con accanto le isole Palmaria, Tino e Tinetto che ne sono la prolungazione, e infine al di là del golfo della Spezia e presso l'imboccatura della Magra, il Capo Corvo, al di là del quale regnano le grandi spiagge di Luni, di Massa, delle foci di Serchio e di Arno fino a Livorno, dopo la quale città soltanto le diramazioni dell'Appennino vengono ad essere di nuovo immediatamente lambite dal mare. In Liguria poi le spiagge, come abbiain detto, sono poco importanti: possono notarsi soltanto per un'alquanto maggiore estensione quelle della foce del Varo, quella tra Vintimiglia e la Bordighiera che comprende le foci del Roia e della Nervia, la spiaggia di Taggia, quella di Albenga che si estende dal capo di Santa Croce al capo di Santo Spirito, ed è fronteggiata in parte dalla piccola isola Gallinara e formata dalle alluvioni del Centa, essendo dessa prolungazione della maggiore tra le piccolissime pianure che si trovano nella Liguria. Poi la spiaggia di Vado a Savona, quelle di Albissola, di Varagine, quelle di Sestri, di Cornigliano e di Sampierdarena presso Genova, quella di Chiavari e in fine quella di Sarzana e di Luni al di là dei confini della Liguria.

È da osservarsi che le maggiori spiagge corrispondono in generale ai maggiori corsi di acqua, e che è soltanto allo sbocco di questi torrenti, che trovasi un qualche tratto di piano, tutto il resto essendo occupato dai monti che giungono al mare nel quale s'immergono spesso immediatamente e sotto il cui livello prolungansi, rilevandosi talora a piccola distanza, formando così le sole e piccole isolette della Liguria, le quali possono chiamarsi piuttosto punte delle catene che sorgono fuori del mare, come sarebbe dell'isola Gallinara, prolungazione del capo di Santa Croce presso Alassio, da cui è poco lontana, dell'isoletta di Bergeggi che appartiene allo Sperone che finisce al mare presso il villaggio di questo nome, delle isole Pal-

maria, Tino e Tinetto, che sono prolungazione evidente della catena di Portovenere a ponente del golfo della Spezia, catena di cui conservano la natura e la direzione e da cui la Palmaria è divisa da uno stretto di poca larghezza e di poca profondità, siccome il più foraneo e più basso Tinetto dal Tino, e questo dalla Palmaria sono ngualmente per piccioli bracci di mare separati.

PROSPETTO

DELLE ALTEZZE DELLE PRINCIPALI MONTAGNE

E

PUNTI PIÙ NOTEVOLI DELLA LIGURIA

DETERMINATE PER MEZZO DI LIVELLAZIONI BAROMETRICHE

CATENA CENTRALE

<i>Nome del Monte</i>	<i>Terreno ond'è composto</i>	<i>M. in metri</i>
Colle di Pouriac	Marne scure giurassiche	2529.
Pe' Brua	Gneis ferrugineo	2797.
Colle di Chatillou	Gneis	2532.
Colle di <i>Frema Morta</i>	Granito	2627.
Punta al S. E. del colle di <i>Frema Morta</i>	Idem	2670.
Colle di Fioestre	Gneis e granito a piccoli grani	2487.
Santuario di Finestre ai piedi della Salita del Colle	Granito a piccoli grani	1913.
Monte Crapier o Vermasen	Idem	3070.
Cima della Biscia	Arenaria del Verrucano	2803.
Colle di Tenda	Scisto del macigno e accanto calcarea a nummuliti	1795.
Monte Cros	Calcarea scistosa e scisti con nummuliti	2520.
Colle degli uomini	scistosa con coralliglie	2255.
Monte Carnio	giurese cristallina	2681.
Monte Bertrand sopra Lopega	a fucoidi	2503.
Monte delle Navette sopra Colla Rossa	Scisto del macigno	2404.
Colle di Tanarello	Calcarea a fucoidi	2083.
Monte Tanarello o Sciaccaré	Idem	2249.
Monte Frootero	Idem	2178.
Colle tra Ciaggia e Meodstica	Scisto del macigno	1342.
Colle di Nava al giogo	Idem	987.
Monte a poente di quel di Caprauna	Idem	1689.
Monte di Caprauna al S. di Ormea	Al limite dello scisto e della calcarea	1770.
Monte Galet	Calcarea granolare giurese	1721.
Colle di S. Bernardo sopra Garesio	Scisto talcoso	953.
Rocca Barbea	Pudinga quarzosa e calcarea granulare	1081.
Colle tra Bardineto e Toirano	Scisto talcoso	811.

<i>Nome del Monte</i>	<i>Terreno suol e composto</i>	<i>Alt. in met.</i>
Monte Calvo	Calcareo granulare e comp. giurese	1593.
Colle tra Bardineto e Bardino	Scisto talcoso	1098.
Colle della Torre di Melogoo	Gneis	1069.
Monte Settepaol	Idem	1421.
Monte Albo di S. Giacomo	Calcareo	978.
Baracone al colle	Scisto talcoso	669.
Monte a levante del Baracone	Idem	831.
Giovo di Cadibona	Gneis talcoso porfiricoide	435.
Colle delle Meugie	Scisti	710.
Santa Giustina colle	Terreno terziario Miocene	517.
Punta all'O. dell'Armetta	Serpentina	1241.
Armetta al Segnale	Idem	1281.
Beigua	Idem	1305.
Bricco di Rama	Idem	1177.
Faiello	Idem	1198.
Dente	Idem	1110.
Giovo di Cancellona	Scisto talcoso e Serpentina	671.
Passo del Turchino	Scisto	898.
Martino	Serpentina	1013.
Punta più alta della Sengia	Idem	995.
Monte all'origine della Varenna	Idem	932.
Pizzobon o Ceriseu	Idem	981.
Colle delle Giovare	Idem	803.
Tarconae	Idem	1132.
Colmo di Lero	Eufotide	1091.
Colle della Bocchetta	Scisto e marigno	790.
Punta a levante della Bocchetta	Idem	835.
Colle de' Giovi	Scisto	470.
Monte Maggiolo al N. della Vittoria	Idem	703.
Colle della Vittoria	Scisto e marigno a fucoidi	874.
Monte della Vittoria	Marigno e calcarea a fucoidi	742.
Monte a ponente del colle della Crocetta	Scisto e calcarea con fucoidi	674.
Colle della crocetta d'Oré	Scisto e marigno	480.
Monte a levante del colle d'Oré	Calcareo a fucoidi	801.
Monte a tramontana del colle di Sella	Idem	818.
Colle della Sella	Idem	743.
Cima a mezzogiorno della Sella	Idem	822.
Monte Carossino ossia Matello	Idem	830.
Monte di Cisa all'origine del Geriolo	Idem	810.
Pian di Cretto	Idem	622.
Monte Reno	Idem	990.
Candeezzo	Idem	1049.
Colle di Scofera	Scisto del marigno	677.
Punta di Lavagnola	Scisto e marigno	1091.

<i>Nome del Monte</i>	<i>Terreno ond. è composto</i>	<i>Alt. in met.</i>
Origine del canale di Neirone . . .	Scisto e macigno	1138.
Monte di Acqua pendente sopra S. Vincenzo in Fontanabona	Scisto	1252.
Liccorno in Fontanabona	Macigno	1349.
Ariona sopra Borzonasca	Serpentina	1688.
Colle di Cento Croci	Calcareo o scisto a fucoidi	1173.
Monte Goto	Macigno	1649.
Colle della Cisa	Scisto e macigno	1042.

VALLE DI TINEA

Confluente della Tinea e del Vallon di Molieres	Gneis	666.
Confluente dei Vallon di Robiono e Tinea a S. Salvatore	Scisto rosso del sistema arenaceo	483.

CONTRAFFORTE TRA LA TINEA E LA VESUBIA

Colle di Molieres attacco del contrafforte	Granito	2056.
Colle tra S. Dalmazzo il piano, o S. Martin di Lantosca	Calcareo	1507.

VALLE DI VESUBIA

Confluente del Boreon e della Vesubia a S. Martino	Lenbo di rale, e tosto rocce primarie	916.
Confluente della Gordolasca	Terreno gessoso o massi rotolati	530.

CONTRAFFORTE TRA VESUBIA E ROIA

Monte Bego	Rocella di quarzo o arenaria	2882.
Miniera di Tenda	Rocella scistose	1516.
Capelet Sobran al N. di Raus	Arenaria quarzosa	2663.
Colle di Raus	Calc. e accanto Ranchwake o gesso	2025.
Cima ai S. dei colle di Raus	Calc. compatta e calc. dolomitica	2152.
Colle all'origine del canale di Contes tra Paglione o Vesubia	Marne sotto il macigno che monta assai più alto	1066.
Colle di Braus tra il Paglione e la Bevera	Calcareo nummulitica	1008.
Gran Mondo al S. della Bevera o a S. E. di Sospello	Calcareo gialla, forse della formazione Neocomiana	1378.
Poggio della Madonna presso Berra, tra il Paglione e il canal di Contes	Marigno	626.
Colle di Brois, tra la Bevera e il Roia	Gesso e Ranchwake che spunta sotto la calcarea nummulitica	883.

DEPRESSIONI NEL SUDETTO CONTRAFFORTE

<i>Nome del Monte</i>	<i>Terreno ond'è composto</i>	<i>Alt. in met.</i>
Canale di Contes sotto Contes . . .	Marne inf. al marigno, sistema cretaceo.	194.
Paglione sotto il ponte di l'Escarène.	Marne e podiostoc inf. al marigno.	366.
Sospello la Bevrà	Ammasso di ciottoli, e sotto gesso e Raorwake	347.

VALLE DELLA ROIA

Roia sotto Treda.	Scisto taloso	766.
Confluente col torrente Valancia a S.		
Dalmazzo	Aggregato del Verrucano	657.
Roia alla Giandola	Calcareo	503.
Confluente di Bevera e Roia		22.

CONTRAFFORTE TRA ROIA E ARGENTINA

Cima di Marta o Scirana al S. della Briga	Marigno sup. alla calc. nummulitica	2148.
Passo di Mulattone tra il canal di Saorgio e la Nervia	Calcareo nummulitico e marigno	1162.
Colle in cima al canale di Bogi al S. della Tanarda tra Nervia e Argentina.	Marigno sup. alla calc. nummulitica	1366.
Monte Ceppo	Marigno	1630.
Colle di S. Rosolo per andare a Baiardo	Parte inferiore del marigno	935.
Poggio presso la Madonna della Costa presso S. Remo	È il punto in cui finisce il terreno terziario di S. Remo.	170.

VALLE DELL' ARGENTINA

Confluente del Giribonte e del Capriolo sotto Triora	Scisto ardesiano del marigno	440.
--	--	------

CONTRAFFORTE TRA L' ARGENTINA E IL CENTA

Colle detto di Garesio al S. di monte Frontero	Calcareo a furoidi	1807.
Corno di Vedona all' origine del canal di Rezzo	Idem	2002.
Monte al N. del passo di Mezza Luna.	Idem	1637.
Monte Graude o Carpassina, origine del canale d' Oneglia	Idem	1432.

VALLE D' AROSCIA

<i>Nome del Monte</i>	<i>Terreno ond'è composto</i>	<i>Alt. in met.</i>
Aroscia poco sopra la Pieve . . .	Corre nello scisto del macigno . . .	230.

CONTRAFFORTE DI SANTO SPIRITO

Monte due Fratelli, è la punta più occidentale	Calcarea	802.
Monte Aceto al S. del precedente . . .	Idem	750.
Monte della Croce sopra il Ceriale . . .	Calcarea compatta giurese	555.

VICINANZE DI FINALE

Cascine di Melogno, attacco del contrafforte all' O. di Finale	Gacia	962.
Punta sopra la Capra Zoppa al S. S. E. della chiesa di Verezzi	Calcarea terziaria, pietra del Finale . . .	205.
Capo Noli al Semaphora	Calcarea giurese	268.

VICINANZE DI SAVONA

Cadibona, monte sopra la cava del lignite	Agglomerato e mollassa terziaria . . .	378.
Punto più basso del terreno in cui è la cava lungo il rivo	Mollassa e lignite	269.
Monte Gintti	Gneis porfiroideo coll'aspetto quasi granitico	420.
Colle di Arenzano	Marne terziarie subapennine	95.

CONTRAFFORTE ALL' O. DELLA POLCEVERA TRA QUESTO TORRENTE
E LA VARENNA

Monte Conchiglia presso l'attacco . . .	Calcarea compatta e granulare subordinata agli scisti	747.
Passo di L' Enclisa al S. S. E. del precedente	Serpentina	569.
Madonna della Guardia	Specie di granstein	825.
Colle di Scarpino	Scisto lueido con vene di quarzo, forse scisto del macigno modificato . . .	607.
Monte Gazzolo, il più alto dei Bigiè . . .	Granstein granulare	668.
Colle dell'Invisetta al S. del precedente . . .	Idem	550.
Rocca dei Banchè al S. del precedente . . .	Idem	594.
Monte Teirolto al S. del precedente . . .	Idem	448.
Madonna del Gazzo	Calcarea granulare, talora compatta subordinata agli scisti	425.

<i>Nome del Monte</i>	<i>Terreno ond'è composto</i>	<i>Alt. in met.</i>
Colle di Borzoli	Terreno terziario subappennino . . .	81. —
Chiesa di S. Biagio in Polcevera . .	Scisti lucidi modificati	200. —

VALLE DELLA POLCEVERA

Ponte della Migliarina	Attenuto vi sono scisti del macigno	250. —
Ricò alla rionione colla Migliarina .	Idem	212. —
Armirotti, prima casa	Idem	168. —
Rionione della Luce e del Ricò . .	Scisto del macigno	150. —
Pontederimo piazza		91. —
Secca al confluyente della Sardorella .	Scisti del macigno	70. —
Serca sotto il ponte di Morgallo . .		52. —
Polcevera presso la torretta di Bolzaneto		46. —
Polcevera al confluyente della Torbella.		20. 5
Polcevera sotto il ponte di Cornigliano.		6. 5

SULLA SINISTRA DELLA POLCEVERA

Monte Panigh sopra Comaro	Scisto del macigno	370. —
Chiesa di Manesseno.		154. —

CATENA SECONDARIA TRA LA POLCEVERA E IL BISAGNO

Colle d' Origlia	Calcareo a fucoidi	622. —
Poggio delle scalette.	Idem	643. —
Diamante forte (parapetto del terrazzo).	Idem	667. —
Fratello Maggiore, ossia Poggio (idem)	Idem	657. —
Fratello Minore, ossia monte Spigno (parapetto del terrazzo)	Idem	656. —
Monte Puino (idem)	Idem	520. —
Forte Sperone (sommità dell' asta di bandiera)	Idem	516. —
Forte Begato o monte Moro (idem).	Idem	493. —
Forte Tenaglia (parapetto verso la Polcevera).	Idem	227. —
Forte Belvedere (sommità dell' asta di bandiera)	Scisto del macigno	125. —
Bastione di S. Benigno	Calcareo a fucoidi	61. —
Lanterna		125. —
Rivarolo (piazza della Chiesa) . .	Scisto	78. —
Garbo (idem)	Idem	197. —
Begato (idem)	Idem	277. —
Zemignano.	Idem	204. —
Castellaerio forte	Calcareo fucoidi	582. —

POSIZIONI DIVERSE ENTRO CITTA' E LE NUOVE MURA

	<i>Alt. in met.</i>
Porta delle Chiappe	302. 20.
di Granarolo	302. 80.
di S. Bernardino	137. 20.
degli Angeli	114. 40.
di S. Bartolomeo	99. 10.
della Lanterna	21. 70.
di S. Tommaso	12. 90.
Romana	8. 40.
della Pila	6. 70.
Piazza del palazzo Ducale	20.
di Sarzano (presso il pozzo)	29. 70.
dell'Areo (fra le due porte)	22.
Carlo Felice (piano dei portici)	24. 20.
Acquaverde	21. 00.
di Caricamento	2. 00.
Piazzetta di Vialata	57. 80.
Forte di Castelletto (sommità dell'asta di bandiera)	106. 80.
di S. Giorgio (piano del parapetto)	111. 40.
Chiesa di S. Rocco (palla del campanile)	100. 70.
di S. Francesco di Paola (<i>idem</i>)	133. 00.
di Oregina (<i>idem</i>)	215. 00.
della Madonnetta di S. Nicola (<i>idem</i>)	192. 00.
di S. Girolamo (<i>idem</i>)	101. 90.
de' Cappuccini	67. 10.
di S. Bartolomeo degli Armeni	90. 00.
Palazzo delle Peschiere (al piede del muro di facciata)	66. 20.
Albergo de' Poveri (braccio della croce del frontone)	97. 00.
Passeggiata dell'Acquasola	42. 00.
Torretta del Zerbino (del march. Durazzo)	74. 00.
Torre del palazzo Ducale (sommità dell'asta di bandiera)	94. 00.
Embriaci	68. 00.
della Croce di Malta	45. 00.
del giardin Serra all'Acquasola	75. 00.
del principe D'Orta	50. 00.
del telegrafo di S. Benigno	92. 60.
Capola di Carignano	112. 50.
Soglia della chiesa di Carignano	52. 76.
Campanile di S. Lorenzo	77. 00.
di S. Siro	61. 00.
delle Vigne	60. 00.
di S. Giovanni di Pré	50. 00.
di S. Teodoro	56. 00.
Rustione della Strega	42. 00.

	<i>Alt. in met.</i>
Bastione di S. Michele	54. 00.
Id. del Prato	44. 00.
Batteria dell'arco sopra le porte	38. 00.
Bastione dietro la villetta Di Negro	53. 00.
Monte Galletto.	80. 00.
Pietra Minuta	108. 00.
Osservatorio meteorologico della R. Università, altezza sul livello medio del mare presa dall'origine della scala del barometro che serve per le osservazioni quotidiane, metri 48. 03.	
Altezza dell'osservatorio astronomico della R. Marina sul livello medio del mare presa dal centro dello strumento dei passaggi, metri 77. 93.	

ALTURE SULLA DESTRA DEL BISAGNO

<i>Nome del Monte</i>	<i>Terreno ond'è composto</i>	<i>Alt. in met.</i>
Colle di Capenardo	Calcarea a furcoidi	738. 00.
Monte al S. del colle di Capenardo	Idem	880. 00.

VALLE DI BISAGNO

Schiena d'asino (<i>alta pressa d'acqua</i>)	143. 20.
Bisagno e torrente Courasra (<i>sotto il ponte di Cavazzolo</i>).	98. 42.
Punto in cui l'Arquedotto entra in città	81. 80.

MASSO DI MONTI TRA IL BISAGNO E LA LAVAGNA OSSIA ENTELLA

<i>Nome del Monte</i>	<i>Terreno ond'è composto</i>	<i>Alt. in met.</i>
Monte Bado	Calcarea a furcoidi	974. 00.
Monte alla sommità della valle di Bogliasco.	Idem	703. 00.
La Bastia principin al N. del contraforte di Fasce	Idem	857. 00.
Fasce al Segnale	Idem	831. 00.
Punta Rescà al S. del precedente	Idem	726. 00.
Servoda punta più al S.	Idem	583. 00.
Terza punta al S.	Idem	509. 00.
Monte Moro immediato sopra Quinto	Idem	403. 00.
Colle o Serra di Bavari	Macigno	330. 00.
Monte Pensasso.	Calcarea a furcoidi	574. 00.
Monte della torre dei Ratti	Idem	578. 00.
Richelieu pizzo dello Spalto	Idem	440. 66.
Forte santa Tecla (<i>sommità dell'asta di bandiera</i>).	Idem	197. 90.
S. Martino forte (<i>idem</i>).	Idem	112. 70.
S. Giuliano forte (<i>idem</i>).	Idem	42. 70.

<i>Nome del Monte</i>	<i>Terreno ond'e composto</i>	<i>Alt. in met.</i>
Sant' Eusebio (<i>piano della chiesa</i>)	Scisto del macigno.	227. 21.
Passo o colle sotto il rialzo di Portofino	Calcareo a fucoidi e immediatamente sopra podinga terziaria	441. 46.
Cima di Portofino al segnale.	Podinga terziaria	388. 00.
Monte Oreuso tra la Lavagna e il detto fiume di Rapallo.	Calcareo a fucoidi.	698. 00.
Monte Allegro (<i>piazza del santuario</i>)	Idem	603. 30.

VALLE DI LAVAGNA

Livello del fiume Lavagna in Ferrata. Macigno.	126. 00.
--	----------

MASSO DI MONTI TRA L' ENTELLA LA VARA E LA MAGRA

Monte Pù presso Sestri	Calcareo biancastro modificata	1017. 00.
Puota di Maara	Macigno	271. 00.
Rossola sopra Bonassola	Idem e diaspro	712. 00.
Puota del Mesco al segnale	Macigno	483. 00.
Monte Bardellone dietro Levaoto	Idem	637. 00.
Colle tra Verozza e Pignone	Scisto del macigno.	506. 00.
Bocca della caverna di Cassana	È aperta nella calcarea compatta	192. 50.
Monte sopra Portara e Corniglia	Macigno e scisti bruni	733. 73.
Monte all'attacco di Biosa e Fabiano.	Scisto presso la calc. (è dubbio se sia questa inferiore)	601. 33.
Monte di Fabiano	Calcareo giurese	547. 22.
Monte della Castellana	Calcareo marmo	511. 89.
Colle della foca	Al limite della calc. e del macigno.	251. 00.
Sprugola di S. Benedetto, ingresso della voragine	Calcareo	163. 00.
Cappella di S. ^{ta} Croce sopra Polverara.	Macigno	168. 40.
Monte sopra Sorbolo	Idem	614. 85.
Monte Marlo sopra monte Marcello.	Calcareo compatta giurese	349. 00.
Sommità dell' isola Palmaria	Calcareo marmo	198. 50.

VALLE DELLA VARA

Vara poco sopra Varese.	536. 72.
---------------------------------	----------

ALTURE SULLA SINISTRA DELLA VARA

Monte Fiorito tra Vara e Magra	Scisto e macigno	1066. 00.
Bavarone	Diaspro	738. 00.

VAL DI MAGRA

	<i>Alt. in met.</i>
Magra e Verde a Pontremoli	206. 00.
Magra e Aulella presso la Aulla	50. 00.
Magra sotto santo Sirlano	22. 80.

•

•

centrale del Meridiano di Parigi





GEOLOGIA

La regione di cui ci siamo occupati finora a dare la descrizione topografica è costituita, siccome è naturale il pensare, da più specie di terreni, o da diverse formazioni, che sono venute successivamente ad adagiarsi accanto le une all'altre, e che sollevate e modificate ne formano l'attuale costituzione geognostica.

Ora questi terreni possono essere divisi in due classi, in terreni di sedimento, e in terreni di traforco.

Passeremo dapprima a rassegna i terreni di sedimento che si trovano nella Liguria marittima.

Lasciate da parte quelle numerose masse di ciottoli alluviali, che si trovano nelle vallate, e molte di quelle breccie superficiali, che, per così dire, si vanno ogni giorno formando sotto ai nostri occhi ai piedi dei dirupi dei monti, particolarmente calcarei, lasciati ancora da parte certi depositi di travertino formati presso quelle sorgenti d'acqua, che più sono sopraccaricate di carbonato calcareo, e non tenuto conto dei banchi di ghiaia che si estendono lungo le spiagge del mare, il più recente tra i terreni di sedimento è quello che chiameremo quaternario, per distinguerlo da una più determinata formazione, con cui per verità sembra talora legato, e di cui po-

trebbe forse essere soltanto la parte più moderna, voglio dire la formazione terziaria subapennina.

A questo terreno quaternario si possono particolarmente riferire quei depositi di conchiglie marine, delle quali la massima parte ha le sue analoghe nei mari vicini, e che si trovano nelle vicinanze di Nizza, e particolarmente non lungi dal capo S. Ospizio presso Beaulieu, e a Grosceil sul lato orientale della baja di Villafranca, ove tal terreno s'innalza pochi metri sopra il livello del mare; sembra che quivi sia una specie di sabbia in parte calcarea tutta ripiena di frantumi e di gusci di testacei che conservano ancora il loro colore, e che perciò vennero chiamati subfossili, e che sia questo deposito un rilascio del mare, ossia una spiaggia da non molto tempo, geologicamente parlando, abbandonata dal medesimo.

Di questo terreno marino a conchiglie analoghe, anzi identiche colle viventi, e poco superiore al livello del Mediterraneo, tranne qualche altro picciolo lembo, sempre in questi dintorni, io non saprei trovare in diversa parte della Liguria altri esempi, che quelli che abbiamo accennato presso Nizza, giacchè non potrei chiaramente rinviare ad esso terreno, quella grande serie di strati di ciottoli legati da un tal quale cemento calcareo, talora anco sabbioso, che coronano ad altezze considerevoli le formazioni terziarie della riviera. Credo invece che debbano riferirsi a quest'epoca quaternaria, detta forse anco diluviana, le famose breece ossifere delle vicinanze di Nizza, altre breece che s'incontrano, ma più superficialmente, verso Finale, e altri punti della costa, il terreno delle caverne delle vicinanze della Spezia, e il terreno lacustre di una porzione della val di Magra.

A levante della più estesa parte della città di Nizza, e tra questa e il porto, sorge una rupe isolata di una calcarea più o meno compatta, giallognola chiara, talora dolomitica, su cui s'ergeva l'antico castello, e che è bagnata da più parti dal mare, in cui s'innalza quasi a perpendicolo; sulla faccia di questa rupe, che guarda verso mezzogiorno, levante, esiste una ingente fenditura, che dall'alto di quella rocca si sprofonda fin presso il livello del mare, e questa fenditura è stata ricolmata in epoche remote da una massa di ciottoli, ora rotondati, ora angolari, legati da un cemento terroso, generalmente rossiccio, assai duro, in cui sono numerosi frammenti di ossa di animali, le cui specie non vivono più nell'vi-

cine regioni, o anzi sono perdute. Questo aggregato di ossa con frammenti di rocce, il tutto legato da un cemento più o meno indurito, è quello che si chiama la breccia ossifera, non è però che la porzione di questo terreno la quale conteneva delle ossa, occupasse tutta la fenditura, ma si limitava invece ad una parte soltanto, la quale trovavasi al disopra del livello della strada del porto. Da un disegno che l'egregio sig. Verani, cultore insigne della Zoologia, mi ha comunicato, e che è tanto più prezioso quanto che lavori successivi hanno assolutamente distrutta quella porzione di roccia ove trovavasi la breccia, appare che questa fenditura fosse in comunicazione con una caverna, la quale più si addentrava nella montagna, e che la breccia si legasse con una specie di strato di terra nerastra leggera, contenente ossa intiere, il quale strato formava il suolo della caverna medesima. Esaminando il fondo della fenditura, che, per così dire, formava il vestibolo di questa grotta, e cominciando appena da un metro sopra il livello del mare, ove essa si restringeva moltissimo, e per così dire, finiva, appare che la parte inferiore fosse occupata per circa quindici a sedici metri di altezza da una congerie di pietre rotolate, di sabbie, di conchiglie subfossili, cioè analoghe alle viventi, ed identiche a quelle del terreno sabbioso di Beaulieu. In mezzo a questa congerie di ciottoli sortiva un masso considerabile di calcarea, tutto perforato dai litodomi, e a quest'altezza, cioè poco sopra il livello della strada del porto, le due pareti della fenditura vedevansi da una parte e dall'altra perforate dai litofagi medesimi. Sulla congerie poi dei ciottoli già mentovata, osservavasi ch'era deposta irregolarmente una pudinga, formata da riunione di ciottoli rotolati, e appianati, quali se ne vedono non lungi dalla breccia, e sull'opposta montagna di Montalbano. Questa pudinga che aveva in diversi posti diversa spessezza, essendo irregolare nella sua forma e nelle sue superficie, era tosto ricoperta dalla breccia ossifera, contenente frammenti di ossa, e legate da un cemento rossiccio, terroso compatto; è appunto a questo livello che si apriva la cavità sul cui fondo fu rinvenuto, posto allato della breccia ossifera, uno strato di terra nera leggera contenente molte ossa intiere. Questa cavità vedevasi internare circa 11 o 12 metri; nella parte invece più stretta della fenditura trovavasi sopra la breccia ossifera una nuova pudinga composta tutta di ciottoli rotolati, e ricoperta infine da terra, con

pietre e conchiglie terrestri, di quelle che vivono ancor oggi nelle vicinanze. Questo compimento continuavasi fino all'apertura per cui dovevano essere entrati i materiali che hanno successivamente colmato quella fenditura.

Le conchiglie trovate nella medesima sono:

<i>Triton nodosus.</i>	<i>Spondylus gaderopus.</i>
<i>Ranella gigantea.</i>	<i>Mytilus Gallo proviencialis.</i>
<i>Trochus rugosus.</i>	<i>Pecten.</i>
<i>Pateila Rouxi Payraud.</i>	<i>Ostrea.</i>
<i>Halotis tuberculata.</i>	—

Tra le conchiglie terrestri vi è un *Helix* che si accosta molto alla *vermiculata*.

Le ossa poi ivi rinvenute, sembrano appartenere, secondo il prelato sig. Verani, ai generi jena, elefante, rinoceronte, cavallo, bue, cervo.

Cuvier indicava già esistervi i generi cavallo, bue, cervo, e di più vi aveva osservato dei resti appartenenti al genere *felis*, e particolarmente ad una grande specie non lontana dal leone. Vi sono state anco trovate delle ossa di una tartaruga terrestre, le quali Cuvier ha creduto appartenere ad una specie vicina alla *testudo radiata* della nuova Olanda.

Il non trovarsi le conchiglie marine assolutamente miste e legate colle porzioni in cui sono i frammenti di ossa, farebbe sospettare che i due fatti non sono così immediatamente connessi, come lo dovrebbe far credere la loro assoluta vicinanza.

La parte inferiore, quella contenente le conchiglie subfossili, sarebbe essa forse stata colmata da materiali, ivi penetrati da un'altra apertura diversa da quella per cui sono venuti gli elementi della breccia ossifera? In questa stessa fenditura diceasi che siano state trovate traccia di osse umane, ma erano in tal particolare giacitura da non risguardarle come contemporanee alla breccia, ma là dentro trasportate in un'epoca posteriore. Ora lo stato attuale del luogo ove si sono fatti dei lavori d'arte, non permette più di constatare le relazioni delle diverse parti della breccia, quali le siamo andate accennando, nè permette di raccogliere frammenti di ossa, essendo stata la breccia ossifera in gran parte distrutta; pertanto chi volesse studiare sui resti in quella trovati, deve ricorrere alla collezione

della città di Nizza, in cui esistono molti di questi resti, a quella città donati dal prelodato sig. Verani.

Di questa breccia ossifera, e di altra non ossifera, ma con caratteri mincralogici quasi uguali, esistono tracce numerose nei monti che circondano Nizza, nei quali molte delle fenditure che traversano quelle calcaree ne sono ripiene. Analoga perfettamente alla breccia di Nizza è quella del capo della Garoupe presso Antibio. In Liguria poi, io credo aver trovato tracce di questa breccia al monte di Capra Zoppa presso Finale, di averne rinvenuto qualche vestigio nel capo Noli, ove non mi farebbe meraviglia che le numerose, ma poco accessibili caverne, le quali trovansi in quella calcarca, contenessero resti di ossa fossili, siccome forse se ne rinverrebbero facendo diligenti indagini nella vasta grotta di santa Lucia a Toirano, e in altre, non rare, in varie parti della riviera di ponente. Ugualmente, sebbene depositato in banchi, direi superficiali, riporterci all'epoca di queste breece ossifere, certo tratto di un terreno rossiccio, somigliante in parte ad un travertino, il quale ritrovasi dopo Laigueglia prima di giungere all'estremità del capo Mele, e in cui sono impastate conchiglie terrestri assai numerose, tra le quali è il *cyclostoma elegans*, e l'*helix vermicularia* di Bonelli, analoga a l'*helix vermiculata*.

Ma il punto avvertito, dove di queste ossa esistono invece molti avanzi, trovasi in un punto della Liguria orientale non lungi dalla Spezia. I monti calcarei che dal capo di Porto Venere si addentrano per non poche miglia nelle terre, sono in molti punti frequentissimi di caverne, alcune delle quali coi loro meati, servono ancora al dì d'oggi allo scolo delle acque che radunansi in certe cavità, o bacini infundibiliiformi, che a somiglianza dei *katastroton* della Grecia, non hanno alcun esito alla superficie; queste caverne vengono dette *sprungole*, delle quali una delle principali è quella di S. Benedetto o di Zegori. Oltre queste caverne in forma di tortuosi canali, ve ne sono altre che più hanno l'aspetto di grotte, quali le due che si aprono con larga bocca presso il paese di Pignone. Ma la più notevole di queste grotte, o caverne, sebbene di minore estensione, e di più ristretta apertura, si è quella detta di Cassana, situata più a ponente delle precedenti, e non lontana dalla picciola terra di tal nome; si apre questa sul fianco di un monte ad una mediocre altezza sopra la valle, e ne è la bocca sì angusta, che

appena una persona per volta può introdursi; l'interno ne è formato da una assai capace sala di forma quasi circolare; il suolo è occupato da un terreno rossiccio argilloso; non vi sono ciottoli, nè pare che vi siano moltissime stalattiti e stalagmiti, giacchè il suolo non è di queste ultime, come accade in molte altre caverne, ricoperto. Le ossa sono abbondantissime in quel terreno rossiccio; sembra che appartengano più particolarmente al genere *ursus*, ed in specie all'orso delle caverne. L'egregio prof. Paolo Savi ha dato una descrizione di questa caverna, e delle ossa ivi rinvenute. Dall'esame poi di quella grotta, e delle sue adiacenze, pare ch'essa potesse avere, oltre l'attuale, un'altra bocca otturata forse posteriormente dalle deposizioni di alabastro calcareo che non mancano all'intorno.

Con i terreni quaternarii o diluviali, cioè appartenenti ad epoca più recente che la terziaria, io volentieri associerei certi piccioli depositi di frammenti angolari, stratificati con argille rossicce, formanti delle collinette di piccola elevazione presso Mulledo e Sestri a ponente, certi altri depositi di ciottoli verso Sori, siccome altri di ugual natura che rinvengono anco nei dintorni della Spezia, e in ispecial modo nel canale di Rieò. Ma soprattutto vi porrò quello notevolissimo che occupa una porzione della valle di Magra, deposito, che per la sua analogia mineralogica, e per la sua posizione difficilmente può non credersi identico con quello della valle del Serchio presso Castelnovo di Garfagnana, e questo con quello sì famoso del val d'Arno superiore, ove tanti ossami fossili sono stati ritrovati.

Ora in val di Magra, sopra i banchi di calcarea e di macigno quasi raddrizzati e verticali, che formano l'ossatura delle colline circostanti alla valle, e più dei grandi monti che sovrastano ad essa, si estendono orizzontalmente in certe specie di banchi che sono nelle parti basse della valle su l'una e sull'altra sponda del fiume degli strati di marne e di marne sabbiose con banchi di ciottoli rotondati di diversa natura, ma particolarmente di calcarea, di serpentina, e più ancora di macigno; in queste marne si vedono delle elici e delle conchiglie che somigliano alle paludine. Tali strati, i quali hanno anche una notevole potenza, occupano non poca estensione, e sebbene la loro continuità sia ora interrotta, perchè il fiume si è scavato posteriormente il letto al disotto di essi nelle calcaree

e macigni, che li sopportino, pure dovevano un tempo essere riuniti, e formare uno, o al più due bacini separati soltanto da quel dorso di monti secondarii che vengono a traversare e restringere la valle presso Villafranca. Questo deposito, eh'io propendo a credere lacustre, è tanto più da notarsi che non è lontanissimo da quello del val di Serchio, col quale è disposto sopra una linea che ha la medesima direzione, che il principale asse del bacino del val d'Arno superiore, linea che è all'incirca parallela alla direzione della gioja principale dell'Apennino.

TERRENI TERZIARI.

L'incertezza di assegnare un'epoca precisa ai terreni che siamo andati finor numerando, il dubbio cioè, se debbano considerarsi come appartenenti ad un periodo particolare, oppure se debbano far parte della serie di cui or ora ci occuperemo, risguardandoli soltanto come contemporanei alle parti o membri più recenti di questa serie, scompare totalmente per i terreni che stiamo ora per accennare, e che formano un distintissimo ed importantissimo gruppo nei terreni di sedimento superiore, come quello che occupa una grandissima estensione di paese, soprattutto in Italia, ove dal trovarsi con caratteri sempre costanti lunghesso i piedi di quasi tutta la catena dell'Apennino, ha a giusto titolo, ricevuto il nome di terreno terziario subapennino: consta questo, come si sa generalmente, di potenti masse di marne azzurrognole inferiori, e di sabbie gialle, alle quali superiormente si uniscono ben sovente banchi potentissimi di ciottoli rotolati di diversa natura, talora legati insieme da un cemento assai tenace per formarne una vera pudinga, sovente colorata da tinte giallo-rossicce.

Di un terreno della natura ed epoca che abbiamo indicato, si comincia a trovare un vasto e potente deposito nelle colline, che estendonsi a ponente di Nizza verso l'imboccatura del Varo, colline che passano anco sull'altra sponda di questo fiume, e sul lato di Nizza, cioè sulla sinistra, ne accompagnano lungamente il corso rimontandolo dall'imboccatura fin quasi al confluyente della Vesubia. In questo tratto di paese regnano in ispecial modo numerosi e potenti banchi di ciottoli, le marne azzurrognole essendo visibili soltanto in un picciolo numero di punti. Alla Trinità in un picciolo

lucino isolato dalla grande massa terziaria, un banco di marna turchina contiene una lunga serie di fossili di quest'epoca subapennina, di cui la lista è stata data dal sig. Risso. Un banco ugualmente riferibile all'epoca terziaria, ma composto di grossi frammenti angolari di rocce delle vicinanze, perforati dai litofagi, e legati insieme da un'arenaria a cemento calcareo, in cui sono pettini e fossili subapennini, tra i quali de' spondili, che aderiscono colle loro valve ai frammenti di rocce in esso incastrati, trovasi presso il luogo detto la *fontaine du temple*. Faceva questo luogo probabilmente parte del fondo del mare, in cui si deponevano dapprima le argille e marne azzurrognole, e poi su di esse la gran congerie di ciottoli delle vicinanze di Nizza.

Avanzando dalle vicinanze di questa città verso levante, un secondo deposito terziario incontrasi presso rocca Bruna, ove sulle calcaree secondarie, delle quali sono composte quelle montagne, riposa una massa considerabile di ciottoli di ugual natura che quelli dei contorni di Nizza.

Non so poi vedere, siccome vorrebbe il Sismonda, un lembo di terreno terziario nelle arenarie che sono presso Mentone, le quali a parer mio sono invece legate col terreno nummulitico, siccome vi è legata quella calcarea argillosa grossolana con molti fossili e sottoposta ad una specie di macigno o mollassa, che vedesi presso la Mortola, la quale calcarea contiene turbinolie e bivalvi come cardii, veneri, ecc., e le contiene in banchi nei quali sono pure incastrate le stesse nummuliti.

Ma invece è evidentemente terziario il gran lembo di terreno, su cui è postata la città di Vintimiglia e il castello d'Appio, non che le colline le quali stanno dirimpetto a questa città sulla sinistra sponda della Roia e quelle che sono verso la Nervia e anco passato questo fiume. Quivi il deposito, che s' interna nelle terre, formando una specie di triangolo, è composto di marne turchine o azzurrognole, di sabbie e di pudinghe; i suoi banchi sono piuttosto inclinati: lungo la strada fino a Vintimiglia si vede che la marna talora alterna colle ghiaie e che sebbene generalmente inferiore pure talvolta ve n' ha qualche banco di sovrapposta a questi aggregati di ciottoli di varia natura, ma particolarmente calcarei; essa marna contiene conchiglie subapennine ed in ispecie il *unrex thiara* di Brocchi. Le sabbie gialle e nuove pudinghe ricoprono poi il tutto,

e tra le due fiumane, la Roia e la Nervia, il vertice del triangolo occupato dal terreno terziario giunge fino a Gaire, più di tre miglia dentro terra, questo terreno ridotto quivi ai banchi superiori, cioè alle sabbie gialle e alle pudinghe a cemento rossiccio, corona in banchi non molto inclinati le alture che stanno tra le due valli, lasciando vedere sotto di sè, gli strati quasi verticali del macigno sui quali riposa transgressivamente; più verso la Bordighera poi e al mare, gli strati terziarii sembrano ancor meno inclinati che presso Vintimiglia.

Un altro lembo di terreno terziario meno importante però, è anco a S. Remo presso cui occupa la collina di nostra Donna della Costa, ove colle solite marne azzurrognole sono pure sabbie gialle contenenti pettini e ostriche colle valve ancora aderenti ai ciottoli, che si trovano nella parte superiore della formazione; questo lembo di terreno terziario si prolunga pure a levante della città e andando verso la Madonna della Rea si vedono i banchi di pudinga, che ne fan parte, riposare orizzontalmente sugli strati quasi verticali della formazione del macigno.

Allo sbocco della valle dell'Argentina un altro non piccolo tratto di terreno terziario presenta le stesse circostanze che quello dell'imboccatura della Roia. Vi sono infatti quivi pure delle marne e delle ghiaie, e sabbie; e questo terreno che forma qui pure una specie di triangolo, giunge anco ben alto a coronare coi suoi banchi non molto inclinati, gli strati più raddrizzati del macigno e della calcarea che sta con esso.

Anco al Porto Maurizio sulla destra del torrente Impero, e ad Oneglia sulla sinistra del medesimo esistono dei lembi di terreno terziario; presso il Porto Maurizio nelle marne azzurrognole sono pezzi assai frequenti di legno bituminizzato con aspetto di lignite, che hanno fatto concepire speranza, non credo realizzata, di trovar quivi un banco di combustibile; nel lembo poi di questo terreno più vicino ad Oneglia le sabbie gialle che stanno alla parte superiore sono indurite in modo da presentare l'aspetto di una calcarea grossolana contenente pettini, la quale comincia a somigliare alla calcarea di questa tessitura e di quest'epoca, che troveremo abbondantissima nelle vicinanze di Finale; i due lembi di tal terreno dai contorni del Porto e di Oneglia, sebbene separati dall'Impero fino al cui letto non si abbassano, sono però disposti in modo da cre-

dere che un tempo fossero riuniti ed occupassero il fondo di un piccolo golfo o seno di mare, che corrispondeva all'attuale sbocco della valle di questo torrente.

Uguali ma ancor più piccoli bacini o lembi di terreno terziario si ripetono quasi colle stesse circostanze al castello di Diano dapprima, e poi più a levante presso S. Bartolommeo e Paiola nella valle del fiume del Cervo.

Ma il più importante, per la sua estensione, dei bacini terziarii della Liguria, se ne toglie le vicinanze di Nizza, si è quello della valle del Centa, ossia il bacino d'Albenga, il cui terreno si appoggia dalla parte di levante alla catena calcarea del capo di Santo Spirito, s'addentra nelle tre valli, cioè in quella della Nevia, dell'Aroschia, e di Garlenda, e pur si mostra non lungi dal ponte S. Martino, cioè verso il capo che termina a ponente la pianura d'Albenga, dal qual lato però è poco visibile, perchè asportato in gran parte dal fiume Centa o ricoperto dalle sue moderne alluvioni; il luogo in cui si presenta la sezione più interessante, è il rivo Torsero, ove si vede alla base la marna turchina con conchiglie, poi sopra questa un'altra massa assai potente di una marna sabbiosa un poco giallognola, che va passando ad un'arenaria talora indurita, e poi gradatamente ad una pudinga a ciottoli rotondati di diversa natura, la quale in certi luoghi è talmente indurita per un cemento giallo rossiccio che ne lega le parti (Cisano) da servire di pietra da mola; la marna turchina, che è la parte inferiore non presenta visibile stratificazione. Il professor Sassi, che ha dato una bella descrizione di questo bacino ed ha determinato le numerose conchiglie, che vi si trovano, crede che la marna riposi immediatamente sulle calcaree secondarie e sui scisti della vicina catena di Santo Spirito; io non oserei certamente contraddire a questa sua opinione, soltanto mi è venuto all'idea che certi aggregati a frammenti di gran dimensione e ad angoli poco o niente rotondati i quali si trovano in certi punti lungo le sponde del bacino, possano passare sotto la marna e formare realmente, lungo almeno le rive, la parte inferiore della formazione; quel che vi è però di certo si è, che progredendo verso lo interno delle valli i banchi che vengono inferiormente a contatto del terreno secondario, sono successivamente i più recenti; così nella valle della Nevia al confluente dei due suoi rami presso il paese di Confiente, vi è la pudinga superiore aggregata, la quale si appoggia immediatamente sulle rocce calcaree.

Può essere interessante per conoscere la posizione di questo terreno uno spaccato fatto dai monti che sono alla sinistra della Nevia prima di Zuccarello il quale tagli la catena che è tra la Nevia e l'Aroschia, quella tra l'Aroschia ed il torrente di Garlenda, ed infine quella che è tra questo torrente ed il mare; sezione cioè, che traversando gli estremi e più interni golti del bacino terziario, fa vedere le relazioni delle sue rocce cogli strati secondarii, che formano le catene interposte.

Sulla sinistra della Nevia stanno delle calcaree secondarie compatte; probabilmente come vedremo in seguito dell'epoca giurassica, in banchi assai inclinati verso il N. E. contro le testate di questi strati si appoggiano i banchi molto meno inclinati della pudinga molare che occupa il fondo della valle e che al confluente dei due rami della Nevia medesima è tagliata dai due torrenti, formando ancora soltanto l'estrema punta del promontorio, che è tra questi due rami; dalla parte di Confiente, cioè sulla destra della Nevia, la pudinga ugualmente si appoggia agli strati della già mentovata calcarea secondaria compatta, che quivi inclinano invece verso il S. O. Salita quindi la costa di Confiente per andare nella valle dell'Aroschia si vedono al principio della discesa, sulla calcarea giurassica, stare molto inclinati ugualmente verso il S. O. degli strati alternanti di scisto e di macigno, sui quali riposano sotto Arnascio, con un'inclinazione molto minore, ma sempre pendenti verso il S. O., le marne turchine con conchiglie sormontate dalle marne gialle, quindi dalle sabbie e in alto dalle pudinghe. Progredendo nel senso del S. O. e traversando per conseguenza la formazione terziaria dai bauchi più antichi a' più recenti, s'incontra un picciolo rivo tutto scavato nei letti delle pudinghe superiori assai inclinati in senso opposto per dare sospetto che passino sotto le marne, ma questo sospetto non si verifica, perchè salita la collinetta che sta sulla diritta sponda di questo rivo, la quale è formata dalle pudinghe, ridiscendendola dall'altra parte si vedono ricomparire dalla medesima pudinga le sabbie gialle e poi le marne turchine, le quali ad Ortovero nella valle di Aroschia presentano uno scosciamento molto considerevole; traversato poi il fiume sulla sua destra, trovasi nuovamente il terreno di macigno sormontato dalla calcarea a fucoidi, che forma la costa tra questo fiume e il suo picciolo affluente, il Garlenda, nella valle del quale nuovamente e sulle due sponde si vedono le marne turchine

coronate dai ciottoli, e al di là per andare al mare traversando la cresta che sta alle spalle di Allassio si trovano da capo gli scisti del macigno e in alto la calcarea a fucoidi, che inclinando siccome i detti scisti sottoposti all'incirca S. S. O. va ad abbassarsi verso il mare presso Allassio, Laigneglia, ed il capo Mele.



La calc. A, il macigno M, la calc. giurass. G, le marne C, e le pol. terziarie O, dai monti di Ciano al capo Mele.

Ma tornando al terreno terziario che occupa, siccome abbiain detto, parte del piano d'Albenga e anche porzione delle tre valli, che vengono a terminarvi, osserva giustamente il Sassi, che la porzione media delle sabbie gialle del medesimo, contenente pettini ed ostriche, s'indurisce talmente, che somiglia e diventa identica colla pietra del Finale, che or ora vedremo appartenere ugualmente al terreno terziario. I numerosi fossili trovati nel bacino d'Albenga sono stati indicati dal prelodato professor Sassi (vedi giornale ligustico 1827) e sono generalmente quelli che trovansi in tutte le colline subapennine: il prelodato professore ve ne indica inoltre alcune specie, come il *parmophorus elongatus* e la *venus erycinoides*, che si credevano appartenere soltanto ai terreni terziarii di epoca più antica; ma ciò non diminuisce in verun modo la certezza che questo terreno della valle del Centa faccia parte della formazione subapennina.

Se il terreno terziario di Albenga sta nel fondo di una valle, quello invece di Finale ed in ispecial modo, una sua porzione, è situato invece sull'alto di un monte, di cui corona le alture, riposando in banchi orizzontali sopra gli strati verticali o almeno molto inclinati della calcarea compatta giurassica e dello steascisto. Il monte su cui trovansi questi rimarchevoli banchi di calcarea grossolana o meglio di un sabbione indurito, tutto ripieno di gusci o valve di ostriche e di pettini particolarmente del *pecten plebeius*? e detto la Capra Zoppa, e il punto più alto ove si mostra detto terreno terziario, è il monte di Verezzi elevato sul mare 295 metri; da que-

sto monte situato a ponente di Finale, i banchi terziarii molto potenti, passano a mostrarsi sulle montagne, che stanno dietro a Final-Borgo e a Final-Marina, e da quelle sommità scendono poi al livello, nel mezzo del lor corso dei due torrenti, che sboccano in mare, da una parte e dall'altra di Finale, uno de' quali, è detto il torrente di Fegino, l'altro la fiumara di Pia, e rimontano in seguito per qualche tratto su quella specie di alto piano orizzontale, che sta alle spalle del capo Noli. Questa calcarea grossolana ha un colore talora quasi rossiccio, ed è assai dura da poter servire per pietra da taglio, al qual uso fu molto adoprata nei secoli scorsi, nelle fabbriche più magnifiche di Genova; talora alcuni de' suoi banchi hanno un aspetto brecciato, e nella parte superiore formano anzi una vera pudinga; la marna, la quale deve essere inferiore, non si mostra ben chiaramente, che in pochissimi punti, se ne vede qualche poca verso Fegino, e da quel lato si trova anco una sabbia marnosa, che sta sopra lo steascisto e sotto la calcarea grossolana. La potenza di questo terreno terziario, supera i 120 metri, ed è disposto quasi orizzontalmente; oltre i pettini e le ostriche, contiene qualche polipaio e degli echini, ma tutti questi resti organici sono in generale poco determinabili.

Dopo questo terreno terziario di Finale, il primo che s'incontra progredendo verso Genova, è quello che da Vado si estende a Savona, e costituisce tutte quelle collinette basse, che stanno ai piedi dei monti di rocce cristalline di quei dintorni, e si estendono a poca distanza dal mare lunghezza la spiaggia, ove forniscono abbondanti materiali alle numerose fabbriche di stoviglie e mattoni, che esistono in quelle vicinanze. Qui nel bacino di Savona; il terreno terziario consiste quasi esclusivamente in marne turchine, e in alcune marne giallastre, sormontate da un terreno forse alluviale rossiccio, con ciottolini o frammenti di quarzo. Le sabbie gialle e le pudinghe superiori, si può dire che manchino quasi assolutamente in questo lembo o zona di terreno terziario; le conchiglie fossili si trovano soltanto nelle marne turchine, e sono assai numerose; vi ho rinvenute tra le altre

UNIVALVI

Bulla ovulata Brac.*Bulla lignaria*.*Bulla convoluta*.*Conus pyrola*.*Volvaria triticea*.*Marginella buccinera*.

Parte I.

4

<i>Fusus longiroster.</i>	<i>Delphinula solaris.</i>
<i>Fusus thyra.</i>	<i>Melania cambessedii.</i>
<i>Pleurotoma granulosa.</i>	<i>Cassidaria echinophora.</i>
<i>Trochus agglutinans.</i>	<i>Dentalium entalis?</i>
<i>Turbo rugosus.</i>	<i>Robulina cultrata D'Orbigny.</i>

BIVALVI

<i>Arca diluvii.</i>	<i>Corbula gibba.</i>
<i>Nucula margaritacea.</i>	<i>Lucina scopulorum? Bast.</i>
<i>Protuneulus auritus.</i>	<i>Tellina pellucida.</i>
<i>Venus rugosa.</i>	<i>Terebratola bipartita Broc.</i>

restati non ben determinati di Echino e polipai.

Un altro picciolo lembo di marne terziarie colle solite conchiglie, ritrovasi quindi presso Albissola su l'una e l'altra riva della San-sabbia; sulla sinistra di questo torrente è rimarehevole la posizione del terreno subapennino, perchè si trova accanto al terreno terziario medio o miocene, e in modo da indicare che questo aveva già subito delle alterazioni, quando le marne subapennine furono depositate.

Un nuovo e più esteso bacino terziario rinviensi ancora nella specie di depressione che esiste ai piedi dell'alta catena della *Beigua*, del *Camullà*, ecc., depressione diretta all'incirca dall'O. all'E. e che dal luogo di *Scierboasca*, va a Lèrca ed Arenzano. Questa specie di vallata è fiancheggiata dalla parte del mare dalle colline secondarie, che stanno sopra Cogoleto, e da quelle del capo di Arenzano; in essa i diversi bauchi del terreno terziario non formano un tutto continuo, perchè vi sono qua e là dei massi sporgenti di serpentina e di scisto e alcune picciole valli che l'interrompono; pare che le sabbie contengano non pochi ciottoli di serpentina, e queste sabbie son miste con le marne, le quali in generale, meno al colle di Arenzano, sembrano mostrarsi in minor mole che negli altri bacini; al luogo detto *Scierboasca*, la sabbia superiore pare quasi esclusivamente composta di un tritume di polipai, di punte d'Echino e di conchiglie.

Tracce di una depressione diretta dall'O. all'E. si mostrano ancora in più immediate vicinanze di Genova, come accade presso Sestri e Borzoli, e qui pure si fa vedere il terreno terziario, passando esso dalla vallata del torrente di Borzoli, al colle di questo nome, e scendendo verso la valle della Polcevera. In questi luoghi nella cavità formata dalla *roccia* serpentinoso e da certi scisti e

calcaree, si è depositata una massa ben potente di marna azzurrognola con ostriche, veneri, *pecten pleuronectes*, e con piccioli letti di ciottoli ofiolitici e pezzi di una calcarea compatta perforata dai litofagi; questo banco può avere circa quaranta piedi di altezza; su di esso sta uno strato di sabbia conchilifera di tre piedi di spessore, in cui sono dei piccioli pettini e poi altra marna turchina meno conchilifera più sabbiosa, la quale può averne circa sei piedi. Seguivano quindi quattro o cinque alternative di sabbie con conchiglie, ciottolini ofiolitici in strati poco potenti, colorite dall'ossido di ferro, e di marne azzurrognole poco conchilifere; queste alternative possono avere circa dodici piedi di altezza. Finalmente sta sopra di esse una massa più considerabile di sabbie gialle ofiolitiche con pettini e ciottoli. Andando poi dalla parte della Polevera, vi sono delle masse di ciottoli rotolati di natura calcarea coi quali sono delle ostriche.

Tra le conchiglie rinvenute in questo bacino di Sestri noteremo le seguenti:

UNIVALVI

<i>Dentalium sexangulum.</i>	<i>Pleurotoma flosa.</i>
<i>Dentalium elephantinum Br.</i>	<i>Fusca rostratus.</i>
<i>Dentalium dentalia.</i>	<i>Fusus ligarius.</i>
<i>Natica helicina.</i>	<i>Fusus turpula.</i>
<i>Natica millepunctata.</i>	<i>Cerithium lima.</i>
<i>Natica glaucus.</i>	<i>Cerithium ulucoides.</i>
<i>Conus mercati.</i>	<i>Rissoa pusilla Bron.</i>
<i>Conus antediluvianus.</i>	<i>Rissoa saturata?? nobis.</i>
<i>Conus deperditus.</i>	<i>Rissoa cochlearella.</i>
<i>Conus turricula.</i>	<i>Triton nodosus.</i>
<i>Conus striatulus.</i>	<i>Rostellaria perspicua.</i>
<i>Conus pyrula.</i>	<i>Buccinum corniculum.</i>
<i>Cancellaria lyrata.</i>	<i>Buccinum costulatum.</i>
<i>Ranella marginata.</i>	<i>Terebra duplicata.</i>
<i>Turbo rugosus.</i>	<i>Tornatella semistrata.</i>
<i>Solarium simplex Bron.</i>	<i>Tornatella fasciata? Linnk.</i>
<i>Trochus agglutinans.</i>	<i>Scleria communis Bron.</i>
<i>Trochus mediopartitus nobis.</i>	<i>Solarium moniliferum Br.</i>
<i>Mitra turgida Br.</i>	<i>Solarium simplex Bron.</i>
<i>Mitra pyramidula.</i>	<i>Turritella trienrinata Br.</i>
<i>Marginella buccinea.</i>	<i>Turritella terebra Br.</i>
<i>Marginella cypreola.</i>	<i>Turritella tornata Br.</i>
<i>Pleurotoma oblonga.</i>	<i>Turritella imbricataria v. Linnk.</i>
<i>Pleurotoma rotata.</i>	<i>Turritella vermicularis Br.</i>

Turritella triplicata Br.
Strombus fasciatus.

Pileopsis hungarica.
Fissurella Graeca.

BIVALVI

Pecten plebejus Lamk.
Pecten pleuronectes Br.
Pecten laticostatus Br.
Ostrea navicularis Br.
Anomia pellis serpentis Br.
Terebratulæ Soldaniana Ris.
Cytherea multilamella.
Nucula pella Br.
Nucula minuta Br.
Nucula nitida Br.
Arca antiquata Br.
Arca nodulosa Br.
Arca mytiloides Br.

Arca Noe Br.
Cardita calyculata Lamk.
Venus radiata.
Venus dysera Br.
Venus senilis Br.
Venus rugosa Br.
Lacipa lactea.
Pectunculus pulvinatus.
Cardium fragile Br.
Cardium multicostatum Br.
Venericardia intermedia Br.
Spondylus gæderopus.

Un altro lembo di terreno terziario si trova pure infine esattamente nel centro della città di Genova; pare che se ne comincino a vedere delle tracce alla salita di Oregina, ove prima che quel luogo fosse ridotto a coltivazione, si osservavano potenti massi della calcarea compatta bigia, onde sono composte le montagne immediatamente vicine, tutti perforati dalla *modiola lythophaga*, e legati da un cemento sabbioso giallognolo con pettini e ostriche; nell'interno della città, in Strada nuova, si è trovata la marna azzurrognola, la quale è pure alla salita di S. Caterina, alla piazza S. Domenico, presso l'Acquasola, donde passa alle porte dell'Arco e adiacenze, mentre dalla piazza S. Domenico scende verso il porto, immergendosi sotto le acque del mare, a giudicarne da quanto vien riferito dalle iscrizioni che ricordano l'escavazione della Darsina, le quali accennano che non si ottenne la sufficiente profondità, se non che *exfosso topfo*, col qual nome corrispondente al volgare *tufa*, viene indubitabilmente indicata la marna azzurrognola.

È difficile dentro la città di vedere l'intera composizione del terreno terziario, non comparendo in generale che la marna turchina, e qualche poca marna giallognola più superficiale; alla salita degli Orti di S. Andrea vi è però la testata di un banco più sabbioso; nelle marne esistono delle concrezioni più indurate, e qualche raro pezzo di calcarea perforata dai litofagi; la conchiglia più caratteristica di queste marne turchine è il *pecten pleuronectes*. Vi si sono trovate

inoltre la *pinna nobilis*, l'*ostrea navicularis*, la *natica helicina*, il *fusus thiara*, il *solarium moniliferum* ec. ec., delle fungie, dei resti di erostacei, dei spatanghi, del legno bituminizzato, e dei frutti di conifere. Esaminando quindi la posizione di questo terreno, appare che occupi un bacino diretto dall'O. all'E. posto a ridosso dalla parte dell'alto mare dalla collina più prominente, che forma il capo di Carignano. Dal colle poi che corrisponde alla piazza di S. Domenico e a Picca Pietra questo terreno scende verso il letto del Bisagno, ove pare che occupi gli orti presso la strada del Manicomio, donde si prolunga forse anco più a levante, vedendosi nuovamente questo terreno verso Albaro nella picciola valle che scende da S. Martino, al colle di questo nome, e nell'altra valletta detta Vernazzola, che sta dalla parte di levante di questo stesso colle, formando queste due vallette, ed il colle interposto una depressione diretta come quella di Arenzano dall'O. all'E. e riparata dalla parte del mare dal gruppo delle colline di S. Francesco d'Albaro, le quali per questo tratto fanno l'ufficio che fanno le colline di Carignano per le marne terziarie, le quali si trovano nell'interno della città di Genova. In Albaro poi, siccome in Genova, il terreno terziario consta di marne turchine, di qualche poca marna più sabbiosa, e di banchi di ciottoli, la maggior parte calcarei, tra questi alcuni pezzi di maggior volume, son tutti bucherati dai litofagi. In questo lembo di terreno sono assai abbondanti le conchiglie; vi ho rinvenute tra le altre

UNIVALVI

<i>Rissoa acuta</i> Dech.	<i>Fusus lignarius</i> .
<i>Rissoa pusilla</i> .	<i>Murex intermedius</i> Br.
<i>Rissoa suberuta</i> ? Ns.	<i>Cassidaria echinophora</i> Br.
<i>Melania costolata</i> Ris.	<i>Fissurella graeca</i> .
<i>Turritella acutangula</i> .	<i>Dentalium elephantinum</i> .
<i>Musodonta Costurii</i> payr.	<i>Crepidula gadus</i> Rang.
<i>Turbo rugosus</i> .	—

BIVALVI

<i>Isocardia arletina</i> Br.	<i>Arca antiquata</i> Br.
<i>Terebratula quadrata</i> Ris. fig. 176.	<i>Nucula minuta</i> Br.
<i>Terebratula truncata</i> Ris. fig. 174.	<i>Venus radiata</i> Br.
<i>Corbula revoluta</i> Br.	<i>Venus eremita</i> Br.
<i>Chama gryphoides</i> .	Uno spondilo, delle ostriche,
<i>Venericardia intermedia</i> Br.	dei pettini.

Quello che questo bacino di Albaro presenta poi di rimarchevole si è che lascia vedere la sovrapposizione delle marne non immediate alla calcarea a fucoidi secondaria delle vicinanze di Genova, ma bensì superiore ai banchi di una pudinga poligenica dura, legata da un cemento arenaceo, la quale per la sua analogia, e dirò identità, bisogna ammettere che sia dell'epoca stessa della pudinga di Portofino, la quale, siccome vedremo, appartiene al terreno terziario bensì, ma ad un membro più antico, cioè al terreno miocene. Ma tornando poi alle nostre marne e sabbie di Albaro, le quali non si può dubitare che non appartengano a quella estesa formazione dei terreni subapennini, che con tanta potenza si estendono e con caratteri assolutamente analoghi di giacitura, di apparenza minerale e di fossili lungo tutta l'Italia, è da osservarsi che esse formano l'ultimo lembo che se ne trova in Liguria, andando verso levante, non rinvenendosene più, a mia cognizione, se non che dopo le foci dell'Arno, il che fa supporre ragionevolmente che la parte orientale dei nostri monti fosse già assolutamente emersa, quando si deponevano queste marne subapennine.

TERRENO TERZIARIO MEDIO O MIOCENE

Più antico che le marne subapennine e diverso generalmente per la natura delle rocce che lo compongono, pei fossili che contiene ed anco per l'altezza cui giunge, è il terreno terziario medio, il quale però nella Liguria marittima si mostra in un picciol numero di punti, mentre invece è estesissimo e potente sul pendio settentrionale dell'Apennino, cioè sul versante dell'Adriatico. Questo terreno, nei punti ove ha acquistato tutto il suo sviluppo, può considerarsi come composto di tre grandi suddivisioni, le quali però non conservano un ordine sempre costante; ordinariamente nella parte inferiore regnano delle enormi masse di pudinga poligenica, in cui si mostrano ciottoli di svariatissima natura e di diverse dimensioni, legate spesso da un cemento sabbioso; nella divisione di mezzo sono dei macigni a mollasse con letti di pudinga generalmente a piccioli grani, e mollasse marnose o anco marne miste a sabbia; nella parte superiore poi sono delle arenarie indurite di colore ordinariamente più chiaro che nella parte inferiore, e direi meno miste di ciottolini di diversa natura; i fossili che vi si rinven-

gono, differiscono da quelli del terreno subapennino, sono talora spatizzati e in generale meno ben conservati; vi sono molti zoofiti, e non mancano in alcuni punti impressioni vegetabili, che anzi questo terreno tra noi è quello che contiene tracce più notevoli e banchi di combustibile fossile.

Uno dei punti della Liguria marittima, ove il terreno terziario medio si mostra più potente, è il capo di Portofino a dodici miglia circa a levante di Genova; questo monte che si avvanza molto nel mare, da cui sembra sorgere quasi a perpendicolo, ha la sua estremità e la parte sua più elevata tutta composta di banchi inclinati di una pudinga poligeica, i quali dalla sommità, con una assai forte inclinazione vanno ad immergersi nel mare medesimo. Se dal punto in cui la strada di levante traversa per mezzo di una galleria il contrafforte o sperone di Ruta, t'incammini, seguendo la cresta del monte verso mezzogiorno, per un certo tratto passerai sopra banchi di una calcarea compatta argillosa bigia con fucoidi, mista a qualche piccolo strato di arenaria macigno, che non dubiti di riferire all'epoca secondaria; quando poi hai fatto all'incirca un paio di miglia, giungi ai piedi di un alto dirupo, il quale si alza su quella cresta e costituisce la cima di Portofino, e questo vedi composto di enormi banchi di pudinga, i quali, osservando e da una parte e dall'altra, puoi mirare sovrapposti alla calcarea e andare ad immergersi sì a levante che a mezzogiorno e a ponente nel mare. In questa pudinga si possono notare dapprima numerosi ciottoli di mediocre grossezza della calcarea compatta sovra indicata e contenente talora anche delle impronte di fucoidi, coi quali ciottoli se ne vanno successivamente riunendo altri di serpentina, di eufotide, di calcarea semicompatta e granulare, di rocce di quarzo, di diaspro, di rocce scistose, i quali ciottoli in alcuni punti giungono ad avere anche una mole ben considerabile, il che è tanto più da notarsi che molte rocce di tal natura non si trovano nel loro posto originario se non che in luoghi assai distanti da questo monte di Portofino. Questi banchi di pudinga corrono S. S. O. N. N. E. inclinando verso l'E. S. E. Vi sono rari gli strati interposti di molassa, e finora non son riuscito a trovarvi tracce ben determinate di fossili organici, la quale assenza renderebbe difficile la determinazione dell'epoca a cui appartiene questa pudinga, se la sua sovrapposizione alla calcarea a fucoidi, di cui contiene inoltre nume-

rusi frammenti, non indicasse da un lato che è di questa più recente, e da un altro canto la sua perfetta identità di composizione con altri brani ben determinabili del terreno miocene, non dimostrasse che da questo in verun modo è impossibile separarlo. L'altezza totale del monte di Portofino è circa 588 metri, e l'altezza del masso di pudinga, che sovrasta alla calcarea secondaria, può essere di circa 117 metri; questa pudinga che, siccome abbiamo detto, scende dalla più alta cima fino al mare, occupa tutta la porzione della montagna che guarda verso mezzogiorno e mezzogiorno levante, ma non è così estesa sulla faccia di ponente, ove si tiene soltanto verso l'estremità ossia la punta della Chiappa, occupando invece molto maggior tratto verso levante, dalla qual parte, dopo aver formato i pittoreschi e non alti poggi sopra un de' quali è il castello di Portofino, giunge quindi fino alla Cervara, ove sotto di essa comincia a ricomparire la calcarea secondaria, la quale costituisce il resto de' monti che fiancheggiano buona parte del golfo Tigulio.



La pudinga A, la calcarea a fucoidi B, al monte di Portofino.

Nelle vicinanze di Genova e dalla parte di levante se ne toglie questo monte di Portofino ed un picciolissimo tratto di una valletta presso Albaro, in cui abbiain detto esistere dei banchi inclinati di pudinga riportabili a quest'epoca, non vi sono a mia cognizione altri punti in cui si mostri il terreno miocene, il quale è invece estesissimo appena varenta la giogaia centrale dell'Appennino medesimo; infatti gli alti e scoscesi dirupi che stanno sopra Casella, Sciorive, la Croce de' Fieschi, e parte della valle della Scrivia, come per esempio sopra l'isola, dirupi che s'innalzano al monte Maggio sopra Casella a quasi 1000 metri di altitudine, sono tutti composti

di pudinga assolutamente analoga a quella di Portofino, e con questa vanno misti dei banchi di mollassa contenenti talora tracce di combustibile verso Roccaforte, e delle conchiglie, le quali conducono a riportare tale pudinga alla formazione terziaria media; questi monti fanno parte della gran zona di tal terreno terziario che forma una parte delle colline più alte del Tortonese, quelle a mezzogiorno di Gavi e buona porzione di quelle del Monferrato; un tal terreno a fianco della valle della Scrivia, di cui corona le alture laterali senza mostrarsi nel fondo della medesima, si avvicina molto al vertice dell' Apennino, cosicchè, osservandone la disposizione geografica, si direbbe che, supposta occupata in quelle remote epoche l'attuale valle lombarda da un bacino di mare, vi fosse verso questa parte della valle della Scrivia un golfo che s'internava moltissimo e si avanzava alle spalle di Genova, se anzi, spingendo le congetture più in là, non si volesse ancor meglio supporre, il che non sarebbe irragionevole, che le pudinghe di monte Maggio del versante settentrionale fossero unite a quelle di Portofino sul versante meridionale, e che qui, più ancora che un golfo, esistesse un braccio di mare che isolava gli alti monti calcarei che stanno verso l'Antola, cioè a tramontana levante della nostra città.

Una tal riunione delle pudinghe e arenarie terziarie medie del bacino dell'Adriatico o del versante Nord dell'Apennino con quelle del versante meridionale, appoggiata soltanto sopra congetture per quelle della valle di Scrivia e di Portofino, è un fatto invece constatato per altro punto della Liguria, ove questo terreno si mostra in banchi sollevati bensì, ma appena dislocati, assolutamente situato sul sommo vertice della catena centrale; questo notevole punto trovasi nelle montagne dietro Albissola e Savona, cioè al giogo di santa Giustina, ove banchi molto potenti di mollassa con tracce di conchiglie e di lignite formano la parte superiore della montagna, e si legano dalla parte Nord cogli estesissimi terreni terziarii medii delle valli dell'Erro e della Bormida, e dalla parte del Sud con quelle che giungono al mare tra Varagine, Celle e Albissola, ove presentano lungo il mare medesimo dei tagli o spaccate notevoli, i quali lasciano chiaramente vedere l'alternativa delle pudinghe e dei banchi di mollassa più o meno fina e marnosa, talora colorita in bruno cioccolato; anco in questa porzione del terreno terziario situato lungo il mare sono state trovate delle tracce di lignite, il che lo lega pure col

famoso deposito di Cadibona posto esso stesso a picciola distanza dal sommo vertice della catena centrale, poco al di là della quale giungono anco gli altri terreni terziarii medii che occupano grande parte della valle della Bormida.

Giace la cava del combustibile fossile di Cadibona sul versante meridionale dell' Apennino, a pochi minuti dal villaggio di questo nome, a circa 500 metri di elevazione sul livello del mare; alte montagne in ispecial modo dalla parte di levante attorniano questo luogo, cosicchè ha quasi l'aspetto di un bacino in cui si riuniscono le acque che, scorrendo poi nel Letimbro, vanno a scaricarsi in mare presso Savona; le rocce sulle quali si è depositato il terreno terziario sono per la maggior parte di granito o anco di protogine; desso poi è composto nel basso di una pudinga grossolana a elementi di scisto talcoso e micaceo, di granito e di eufotide; sopra vi è un banco di argilla talcosa bianca con qualche picciolissimo letto di arenaria aggregata; poi in terzo luogo un altro strato di argilla con tracce di lignite e impressioni di foglie, segue quindi il banco di combustibile accompagnato inferiormente da una *saalbande* di materia argillosa e ricoperto superiormente da piccioli strati di lignite meno puro, un poco scistoso, sparso di lamine brillanti, ai quali sovrasta altro strato di lignite brillante nero di pece, detto la *corona*, in cui specialmente si sono trovate le ossa di *Anthracotherium*; a queste succedono delle sabbie biancastre, poi un banco di sabbia e di pudinga con picciole vene di lignite ed impressioni di piante, altro banco di pudinga con sabbia rosso-verdastra e piccioli nodi di arenaria aggregata con impressioni, quindi di bel nuovo un picciolo letto con tracce di lignite, finalmente un banco di ciottoli rotolati assai regolarmente disposti e misti a sabbie verdi e rosse, il tutto ricoperto da una massa considerevole di terreno di trasporto. In questo terreno di Cadibona non sono riuscito a trovare quelle conchiglie marine, le quali non sono rare in altra parte della formazione terziaria media, pare invece che vi sia stata indicata, ma molto oscuramente qualche traccia di conchiglia fluvatile, nè questo è inverisimile perchè tal classe di conchiglie è sovente associata coi depositi di lignite e colle impressioni di piante, come accade per l'appunto nella zona di questo terreno, che trovasi sul versante Nord, nella non lontanissima valle di Tanaro a Bagnasco, ove nello scisto bituminoso che accompagna il lignite sono frequentissime tracce di *planorbi*, e di

anodonte oppure di *unio*, e ove sono anche moltiplicatissime le impressioni di foglie, fatti tutti che danno indizio che quel deposito è dovuto a materiali quivi trasportati da un qualche corso d'acqua che aveva colà la sua imboccatura, conclusione che potrebbe adottarsi anco pel terreno di Cadibona, parte di uno stesso tutto, e in cui le impressioni di foglie trovate, le quali, sebben poco determinabili, pure indicano appartenere a vegetabili che crescono sulla terra asciutta, rassomigliando alcun poco alle foglie del castagno, e le ossa di *anthracotherium* danno prova che non lungi da quei luoghi esisteva una terra emersa, forse di non picciola estensione.

Oltre questo terreno di Cadibona è quello di Celle, vi è pur traccia di questa formazione terziaria media nelle vicinanze della *Stella* o *Staja*, ove esiste un picciolissimo lembo di mollassa con qualche pudinga, il quale serve a legare anco fisicamente, essendo minima la distanza che li separa, il terreno del Giovo di santa Giustina con quello delle sponde del mare.

Più in là di Savona io non ho potuto vedere tracce del terreno di mollassa, poichè tutto è occupato dal terreno secondario, meno i piccioli bacini spettanti al terreno terziario subapennino. Nell'indicare però come appartenenti al terreno miocene tutti quei banchi di mollassa che vedonsi nella Liguria marittima e nelle regioni che stanno poco distanti da essa al di là dell'Apennino, mi sono attenuto a quanto vi è di più generale; non ardirei nondimeno asserverare che non vi sia qualche traccia di terreno terziario più antico, cioè appartenente al periodo eocene; se pertanto questo esiste realmente, del che dubito moltissimo, sarebbero a lui riportabili soltanto quei banchi di arenaria con fossili di forma orbicolare alcuni probabilissimamente vere nummuliti non rarissimi al di là dell'Apennino. Io veramente non so rassegnarmi a credere che queste nummuliti di Lerma, di Cascinelle, delle vicinanze di S. Bastiano, siano secondarie, poichè le ritrovo in banchi sovrapposti alla calcarea a fueoidi, la quale è per me secondaria, ma l'ultima bensì tra noi delle formazioni di questa divisione. Io ciò non ostante, sicuramente non nego che non vi siano in Liguria delle nummuliti assolutamente secondarie ed inferiori al macigno, cosicchè questa grande formazione del macigno e delle sue calcaree, sarebbe frapposta a due banchi nei quali si trovano nummuliti, l'uno inferiore e secondario, l'altro superiore e terziario; di quest'ultimo nella Liguria marittima

io non saprei citare un esempio, a meno che ad esso non si riferiscano certi peculiari banchi a piccole nummuliti o lenticoliti delle vicinanze di Nizza, i quali trovansi in una speciale giacitura, e con cui sono certi fossili vagamente ragguagliati al *lituolites nautiloideus*, mentre invece del terreno secondario con nummuliti ne sono, siccome vedremo in seguito, frequentissimi e determinati esempi per l'appunto anco nelle vicinanze stesse di Nizza. Questo doppio banco di nummuliti mi spiegherebbe l'associazione da molti indicata di fossili terziarii con le nummuliti di queste località, poichè, da quanto abbiain detto, potrebbeasi sospettare che queste conchiglie terziarie siano associate soltanto con quel banco di lenticoliti che vediamo essere superiore in molti altri luoghi alla calcarea a fucoidi. Con queste lenticoliti vengono indicati dei resti di echiniti, e di questi fossili molti resti pure si trovano nelle mollasse di Lerma e di Cascinelle al di là dell'Appennino, ove pare che tutto conduca a riguardare quelle mollasse come terziarie, e veramente, a malgrado del sospetto che possano essere più antiche come appartenenti al terreno miocene del Lyell, cioè al terreno terziario medio. Mi conferma infatti molto in questo pensiero l'esame di alcuni fossili che accompagnano quelle arenarie con nummuliti: frequentissima è tra loro l'*operculina complanata* del Dorbigny, fossile che, come si sa, trovasi nelle vicinanze di Bordeaux, e pare frequentissimo in quel terreno terziario; ora quest'opercolina è associata a delle vere nummuliti di dimensione assai maggiore di essa a Lerma, a Cascinelle, a Spigno e anco nelle vicinanze di Nizza, in un punto speciale della penisola del sant'Ospizio, cioè presso Beaulieu; ma il luogo ove questo fossile è abbondantissimo e accompagnato da nummuliti, da un altro fossile che è stato però con molto dubbio riportato al *lituolites nautiloideus*, e da pettini che somigliano al *pecten dubius*, trovasi a non molta distanza da Nizza, passato il Varo sul territorio francese, e sulla strada che conduce a Vence, presso una picciola cappella detta di santa Elisabetta. Quivi non si può dubitare che questo banco non sia una cosa diversa dal sistema nummulitico delle Alpi e degl'alti monti che soprastano a Grasse, ove le nummuliti sono associate a fossili assolutamente secondarii, tra gli altri, a molte terebratule della creta e a picciole grifee analoghe alla *gryphaea auricularis*; onde è ragionevolissimo, a parer mio, il concludere che nelle Alpi marittime e in adiacenti regioni le nummuliti

s' incontrano per lo meno in due diverse formazioni, cioè nella formazione eretacea dappprima, e poi nella formazione terziaria; sarebbe poi qui pregio dell'opera, il dare la determinazione esatta delle diverse specie di nummuliti trovate nell'uno e nell'altro dei sistemi sopraccennati, ma nell'oscurità in cui siamo circa un' esatta classificazione delle nummuliti, mi limiterò ad indicare che quelle associate all'*operculina complanata* sembrano riferirsi alla *nummulite* oppure *lenticolite variolaria*, ossia a qualche specie a lei vicina, siccome dirò pure che si trova con loro un'altra specie di *nummulite* piana dall'una parte e dall'altra, la quale non giunge mai ad una notevole grandezza, non superando il diametro di 10 millimetri, mentre invece nel banco, che tutto fa credere doversi riguardare come secondario, vi sono delle nummuliti che si accostano alla *nummulites complanata*, le quali giungono alla notevole grandezza di 23 millimetri di diametro, siccome pure ve ne sono altre ugualmente di notevole grandezza, ma che invece di essere piane sopra ambe le facce, sono convesse dall'una parte e dall'altra del disco.

Un'osservazione poi occorre circa la posizione dei banchi di mollassa e puddinga terziaria, in cui sono le nummuliti che accompagnano l'*operculina complanata*, ed è che questi banchi si trovano generalmente nella parte inferiore della formazione, e quasi sempre poco distanti da monticelli o scogli di roccie di più antica formazione, le quali dovevano costituire ad una grande profondità il fondo del mare, in cui si deponevano questi terreni terziarii miocenici, siccome pure per ultimo, importa far osservare, che questa mollassa o puddinga con nummuliti del versante Nord dell'Appennino, è piena zeppa di grani e frammenti di serpentina, il che è molto valido argomento a farla considerare come appartenente ai terreni terziarii, e non come facente parte dei secondarii che già avevamo cessato di depositarsi.

TERRENI SECONDARI.

La serie dei terreni finora descritti occupando nella Liguria marittima molteplici tratti di paese non estesissimi ed interrotti e separati tra loro, egli era di necessità, per così dire, di descrivere i singoli bacini nei quali questi terreni si trovano, e di indicare

per qualunque di essi, le peculiari circostanze che possono l'uno dall'altro far riconoscere differente. Non così però furà di mestieri lo scendere a tante minute particolarità per i terreni di cui or ora ci occuperemo, come quelli, che estendendosi molto di più dei precedenti, e occupando in generale un tratto assai vasto di paese con poche interruzioni, presentano in questo caratteri che non variano ad ogni passo perchè le influenze, che presiedettero alla loro formazione o alle loro successive modificazioni, potevano essere alquanto uniformi sui varii punti della Liguria, ove questi terreni secondarii si depositarono.

Ora in questa gran serie dei terreni secondarii, i quali ritrovansi presso di noi, per comodo della descrizione, potremo stabilire varie divisioni più o meno naturali, e dapprima, come della più recente, ci occuperemo della formazione della calcarea a fucoidi e del macigno; in secondo luogo parleremo dei terreni eretacei a lei inferiori e delle calcaree gialle; in terzo luogo indicheremo le calcaree riferibili alla formazione giurassica, quindi esamineremo una serie di rocce quarzose e scistoidi, abbracciando queste sotto il nome di verrucano, infine ci occuperemo degli scisti cristallini e di altre rocce di apparenza primaria, terminando il tutto con qualche considerazione sulle rocce di trabocco, che formano l'altra delle grandi classi stabilite nei terreni che costituiscono la scorsa del globo.

TERRENO DEL MACIGNO E DELLA CALCAREA A FUCOIDI.

È questo terreno uno de' più generalmente sparsi in tutta la Liguria sì marittima, che mediterranea, estendendosi esso poi anco nella vicina Toscana, donde passa poi anco ad occupare una porzione degli Stati del papa. I peculiari suoi caratteri, e il sapersi che costituisce una gran parte degli Apennini della Toscana, hauno indotto il chiar. prof. Leopoldo Pilla a denominarlo complessivamente *terreno etrusco*. Esso consta poi in generale superiormente di una massa considerabile di calcarea stratificata marno-argillosa, or più or meno pura, di una tessitura or più, or meno compatta, e talvolta quasi terrosa, sovente di colore bigio o cenerognolo, ma talora anco biancastro e qualche rarissima volta un poco rossiccio, con cui sovente si trovano alternanti alcuni banchi di marna e altri piccoli letti di psammite o macigno: in questa calcarea abbondano di pre-

ferenza molte delle tante varietà di fucoidi descritte da Adolfo Brougniart ed in ispeciale modo il *fucoides Targionii*, il *fucoides intricatus*, ecc. Sotto la calcarea vieue una potente massa di macigno di varia struttura, consistenza e grana, alternante talora con qualche argilla scistosa, spesso un poco micacea, e infine sotto la massa principale del macigno, comparisce altra riunione di banchi di argilla scistosa di colore screziato, di poche arenarie e macigni e di calcaree più compatte che sarebbero la parte inferiore della formazione, se non si volesse con essa riunire la calcarea nummulitica; riunione non certo da tutti i geologi ammessa, ma che però da varii geologi è stata proposta ed adottata; con che allora l'ultimo ed inferiore membro di questa complessione di strati sarebbero la calcarea nummulitica e i banchi che alternano con essa.

Coll'indicare però in questo modo le diverse rocce costituenti il terreno di macigno, e col mostrare in quali parti principalmente della Lignria si estenda, avremmo compita la descrizione del medesimo, se le cose realmente si comportassero con quella semplicità, che abbiamo accennata; ma la molteplicità delle cause modificanti, la molteplicità dei punti nei quali queste hanno agito fa sì, che ben più complicata deve riuscire questa descrizione, ed infatti, mentre sono pochissimi i punti in cui si possa trovare detta formazione del macigno, direi quasi inalterata, invece quasi ovunque si trova essa grandemente modificata, essendo state molte delle sue argille cambiate in veri scisti talora lucidi e quasi di aspetto nntico; molti de' suoi macigni cambiati in diaspro, e varie delle sue calcaree, forse in origine quasi terrose, mutate in calcaree compatte e aueo in calcaree cristalline.

A dare un tale qual ordine a questa descrizione della formazione del macigno, cioè a prendere un punto di partenza, direi presso a poco invariabile, conviene, sebbene come già dissi la questione sia ancora pendente e molto dubbia, principiare dalla calcarea nummulitica e considerare questa specie di roccia ben riconoscibile ovunque si presenta come collegata e faciente parte della formazione del macigno, di cui occuperebbe la parte inferiore; nè con questa supposizione io credo si vada lungi dal vero, perchè sebbene alcuni fatti, come l'associazione di varie nummuliti con terebratulæ della creta e particolarmente della creta inferiore, colle ippuriti e con qualche indizio di belemniti in certe rocce a grani verdi nel dipar-

timento del Varo e in qualche località della contea di Nizza, mi abbiano condotto un tempo con varii geologi a presumere, che il banco nummulitico avesse a far parte di preferenza della creta inferiore, ora però considerando che la massa maggiore della calcarea nummulitica trovasi costantemente sopra quelle calcaree argillose a punti verdi, che si riguardano come spettanti alla creta inferiore, che essa poi è in ugual modo costantemente avvicinata da qualche banco di argilla scistosa e di macigno, coi quali anco talora vi è una specie di alternazione, sono meno restio a pensare che questa notevolissima massa di calcarea nummulitica si possa di preferenza colla formazione del macigno riunire, e così adottare l'idea, che da questi banchi nummulitici si abbia a cominciare la descrizione della complessa ed importante formazione, che del macigno e calcarea a fucoidi abbiamo denominata.

Ora di questi banchi nummulitici, sebbene interrotti, non sono infrequenti delle tracce nelle parti della contea di Nizza, che avvicinano le valli del Paglione e del canale di Contes, non che nelle parti basse della valle della Vesubia e nei monti che stanno sopra Beaulieu; il macigno sta poi sopra questi banchi nummulitici particolarmente a Berra, e ne esiste anco una massa potentissima nei monti che si trovano tra la Vesubia e la Tinea, cioè sopra Claus e alla foresta di Serra; ma la massima parte di questi banchi nummulitici delle indicate località formano, per così dire, delle masse isolate, ed è principalmente per alcune nummuliti trovate in vicinanza di esse, che poteva propendersi alla riunione degli strati nummulitici colla formazione cretacea inferiore di quei contorni; ma dove un notevole banco nummulitico comincia a mostrarsi si è verso Vintimiglia e particolarmente alla Mortola, donde, per così dire, questo banco può seguirsi per molte e molte miglia nelle vicine montagne, e ove può servire ad indicare una delle sponde o parte del fondo del bacino in cui può supporre che siano stati depositati tutti i susseguenti banchi di macigno e di calcarea sovrapposta. Ora in questa località del capo della Mortola, venendo dal non distantissimo paese di Mentone, dopo avere traversata una massa di calcarea compatta giallognola, talora dolomitica al Garavano, ossia Baussi rossi, dopo avere pereorso una serie di banchi di calcarea bigia or più or meno argillosa e compatta, con arnioni silicei e con alcuni punti verdi e pochi fossili riferibili alla creta inferiore, si

incontrano dei banchi di calcarea grigia piuttosto scura con molte nummuliti, tra i quali banchi alcuni contengono inoltre varie conchiglie bianche, in generale non bene determinabili quanto alle specie, ma bensì riferibili ai generi *cardium*, *venus*, *tellina*, *turritella*, ecc. e forse ai *solen*; in questi banchi vi sono pure frequenti dei polipai, tra i quali ho creduto riconoscere la *turbinolia dydyma* di Goldfuss; le nummuliti poi contenute in questi banchi sembrano appartenere, come ho già altrove accennato, almeno a due specie, una piana sopra ambo le facce e di grande dimensione, l'altra in pari modo di considerevole dimensione, ma notevolmente convessa sopra ambo le facce: Questi banchi nummulitici sono assai inclinati, pendendo, a quel che pare, incirca verso l'E. N. O.; tra essi ve ne sono dei più calcarei e dei più arenacci e grossolani, alcuni sono durissimi, altri più friabili che cadono in parte in decomposizione. Su di questi strati presso un picciolo ponte si vede riposare una specie di arenaria micacea bruna, piuttosto friabile, alquanto marnosa, con frammenti di lignite, la quale continua ad avere incirca la stessa inclinazione, essendo nondimeno un poco meno rialzata; su di essa pare poi vi sia del macigno, ma fatto qualche tratto di strada sotto del detto macigno ricomparisce ancora la detta arenaria che pare quasi una mollassa, e poi si vede nuovamente il banco nummulitico il quale ha però qui, siccome la roccia arenacea ch'ei supporta, una inclinazione contraria a quella che aveva dapprima, immergendosi verso l'O. S. O., siccome nello stesso senso s'inclinano per qualche tratto alcune calcaree marnose, che sotto stanno al banco nummulitico, le quali poi assai presto riprendono l'inclinazione E. N. E. come la riprende un banco nummulitico che ancora s'incontra, e che altro forse non è che quello già veduto, ma nuovamente piegato, e i banchi di macigno che gli sono sovrapposti, sui quali poi dopo una nuova piegatura nei due indicati sensi riposa, ma in banchi molto meno inclinati e più orizzontali, il terreno terziario subapennino il quale si percorre, come già si è detto, andando verso Viminiglia e al castello d'Appio.

Il banco nummulitico poi, visto lungo il mare alla Mortola, si segue dentro terra, dietro cioè a ponente del sopraccennato castello d'Appio; donde passa al confluente della Bevera e della Roia per estendersi alcun poco verso Colle Bassa e più sui due colli di Braus e di Brois dai quali giunge alle alture di Milleforche. Questo banco

si mostra poi più estesamente sulla sinistra della Roia, donde prendendo la cresta dei Forconi sopra Breglio continuando per la catena secondaria o sperone che sta tra il canale di Saorgio e le origini della Nervia, si mostra dietro, ossia al Nord di Pigua, e di-là passando per i monti denominati le alpi di Toràgio e di Seirana si accosta a Triora, ove assieme alle nummuliti si vede quella calcarea, talora di struttura molto massiccia e compatta, contenere delle turbinolie come presso alla Mortola; qui presso Triora uno spaccato nella montagna, presenta la seguente successione di strati: inferiormente delle calcaree compatte e scistose divise in letti di mediocre spessezza; poi un potente banco di calcarea compatta di colore oscuro e quasi nera con nummuliti; in seguito varii strati più sottili e alquanto scistosi di calcarea ugualmente nerastra, dura, con nummuliti e turbinolie; superiormente del macigno a grani di mediocre grossezza, di aspetto alquanto cristallino; e finalmente in alto degli scisti argillo-calcarei che possono riguardarsi come vere ardesie.

Da Triora e dalle origini della fiumara di Taggia il banco nummulitico si tiene a mezza costa delle alte montagne, che sovrastano al paese della Briga, essendo le sommità all'Est del medesimo villaggio, cioè il colle delle Navette, monte Bertrand, coronate o dal macigno o più dalla calcarea a fucoidi. Quindi esso seguita verso il Riofreddo e al colle degli Uomini ove sono, a quel che pare, alcuni altri fossili non ben determinabili, e poi torce al colle di Tenda per mostrarsi ancora sul versante e piovente settentrionale, su parte dei monti che sono a ponente della Vermenagna e che vanno poi a raggiungere le valli del Gesso e della Stura. Quivi al colle di Tenda le nummuliti si trovano miste ad un'arenaria macigno micacea bruna, e non lungi da esse si trovano altri macigni e calcaree con fucoidi che è facilissimo di riconoscere.

Questa lunga serie di punti che siamo andati indicando e ove si mostra la calcarea nummulitica quasi sicuramente identica per la specie di nummuliti e altri fossili che contiene, non che per la sua posizione, ma diversa forse per la struttura della roccia, giacchè nelle alte montagne ha in generale una struttura più massiccia, più densa, e direi più modificata prendendo cioè il *facies* di una roccia di più antica formazione; questa serie di punti, dico, forma una linea sinuosa, la quale può servire a segnare il limite occidentale della gran massa del macigno e della calcarea che a levante di essa

linea estendesi per grandissimo tratto per molta parte della riviera, finchè questa formazione non ceda il posto a formazioni più antiche le quali si vedono emergere al disotto di lei, lungo il mare presso Albenga, e nell'interno delle terre verso i monti che vanno da Confiante a Nasino e quindi, ma sul versante settentrionale, presso quelli del confluyente del Tanarello e del Negrone e quelli delle Viosenne.

Considerando poi la calcarea nummulitica come la parte inferiore della formazione del macigno, sarebbe naturale che all'accostarsi dei terreni più antichi, ridiscendendo dagli strati superiori agli inferiori, continuando cioè, dopo avere traversati i più recenti a progredire verso levante, dalla qual parte si raddrizzano, inclinando in senso contrario gli strati inferiori, sarebbe naturale il trovare anco da questa parte le testate della calcarea nummulitica, che segnassero pure il limite oriculate di quella formazione del macigno; ma invece non so per quali cagioni questa calcarea manca, a cognizion mia, assolutamente da questa parte, e meno alcune piccole conchiglie (che si approssimano a quelle che accompagnano le nummuliti) le quali ho vedute non lungi dalle Viosenne e su certi monti presso il Carsino e così non distanti molto dalle nummuliti del colle di Tenda; non ho potuto vedere sulla linea che segna il limite orientale della massa di macigno e di calcarea a fucoidi della riviera di Ponente, traccia alcuna di quello notevolissimo banco che ci ha servito verso la contea di Nizza a indicare i confini di questo gran tratto della formazione medesima.

Ora per continuare ad indicare quanto spetta alla formazione del macigno, e non troppo dilungarci in minuti particolari, cominceremo dal notare quanto si vede lungo la sponda del mare, il che sarà sufficiente a dar cognizione, a un bel circa, del come si comportano i diversi banchi di quelle rocce, anco nell'interno delle terre.

Traversato il banco nummulitico e i sovrapposti macigni, che abbiamo veduto inclinare circa E. N. E. presso la Mortola, e lasciati da parte i terreni terziarii subapennini i quali si estendono da Vintimiglia, oltre e a levante delle foci del torrente Nervia, si giunge al capo della Bordighera, ove incontransi in banchi inclinati dapprima, in circa verso l'O. S. O. e poi all'E. qualche grado N. E. un'arenaria solida piuttosto silicea a grani più o meno fini che passa ad una specie di picciola breccia o pudinga ad elementi sminuzzati, la quale è una delle varie forme sotto cui si presenta il macigno;

questi banchi cedono presto il posto ad altri macigni più fini, alquanto micacei di colore bruno, che sono misti a specie di argille seistose e coi quali gradatamente cominciano ad alteruare dei banchi di calcarea, or più, or meno compatta, talora anco assai marnosa e in generale di colore bigio scuro. Questi banchi sembrano generalmente essere diretti S. S. O. N. N. E. in alcuni punti avendo l'inclinazione E. 15.° S. mentre in altri luoghi come al capo degli Ospitaletti sembrano piuttosto inclinare invece all'E. 15.° N. Ravvicinandosi poi a S. Remo, sempre lungo la costa, la calcarea va predominando e contiene molte fucoidi, siccome anco ne contengono alcuni banchi dell'arenaria bruna che alternano con lei; ma in quest'arenaria più particolarmente si veggono delle specie di tronchi o rami che probabilmente appartenevano a queste fucoidi, mentre nella calcarea invece ne sono le impronte determinatissime; in questi dintorni la stratificazione è molto contorta e tormentata, i banchi calcarei sono tutti traversati da rilegature spatriche dirette in ogni senso. Più si progredisce poi verso levante, non tenuto conto degli interposti bacini terziarii di S. Remo, dell'Arna e del Porto Maurizio, si vede che sempre più va predominando la calcarea a fucoidi, che tutto conduce a considerare come parte superiore della formazione; i luoghi poi, ove essa si mostra con maggior potenza, sono il capo di Berta presso Oneglia, il promontorio del Cervo e di Andora; ed infine il capo Mele; presso il capo di Berta, si può dire che trovasi il punto in cui probabilmente sono avvenute minori modificazioni nella roccia calcarea, essa è infatti talora quasi allo stato di una semplice marna indurita, e contiene numerosissime fucoidi: vi sono particolarmente *fucoides intricatus*, *fucoides Targionii*, *fucoides furcatus* ecc.


La calcarea in questa località del capo Berta è contorta e tali contorsioni, dirò così, degli strati, si possono seguitare al capo del Cervo, e quindi al capo Mele, ove però gli strati tendono a divenire dapprima più orizzontali, poi a rialzarsi, ma con una inclinazione in generale opposta a quella osservata dapprima, giacchè si vede che alzano le loro testate in modo da giudicare che vanno adagiandosi sui monti che stanno loro a levante ed a greco, infatti continuando a perecorrere la costa e progredendo sempre più verso l'E. s'incontrano assai presto dopo Laigueglia e verso Alassio e il capo di S.^{ta} Croce gli strati che appartengono ad una parte più bassa

della formazione; consistono questi in certe breccie calcaree, in scisti argillosi alquanto lucidi con lenticciuoli di macigno e in un'arenaria quarzosa assai cristallina; banchi tutti che sebbene evidentemente modificati non si può dubitare non rappresentino la parte della formazione, che è ordinariamente inferiore alla calcarea a fucoidi. È da notarsi che più in là del capo S.^{ta} Croce compariscono poi, fatta astrazione dal terreno terziario di Albenga, le rocce di una data più antica e probabilmente dell'epoca giurassica, onde tutto tende a dimostrare che siamo qui non lontani dalla sponda orientale del bacino, in cui si è depositato il macigno e non lontani da luoghi, ove essendo più ravvicinate le rocce cristalline, si sono fatte sentire le influenze modificanti, più assai che sull'altra sponda del bacino medesimo, presso cui le rocce della formazione del macigno sembrano aver subito minori alterazioni e conservano più l'aspetto che dovevano avere nell'epoca in cui si sono formate. In uno dei banchi dell'arenaria del capo di S.^{ta} Croce, la quale è quasi divenuta cristallina si osservano certi nuclei allungati, ma depressi, di una sostanza argillosa scura, i quali, con molta perplessità si potrebbero prendere per informi tracce di belemniti.

Il detto sin qui sulla maniera con cui si presentano gli strati del macigno e della sovrapposta calcarea a fucoidi lungo il mare, a un bel circa si ripete nell'interno delle terre, giacchè gli strati si succedono quasi collo stesso ordine, dagli inferiori ai superiori, andando da ponente a levante fino presso a poco ad una linea tirata dalle vicinanze del colle di Tenda, a quelle del capo di Berta, oltre cui progredendo sempre all'E. s'incontrano successivamente gli stessi strati in ordine discendente, cioè dai superiori agli inferiori, finchè si trovi la formazione giurassica delle montagne che sono al N. ed al levante di Albenga. Così nella valle dell'Aroschia presso la Pieve si vedono chiaramente i banchi del macigno dapprima inclinati in un senso, pendere tosto nel senso opposto e formare quivi come il fondo di un battello, avendo sentito da una parte l'influenza del sollevamento delle masse più antiche e cristalline, che sono a ponente della Roia, e dall'altra quella dei monti che sono nella valle del Tanaro.

Quanto all'estensione di questa formazione del macigno in riviera di Ponente è assai grande, e può dirsi che occupa quasi un gran triangolo che abbia la sua base da Vintimiglia ad Albenga lungo il mare ed il vertice al colle di Tenda, donde in seguito si stacca un'ap-

péndice che va ad estendersi in parte dei monti, che sono nella valle del Gesso e della Stura, i quali poi a loro vece, si collegano con molti notevoli tratti di questa formazione che si possono osservare



La calc. gialla *A*, la creta *B*, la calc. nummulitica *C*, il macigno *M*, la calc. a fucoidi *F*, il terreno terziario *T*, la calc. giurassica *J*.
Dalla Mortola ad Alghero.

nelle montagne del dipartimento delle basse Alpi e anco in molte dell'altro dipartimento delle alte Alpi.

Oltre questa grande massa di terreni spettanti al macigno e alla calcarea a fucoidi che abbiamo indicato in riviera di Ponente, un'altra massa non minore ne esiste in Liguria, la quale ad essa certamente non la cede, nè per la sua estensione, nè per l'interessamento che presenta lo studio delle sue importantissime modificazioni, e perchè inoltre più si accosta si per l'aspetto che per la posizione al tipo di questa formazione che regna negli Apennini del Modanese e della Toscana. La massa di questo terreno di cui ora ci tocca favellare comincia dalle vicinanze a ponente di Genova e quindi, lasciate da parte le interruzioni cagionate dall'apparizione della serpentina e rocce congeneri, e lasciate a parte certe isole, come presso la Spezia, di rocce più antiche, si estende per tutta la riviera di Levante, donde passa da un lato sul piovante settentrionale dell'Apennino, nel Piacentino, Parmigiano e Modanese, e da un altro a levante in Toscana girando intorno e circondando i massi più antichi delle Alpi Apuane, ossia dei monti di Carrara. Chi credesse trovare in questa formazione, là ove incomincia a mostrarsi, passate le rocce cristalline delle vicinanze di Savona, qualche analogia di struttura coi banchi veduti in riviera di Ponente verso Vintimiglia e la Bordighera andrebbe lungi dal vero, giacchè sebbene per moltiplicate osservazioni, si possa essere condotti a considerare come appartenenti alla formazione del macigno certi scisti talcosi e certi altri scisti lucidi grigi con pagliuzze di mica e rilegature quarzose che vedonsi presso Arenzano e Voltri, pure hanno questi un tale aspetto così diverso che,

se non si ricorre alla teoria del metamorfismo, non è possibile di persuadersi, che siano dessi i rappresentanti di alcuni tra i banchi di argille scistose e di certi macigni della parte inferiore della formazione; a malgrado di questo, egli è molto probabile che gli scisti lucidi talcosi che si trovano verso Arenzano e Voltri, quelli di Pegli e Sestri, tutti interrotti e traversati dalle masse serpentinosi, non siano altro che le argille e arenarie della parte inferiore della formazione del macigno, potentemente modificate dalle ingenti masse di rocce ignee che sono emerse alla superficie in mezzo ad esse.

Nei luoghi in cui la formazione del macigno ha potuto essere studiata nello stato suo originale, cioè in luoghi ove non ha subito che poche modificazioni, si è veduto; per esempio in alcune parti della Toscana, che inferiormente vi esiste una calcarea di colore cenerognolo o bigio scuro, generalmente compatta e assai solida, associata ad argille scistose, sovente di vario colore; questa calcarea pare non manchi tra noi, e sebbene abbia subite, per le vicine ofioliti, forti modificazioni, pure sembra potersi con certa tal quale probabilità riconoscere in quelle calcaree, ora compatte, ora cristalline e anco dolomitiche che incontransi presso Sestri a ponente, donde internandosi nelle terre costituiscono una serie di massi generalmente di forma quasi ellittica ed allungata, che si estendono dal predetto paese, fino alla giogaia centrale presso la Bocchetta, al di là della quale passano sul piovente settentrionale fino oltre Voltaggio. Queste masse sono composte di strati ordinariamente molto inclinati di una calcarea compatta dura e di colore scuro, coi quali ne stanno altri parzialmente cristallini e quasi saccaroidi; molti di questi banchi sono tutti screpolati e diventano o parzialmente o quasi intieramente dolomitici ad un più immediato contatto colle masse serpentinosi, siccome nella montagna del Gazzo dalla parte di ponente. Con questa calcarea nel luogo detto Isoverde in Pievevera vi è pure un masso di gesso saccaroide (creduto un tempo e descritto per primitivo) con particelle di talco o di argilla talcosa, accompagnato da una *Rauchwacke*, che visibilmente dimostra essere essa siccome il gesso un'alterazione e potentissima modificazione della calcarea e degli scisti argillo-calcarei vicini; alterazione e metamorfosi cagionata dalla serpentina, che quasi tutta involve ed attornia quella calcarea nella quale essa penetra, e dalla quale, quasi anco si direbbe che è penetrata a vicenda, formando così non lungi di là il masso

di olivaceo da cui si estrae il tanto celebrato marmo conosciuto sotto il nome di verde di Polcevera.

Ma tornati in riva al mare, e venendo un poco più a levante che Sestri, presso Cornigliano, accanto ad una singolare roccia mista di serpentina e di una specie di *granstein*, con forse qualche poca eufotide con vene di quarzo e qua e là dell'epidoto, il quale impasto di diverse sostauze costituisce il capo di S. Audrea, vi sono dei banchi di uno scisto argilloso, lucido, grigio tutto ripieno di vene spatiche bianche il quale ben dimostra di essere una modificazione di uno scisto calcareo ordinario; questo banco di scisto segue per lungo tratto sulla destra sponda della Polcevera e si può accompagnare fino alla gioiata centrale tra la Bocchetta ed i Giovi, osservando le molte modificazioni ch'esso subisce, trasmutazioni le quali però non sono tali da impedire di riconoscere in esso la prolungazione di quello stesso banco o di quella riunione di banchi che incontransi presso il mare; tra le altre modificazioni che possono notarsi sono degne di osservazione quelle che subiscono certi noduli o arnioni calcarei e certi piccioli strati della stessa natura in essi banchi contenuti, i quali in alcuni punti sono poco o niente alterati, presentandosi sotto l'aspetto d'una calcarea scura compatta, o poco granulare, mentre in altri invece sono mutati in una calcarea bianca saccaroide, qual marmo con fogliuzze di talco verdastro, interposto di maniera, che sembrano noduli di cipollino. Questo stesso scisto prende anco poi un aspetto che lo fa assolutamente rassomigliare ad uno scisto di antica formazione, quando è traversato da frequentissime vene di quarzo, come nelle colline di S. Biagio ai piedi del monte di nostra Signora della Guardia. Il colore di questi scisti varia dal grigio di piombo al bruno, ma talora è verdastro e anco rosso violaceo, siccome nel sopraccitato monte della Guardia, e questo accade in ispecial modo, quando è al contatto di certa particolare varietà di roccia serpentinoso, che somiglia ad un *granstein*.

Se sulla destra della Polcevera gli scisti che abbiamo detto appartenere alla formazione del macigno presentano una struttura, la quale indica che sono stati potentemente modificati; sulla sinistra invece di questo torrente, meno per qualche breve tratto, si mostrano sotto un aspetto che lascia un poco più travedere quale fosse il loro stato primitivo; infatti si osservano negli strati di questi sci-

sti, i quali s'incontrano sopra S. Pier d' Arena, la costa di Riva-
rolo e la valle della Secca, delle parti ove ancora le fogliette di
mica ed i granellini arenacci del maeigno sono riconoscibili e si
vedono pure con essi dei banchi alternanti del maeigno medesimo,
rosicchè rimontando dagli strati inferiori ai superiori, si giudica che
questi scisti lucidi passano a delle vere ardesie o lavagne e quindi
alla calcarea argillosa compatta con fucoidi. Si è per l'appunto in
un banco di un'arenaria o maeigno a grani fini, nerastro, ferrifero
presso dei banchi di questi scisti e al disotto della calcarea a fu-
coidi, che ho trovato presso sant'Orese un unico vestigio di am-
monite, il quale deve riferirsi agli ammoniti della *creta*.

Uno spaccato poi delle montagne soprastanti a Genova, dal letto
della Polcevera, alle vette su cui stanno i bastioni della maggior cinta
della città, dimostra che percorrendo quelle colline da ponente a le-
vante si passa dagli strati inferiori o medii, alla parte superiore della
formazione; così verso la Polcevera si vede che esistono gli scisti
argillosi modificati, i quali sono la parte piuttosto inferiore della
formazione; poi vengono alcuni banchi con tracce di maeigno, in
seguito delle ardesie o lavagne e infine la parte superiore ossia la
calcarea a fucoidi; tutti questi banchi corrono incirea S. S. O. N.
N. E. ed inclinano E. S. E. abbassandosi fortemente in questo senso
di maniera che all'esterno della città cioè nelle colline a ponente della
Lanterna puoi vedere raddrizzati i banchi inferiori dello scisto argil-
loso; tutto il bacino invece e la cresta del contrafforte tra i cui rami
è la città, non che la catena, che dal forte dello Spierone va a
quello del Diamante e quindi alla giogaia centrale, sono formati dalla
calcarea compatta ricca assai di fucoidi, e di certe impronte mean-
driformi che non si saprebbero a che riferire, se non ad impres-
sioni di qualche ammasso di animali vermiformi, oppure anco di
piante di quasi uguale forma; alcune poi di queste ardesie, o parti
scistose ed inferiori della calcarea contenente fucoidi, hanno preso
vicino al forte della Tanaglia un aspetto così levigato e lucido e
quasi taleoso, che assai rassomigliano a quelli scisti della Tarentasia
nei quali le impronte di felei o di altre piante, sono segnate da un
talo lucido ed argentino.

La calcarea delle alture che dominano Genova da ponente, passa
poi a formare anche quelle che stanno a levante della medesima
città ed occupa quasi esclusivamente tutto il tratto di paese, che

estendesi dalla porzione della catena centrale, la quale corrisponde a Genova, al mare, e dalla città al monte di Portofino o al contrafforte di Ruta, oltre cui ancor si prolunga fin verso Chiavari, assottigliandosi però da questo lato assai lo spazio ch'essa occupa, poichè dopo Bogliasco è ridotta ad occupare solamente quanto si estende dalla cresta della catena, che sta lungo la costa, al mare, essendovi in vece più al N. il macigno o i suoi scisti (cioè la parte media o forse inferiore della formazione) nella valle della Fontanabuona e all'origine del torrente Bisagno. In tutto questo tratto di paese la stratificazione è sconvolta; dominano presso Genova in generale le direzioni S. S. O. coll' inclinazione E. S. E., ma progredendo più a levante cambiassi questa, e verso Chiavari i banchi prendono una direzione più volta all' Est ed inclinano in senso contrario a quelli che sono più verso Genova; questi banchi sono poi stranamente contorti e ripiegati, per lo che ove formano delle convessità o specie di cupole, lasciano pur vedere sotto di sè le parti medie della formazione, cioè qualche macigno e delle argille scistose screziate. È poi da notarsi che si è sotto questa specie di cupola, ove sono queste argille screziate or di colore rosso violaceo, ora verdastro, che incontransi tracce di rame e di manganese, non che qualche indizio delle rocce pirogene e particolarmente di una specie di *grunstein*, che altrove pare legata colla serpentina e che direbbesi causa di queste fratture e contorcimenti della stratificazione, non che di quelle sublimazioni di rame e di manganese, che in tali argille screziate, le quali anco talora passano ad un diaspro grossolano, non lungi da Genova si ritrovano. Di questi punti poi in cui la calcarea a fucoidi è stata sollevata in modo da lasciare vedere al di sotto degli archi, che formano i suoi strati, la parte media della formazione del macigno se ne incontrano non pochi nelle vicinanze immediate della città e sono allineati nel senso del S. S. O. al N. N. E. corrispondendo di più queste serie di punti ad una serie di sommità dirette nello stesso modo; così si osservano di queste argille screziate nella valle del Bisagno presso S. Eusebio e Molassana, alla Serra di Bavari, e più in là questi punti, che chiamerò di frattura, continuano a mostrarsi sull' Apennino al colle di *Sanguinolo*, e indi sul pievente settentrionale a Montobbio, alla Casella, ne' monti di Salato e quindi presso alla Rocchetta, seguendo la base occidentale della grande catena secondaria o sperone de' monti di Antola, tutta formata sull' alto, di

calcarea a fucoidi, mentre e da una parte e dall'altra, cioè a ponente e a levante, è dessa sorretta per gran tratto dai banchi medii o inferiori della formazione; è inoltre da notarsi, che geaeralmente questa massa di calcarea a fucoidi, la quale staccandosi da Genova va a traversare la catena dell'Apennino, è la parte meno modificata della formazione, probabilmente perchè più lontana dalle due zone di serpentina, le quali trovaasi a ponente e a levante di que'monti e che sono quasi certamente la cagione delle alterazioni sofferte dagli strati inferiori più a loro vicini; io penso ugualmente che debasi all'apparizione di questa serpentina, attribuire parte di quelle strane contorsioni che gli strati del macigno e più della calcarea a fucoidi hanno in questi luoghi subite, contorsioni che destano l'idea di una massa stratificata, la quale compessa da forte pressione da due lati opposti, si sia nel mezzo ripiegata in varii sensi, venendo i fogli o gli strati, di cui era composta, a formare per così dire sovente delle curve che volgono a vicenda all'orizzonte la loro convessità o la loro concavità, oppure anco a presentarsi sotto l'aspetto di strati stranamente rotti e ripiegati a modo di zigzag, come ve ne è un bellissimo esempio al monte Candeezzo, dalla cui cima alta più di 1000 metri sul livello del mare, si vede uno strato della calcarea che scende fino al fondo della valle, forse non più alta di 120 metri dal mare, e forma una linea spezzata in cinque o sei punti le cui diverse porzioni hanno un'inclinazione opposta a quella della porzione immediatamente vicina.

I geologi della Toscana indicano in varii pupti di quella regione superiormente alla gran massa della calcarea a fucoidi, certi banchi (i quali pur legano con essa) di macigni e di calcarea Alberese, contenenti delle foraminifere e delle speciali nummuliti, e come esempi di questa riunione di strati, citano le vicinanze di Mosciano presso Firenze e le alture della Consuma verso il Casentino; di questi due punti io non ho visitato che la sola località di Mosciano, e posso dire, che niente di analogo ho io ritrovato sopra la calcarea a fucoidi delle vicinanze di Genova, cioè posso assicurare che nelle parti da me vedute in Liguria, le conchiglie foraminifere non sembrano esistere in una formazione, la quale sia legata superiormente colla calcarea a fucoidi; ma che in vece esistono in quelle rocce elastiche ossia in quelle pudinghe e molasse che soprastanno ben anche a questa calcarea medesima, ma che ne contengono dei numerosi fram-

menti rotondati, siccome anco contengono dei ciottoli di serpentina e che tutto indica doversi separare dalla calcarea medesima per riportarli in una divisione superiore e riunirli forse ai terreni dell'epoca terziaria. Non tacerò nondimeno a questo proposito un dubbio il quale mi viene in mente, rivangando le poche memorie che mi restano di quando visitai quella località di Mosciano, ed è questo cioè, che non saprei come si possa dire quel granitello, come chiamano questa speciale varietà di macigno, superiore alla calcarea a fucoidi, la quale non far che si mostri in quelle vicinanze, ma piuttosto potrebbe dirsi in vece legato colle argille sereziatè e con certi macigni non di là lontanissimi, a meno che, fatta del granitello nummulitico di Mosciano una speciale divisione, non si stacchi dai macigni della vicina regione e non si approssimi ai terreni terziarii che pur non ne sono lontani e di cui formerebbe la base, come quasi ne può suggerire il pensiero quella puddinga con frequenti ciottolini di quarzo e di altre rocce detta dai toscani *pietra morta* che prima di giungere alla cava del così detto granitello di Mosciano, sembra ad essa sottostare.

Chechè ne sia di questi miei dubbi, posso dire che nelle vicinanze di Genova non vi è traccia di una roccia a foraminifere superiore alla calcarea a fucoidi, e con essa legata in modo da farla ancor riguardare come appartenente alla stessa divisione; ma che quelle foraminifere che presso di noi si ritrovano, sono invece nelle puddinghe e nelle mollasse, che tutto tende a far separare da essa calcarea a fucoidi e porre invece alla base della formazione terziaria.

La calcarea a fucoidi poi che abbiamo veduta estendersi da Genova a Chiavari lungo il mare e formare nell'interno delle terre porzione della catena centrale e i monti d'Antola e il Penice, si estende molto lungo la pianura Lombarda, formando delle isole in mezzo ai terreni terziarii nel Tortonese e costituendo un'estesissima zona nel Vogherasco, nel Piacentino e nel Parmigiano, ove parte della valle della Trebbia, di quella della Nura, tutta quella dell'Arda, gran porzione di quelle del Ceno e del Taro sono escavate in tal parte della formazione del macigno. Lungo il litorale essa termina verso Chiavari e le sottentra una massa di seisto calcareo ardesiaco, che fornisce le tanto famose pietre di Lavagna; una zona di quelle ardesie accompagna sempre inferiormente la calcarea a fucoidi a partire da Chiavari, tornando verso ponente, rimontando la riva des-

tra del fiume della Fontanabuona e occupando la parte Nord della catena longitudinale, che sta tra questo fiume e il mare, cosicchè risalendo questa vallata, si vedono i banchi dell'ardesia immergersi sotto le calcaree a furoidi e passare sotto di esse in modo tale da ricomparire anco talora all'origine dei piccioli torrenti che scendono da questa catena direttamente nel mare, come accade nel canal di Rapallo, nell'alto del così detto fiume di Recco e come si vede perfino all'origine del Bisagno: onde da tutto questo la posizione precisa dello scisto ardesiaco di Lavagna resta fissata inferiormente alla calcarea a furoidi e superiormente, come ora vedremo alla massa del macigno, che s'incontra assai presto andando più verso levante.

Si è passato il paese di Lavagna e prima di Sestri a levante, che s'incontra una grande massa di macigno ben caratterizzato e a tessitura un po' grossolana, che tutto conduce a pensare passi sotto le ardesie che le stanno più a ponente; di ugual macigno con qualche strato alternante di un'argilla scura è formata anco la vicina penisola, detta Isolotto di Sestri, e dentro le terre da una parte la formazione del macigno colle sue argille e scisti alternanti si estende a ponente e tramontana, passando nella valle della Sturla verso Borzonasca e sui monti di Licciorno e di *Lavagneura* donde progredisce in val di Trebbia e in val d'Aveto, e da levante passa a formare la punta di Manara, quella di Moneglia le gole di Trigoso, e occupando quella porzione della montagna del Braeco che non è stata invasa dalla serpentina, si estende nella vicina valle della Vara e verso il mare al capo del Mesco, e quindi nella massima parte della catena che costituisce la costa presso le Cinque Terre, alla cui estremità orientale subentrano poi ad esso macigno i terreni più antichi delle vicinanze della Spezia.

Nelle parti della riviera di Levante, che non sono lontane da Sestri, come a principiare dai paesi di Castagna presso Framura, venendo ai monti di Bargone e quindi a quelli di S. Bernardo fin quasi presso Varese, regna poi in mezzo, o meglio si direbbe nella parte inferiore della formazione del macigno, una massa di una calcarea ora compatta, ora alquanto cristallina, talora alquanto sificea, la quale è in contatto con molti banchi di diaspro rossiccio e verdastro, alle quali tinte partecipa pure detta calcarea, sebbene sia anco in altri punti bigia e più sovente di un bianco sporco di giallo; questa calcarea e questi diaspri sono certamente modificazione di rocce in origine

di aspetto diverso, come lo sono anco numerose masse di un miscuglio inforine di frammenti di scisto indurito, legati ed impastati da una specie di roccia che tiene della serpentina e del *grustein*, impasto a cui in Toscana par si sia dato anco il nome di gabbro e forse più particolarmente quello di gabbro rosso, siccome quelle calcaree e quelle argille indurite e scistose, e certi diaspri non ben caratterizzati hanno ricevuto il nome di terreni galestrini.

Ora pare che queste calcaree sebbene della formazione del macigno, debbano riferirsi alla parte inferiore e ben potrebbero rappresentare le calcaree indicate in Toscana come immediate inferiormente al macigno e alle argille screziate. La catena dei monti in cui sono queste masse di calcarea notabilmente modificata, è sensibilmente diretta dal N. al S., piega però alquanto nell'Est, quando le masse si avvicinano al mare, cioè verso Castagna e Framura: ma tutto quivi è sconvolto dalle enormi montagne di serpentina e di enfotidè che regnano a partire da Lévanto e quindi vanno al Braeco e circondano e traversano in varii sensi quelle masse calcaree e i vicini scisti e macigni. Ma non ovunque però è così irregolare la stratificazione, giacchè più verso le Cinque Terre, ove la serpentina è più lontana, riconoscere si possono le direzioni e le inclinazioni dei varii banchi del macigno e delle argille e scisti con esso alternanti.

Partendo da Vernazza lungo il mare per andare verso la valle della Vara si hanno dapprima degli strati assai contorti di un macigno bruno micaceo con fucoidi, i quali banchi inclinano nel Nord qualche grado all'Est, cioè che sembrano immergersi sotto la catena de' monti che sovrastano a questo paese; tali macigni sono accompagnati un poco più sopra, da argille e da scisti argillosi con qualche picciolo letto calcareo il tutto di un colore bruno oscuro. Salendo la montagna questi strati che pendevano fortemente verso l'interno della catena vanno raddrizzandosi e presso alla cima della catena diventano verticali; scendendo poi nel bacino o piovente della Vara, ossia seguitando un rivo affluente del canale di Pignone, vedesi che gli strati di analoga natura, cioè del macigno, pendono in un senso opposto, ossia nel S. qualche grado all'O., e pertanto verso il mare, essendo così quella serie di banchi disposta a modo di ventaglio. Continuando poi a scendere lungo questa valle si osservano ancora varie alternative di scisti bruni, che hanno l'aspetto

di ardesie, di macigni a grani di media grossezza e di altri macigni a grani più grossolani che contengono frammenti di una specie di scisto nero: sotto questi macigni vi sono degli altri scisti e più nel basso questi stessi scisti, i quali cambiano di colore, diventando verdorossicci, cominciano ad alternare con banchi di calcarea compatta dello stesso colore o alquanto giallognola, la quale inclina al S. pochi gradi all' O., ed infine s'appoggia sulla calcarea dolomitica, che trovasi presso Pignone, la quale è continuazione di quella della Castellana ed è di una formazione più antica che il macigno, appartenendo essa al terreno giurassico.

Questo contorcimento degli strati del macigno bruno e questo vederli costantemente, nei luoghi ove si può accertarne la superposizione, superiori alla calcarea dolomitica e altre calcaree e rocce ad essa connesse, a malgrado che in alcuni punti come presso Campiglia abbia l'apparenza di passare al di sotto, è una non dubbia prova che desso è realmente superiore alla calcarea medesima, e che male il Delabèche ha creduto ch'esso fosse inferiore alla stessa e che così appartenesse all'epoca giurassica od anche a formazione più antica, mentre invece esso fa parte della complessa e grande formazione del macigno, siccome anco dovevano farlo sospettare i fucoidi in esso contenuti, i quali sono identici con quelli che si frequentemente s'incontrano nella calcarea a fucoidi delle vicinanze di Genova, cioè nella parte superiore della formazione. Oltre lo spaccato che abbiamo indicato, dalla parte di Vernazza, un altro condotto dalla punta del Mesco al picciolo paese di Cassana darebbe lo stesso risultamento:



Il macigno M, lo scisto bruno S, l'ofiolite O, la calc. compatta C.
Dal capo Mesco a Cassana verso la valle della Vara.

soltanto in quest'ultimo spaccato non si possono vedere inferiormente le masse dolomitiche, le quali partendo da Porto Venere fin qui non

giungono, ma solamente quelle parti calcaree che stanno sopra di esse le quali, quasi a dinotare che ricoprono una massa sottoposta che tutta circondano, hanno i loro strati arcuati, pendendo dapprima O. 7.^o S. e tosto dopo E. 7.^o N. essendo poi da una parte e dall'altra ricoperti dai banchi del macigno, che seguono incirca le stesse inclinazioni, e di cui essi banchi calcarei possono essere la parte inferiore, se già non appartengono ai terreni giurassici, che loro sottostanno.

Da queste vicinanze delle Cinque Terre, la formazione del macigno va ad occupare le montagne che circondano la parte più interna del bacino del golfo della Spezia e quindi continua nelle valli della Vara e della Magra e sulla catena centrale, formando tra gli altri il monte Goto che supera l'altezza di 1600 metri. In alcuni punti però, come verso il colle delle Cento Croci pare che si presenti quel membro della formazione che contiene maggiori quantità di masse calcaree. È poi non lontano da questi luoghi che vedonsi molte di quelle interessanti modificazioni delle argille o scisti del macigno per le quali, queste sono diventate masse di bellissimo diaspro di svariato colore; ve ne sono degli esempi famosi presso la Rocchetta di Cravignola, località descritta del Brongniart ove si vede l'azione delle serpentine e dell'eufotidi su queste argille, e ove si escava una miniera di manganese, e ove sono pure tracce non ispregevoli di rame.

Dai pochi cenni che abbiamo or dato sulle diverse località della riviera di Levante, ove si mostrano il macigno e le sue modificazioni, parmi che possa concludersi che quivi presso a poco ci presenta le stesse apparenze e le stesse suddivisioni che sono state riconosciute dal Savi in Toscana e che ho io pure presso a poco indicate in due spaccati dell'Apennino toscano e modenese, cosicchè si vede che qui pure esistono quelle calcaree inferiori rappresentate dai banchi delle vicinanze di Cassana e di Bavarone, e forse da quelli di Castagna; che vi sono ugualmente quegli scisti bruni argillosi con noduli calcarei e quasi pezzi di strati calcarei spezzati e avviluppati dallo scisto, come per esempio nelle vicinanze di Materana; che le argille screziate regnano in molti punti, che il banco o massa più potente di macigno duro, più o meno fino o grossolano, spesso quarzoso, si mostra abbondantemente dietro la Spezia, in val di Vara al capo Mesco e in altri punti; che finalmente la calcarea a fucoidi, parte

superiore della formazione occupa le immediate vicinanze di Genova e qualche breve tratto dei monti della catena centrale, che sopra-
stanno alla valle della Vara. Da queste medesime osservazioni poi
anche risulta che questa massa della formazione del macigno e della
calcareia a fucoidi in riviera di Levante non è dissimile da quella
di Ponente, giacchè in ambe e circa con lo stesso ordine, si trovano
le stesse suddivisioni; soltanto in riviera di Levante, e nelle vici-
nanze immediatamente a ponente di Genova le modificazioni subito
dalla formazione del macigno sono più importanti e più radicali,
e questo per le enormi masse di serpentina e di rocce congeneri
che in questa parte dell'Apennino ligure hanno traboccato alla su-
perficie, mentre nell'ulteriore riviera di Ponente e nel contado di
Nizza, la quasi assenza delle rocce di trabocco in mezzo a questa
formazione, ha fatto sì che i suoi componenti siano molto meno
alterati. Un'altra differenza evvi poi tra le due masse, e si è che
nella riviera di Levante non è provato ancora che vi siano inferior-
mente al macigno dei banchi contenenti delle nummuliti siccome
accade in ponente, il che se la cosa è così, potrebbe essere un ar-
gomento in favore di quelli che i banchi nummulitici vorrebbero
riguardare come della formazione del macigno indipendenti. Nondimeno siccome delle masse nummulitiche sono indicate nelle vicinanze
dell'Eremo di Calemizi nella Garfagnana e superiormente alla cal-
careia più antica delle Alpi Apuane, così l'assenza delle nummuliti
nei limiti entro cui si prolunga la massa del macigno della riviera
di Levante non può dirsi assoluta, rimarrebbe solo a vedersi, cosa
che io non posso verificare, se le nummuliti poi indicate nella su-
accennata località, che io non ho visitata, siano realmente quelle
che stanno nella parte inferiore della grande massa della formazione
del macigno, o pure se siano di quelle nummuliti che sono associate
alle foraminifere in quei banchi arenacei o aneo calcarei che in
Toscana sono stati distinti col nome di macigno superiore.

Al qual proposito è da notarsi che fino al momento in cui non
si abbia un'esatta e precisa monografia del genere *nummulite* nella
quale siano bene indicati i caratteri che debbono servire a distin-
guere le diverse specie, non sarà possibile di poter dire qualche
cosa di preciso sui terreni in cui esse sono contenute (deducendone
la classificazione dalla loro presenza), poichè sebbene si possa quasi
dare per certo che vi siano di questi corpi organici in diverse sud-

divisioni di terreni, pure fino adesso non è ancora ben stabilito quali specie siano peculiari a questi diversi strati o anco formazioni; così infatti soltanto qui in Liguria o in regioni immediatamente vicine, possono indicarsi quasi tre divisioni di banchi nelle quali trovansi delle nummuliti; dapprima se ne trovano nel contado di Nizza e nel dipartimento del Varo associate con ippuriti, con terebratule ecc., in banchi che debbono probabilmente riferirsi alla creta verde o al *greensand*; poi ne esistono alla base del macigno e in alternativa, siccome abbiamo già detto, coi banchi suoi inferiori; poi infine in varii punti della Liguria se ne trovano in un terreno superiore alla formazione del macigno e della calcarea a fucoidi, di cui contieue numerosissimi frammenti, e quivi sono associate alle operculine e a molti altri fossili, tra i quali è un ostrica che si accosta assai ad una grifea non dissimile molto dalla *grifaea columba*. Siccome anco vi sono presso Nizza altre nummuliti colla succitata *operculina* e con un corpo ragguagliato dapprima al *Lituolites Nautiloideus*, ma che realmente pare piuttosto essere la *Serpula Spirulea* di Bronn, in un terreno diverso da quello ove sono le altre nummuliti, e certamente per la sua posizione a lui posteriore.

Con queste difficoltà dipendenti dalla non facile determinazione delle diverse specie delle nummuliti e con la scarsezza di altri fossili (de' quali alcuni sono nuovi) che si rinvencono assieme a loro nella formazione del macigno, non mi accingerò a discutere qual sia la sua vera posizione sull'orizzonte geologico, il che sarebbe anco fuor di proposito nei brevi confini entro cui dobbiam tenere questa nota geognostica sulla Liguria; dirò soltanto che non posso decidermi a crederlo terziario, ma che lo reputo bensì parallelo alla parte superiore del terreno cretaceo: siccome invece propenderei a credere di preferenza terziarii quei banchi di mollassa e di pudinga con ciottoli di ofiolite e di calcarea a fucoidi nei quali sono le nummuliti accompagnate dall'*operculina complanata*, siccome anco sarei tentato di riporre nello stesso periodo, ma con dubbio, quegli altri banchi del contado di Nizza nei quali le nummuliti sono associate alla medesima *operculina* e di più alla *Serpula Spirulea* di Bronn, trovata già in altre località in analoghi terreni, sull'età de' quali verte questione, come sarebbe al Cressenberg e a Biaritz.

TERRENO CRETACEO INFERIORE
E TERRENO DELLA CALCAREA GIALLA O NEOCOMIANO.

Sotto una sola divisione noteremo questi due terreni sebbene distinti, e ciò per non oltrepassare i ristretti limiti assegnati ad una nota destinata soltanto a dare una breve descrizione della Liguria.

Delle marne e delle calcaree argillose sovente con punti verdi, ossia con grani di glauconia, poche arenarie, delle calcaree compatte con rari amoni silicei, sono i banchi principali che costituiscono il terreno cui assegniamo il nome di cretaceo inferiore, il quale nondimeno è il più recente tra i due compresi in questo capitolo; l'altro invece, detto della calcarea gialla, che sta sotto al primo, essendo in generale composto, e quasi esclusivamente, di una calcarea di color giallo chiaro, ossia lionato, sovente compatta, ma talora anco un poco cristallina; con questi banchi ve ne sono dei dolomitici.

Ambi questi terreni coi loro caratteri distintivi pare si limitino (nella Liguria marittima, come l'abbiamo definita) alla contea di Nizza, e direi quasi alla parte più meridionale della medesima, non vedendosi il terreno della calcarea gialla molto più in su, nelle terre, che il confluenza della Vesubia e del Varo, donde si protende verso ponente nelle montagne del dipartimento francese che porta il nome di quest'ultimo fiume, e verso levante giungendo soltanto ai monti che sono al N. di Mentone, mentre lungo il mare mostra l'ultimo suo lembo al capo dei Baussi rossi presso il ponte S. Luigi all'E. di Mentone. Il terreno però, da noi chiamato cretaceo inferiore, sembra avere invece maggiore estensione, girando intorno a molti dei massi del precedente terreno od occupando certi bacini o seni che sono in mezzo al medesimo e giungendo poi a contatto di altre calcaree più antiche, le quali appartengono alle formazioni giurassiche, ben su alto nella valle della Tinea, donde passa in quelle del Paglione e della Vesubia, giungendo anche per qualche tratto fin presso la destra sponda della Roia, a levante del qual fiume non più si mostra, almeno con caratteri tali da farlo indubitabilmente riconoscere.

Sul contrafforte che sta tra la Tinea e la Vesubia, non lungi dal

luogo detto S. Dalmazzo il Piano, comincia questo terreno di calcarea argillosa bigia-scura con punti verdi e fossili caratteristici della ereta come inoceramî, particolari belemniti, ecc., e quivi riposa sulla calcarea nera compatta delle montagne che stanno al N. di questo villaggio, che tutto dimostra doversi riferire alla calcarea giurassica e più specialmente al *Lias*. Da questo punto, meno alcune cime formate dal superiore terreno di maeigno, venendo verso mezzogiorno, esso terreno cretaceo costituisce la massima parte di tal contrafforte, finchè giungendo ad Uelle si vede appoggiato contro un monte prominente della calcarea gialla, la quale quindi, direi però con molte interruzioni, si prolunga verso il mare, sulle cui sponde da Nizza a Mentone forma molti dei balzi che si protendono sul mare medesimo.

A Uelle le marne e le calcaree argillose del terreno cretaceo, che si appoggiano immediatamente sulla calcarea gialla, sono abbondantissime di glauconia e contengono tra gli altri fossili molte belemniti, siccome la calcarea gialla inferiore contiene quivi delle conchiglie univalvi, ma poco riconoscibili, che sembrano corrispondere ai generi *Cerithium*, *Turritella*? *Natica* o *Ampullaria*. Passano poi queste marne e queste calcaree argillose dalla parte di Lantosca, e quindi continuano nella valle del Paglione, ove però non occupano che le parti basse, e poi in quella della Bevera, lungo la quale, presso Sospello, sono ricche in glauconia e abbondanti di fossili come ammoniti ed echiniti, e quindi seguendo detto torrente giungono quasi al suo confluyente colla Roia, girando intorno al masso di calcarea gialla della sommità del Gran Mondo, e interponendosi tra questa calcarea e la calcarea nummulitica al luogo detto Colla Bassa, e infine presso al mare alle Grimalde tra Mentone e la Mortola. In certi punti di questi dintorni la glauconia è così abbondante, che la parte calcarea e marnosa non è più che la parte accessoria e quasi il sugo lapideo che lega tra loro i grani di glauconia; in questo stato tale roccia corrisponde precisamente al *green sand* degli inglesi. In alcuni luoghi pure, come forse nelle vicinanze di Uelle e in quelle del colle di Brois, può sospettarsi che i banchi calcarei di questa formazione siano quelli che sono stati mutati in gesso e nella concomitante *rauchwacke*. Lungo il mare questa formazione della ereta verde si vede poi presso la penisola di sant'Ospizio ove si è rinvenuta la *grifone columba*, e assai sovente si traversa lungo la

strada che conduce da Nizza a Vintimiglia. Pare che i banchi di calcarea argillosa e di marna con punti verdi occupino la parte inferiore, e sovente quasi nasce il dubbio che possano essere legati colla sottoposta calcarea gialla, sebbene molte altre considerazioni, che sarebbe inopportuno il particolarizzare, debbano indurre a farne una cosa separata. Questo avvicinamento delle calcaree argillose a punti verdi con la calcarea gialla compatta non si limita alla contea di Nizza, ma si presenta frequentemente nei monti che stanno sopra Grasse e Vence nel dipartimento del Varo, ove quasi si direbbe che vi è un passaggio tra le masse potentissime della calcarea gialla e i banchi di marna e calcarea argillosa con glauconia contenenti picciole grifee (forse *griphyæa secunda*), la *Griphæa Columba*, delle terebratule, qualche belemnite, e forse delle nummuliti, disposti in piccioli lacinii in mezzo a detta calcarea. Questo avvicinamento si presenta pure più a ponente tra Tolone e Marsiglia, ove colla calcarea argillosa, o in banchi con essa associati, sono pure delle ip-puriti, le quali, sebbene la formazione sia identica, non so precisamente che siano state trovate nel contado di Nizza.

Più a levante che il luogo detto le Grimalde presso Mentone non è, a mia cognizione, che si sia incontrata con i suoi caratteri distintivi questa formazione, la quale, siccome quella della calcarea gialla a lei sottoposta, non si vede di qua dal Varo che nel tratto più meridionale della contea di Nizza: regione che ha un aspetto suo particolare, e in cui si ripetono quelle apparenze stesse e quelle relazioni che si osservano in una parte della Provenza, e più al N. in Francia in quella zona di montagne che può chiamarsi la prolungazione della catena del Giura, come sarebbero i monti Ventoux, alcuni delle vicinanze di Grenoble, i monti della grande Chartreuse e altri non lungi da Chambéry, coi quali molte delle montagne della parte, dirò marittima, della contea di Nizza hanno una grande analogia, mentre la parte settentrionale della contea medesima e tutto quello che sta a levante del corso della Roia, presenta invece più analogia con certe parti delle Alpi.

Non pochi fossili appartenenti a questa formazione sono stati ritrovati nella contea di Nizza, ma generalmente, non essendo molto conservati, non sono stati determinati che in picciolo numero.

Il professore Sismonda vi cita tra gli echiniti

<i>Holaster suborbiculatus</i> , Agas.	<i>Anaschyles ovalis</i> , Lamé.
<i>Miraster arenatus</i> , Agas.	<i>Disroides rotunda</i> , Agas.
<i>Miraster cor-angium</i> , Agas.	<i>Galerites castanea</i> , Agas.
<i>Miraster gibbus</i> , Agas.	

Tra gli ammoniti vi cita lo stesso professore

<i>Ammonites Montellii</i> , Sow.	<i>Ammonites Rhotomagensis</i> , Br.
<i>Ammonites sulcatus</i> , Mantel.	—

Vi sono inoltre

<i>Turritites Bergerii</i> , Brong.	<i>Inoceramus mytiloides</i> , Mantel.
<i>Turritites undulatus</i> , Sow.	<i>Griphaea columba</i> , Lamé.
<i>Inoceramus Cuvierii</i> , Sow.	<i>Terebratula subrotunda</i> , Sow.
<i>Inoceramus pliratus</i> , D'Orb.	<i>Terebratula ovoides</i> , Sow.

Quanto alla formazione della calcarea gialla, essa pure ristretta tra noi alla contea di Nizza, donde si riattacca alla catena del Cheiron nel dipartimento del Varo, e ad altri monti che girano intorno al massiccio più antico, che sta tra Antibò e Tolone, poco potrò dire di più di quanto già ne ho detto avendone indicata la posizione come immediatamente inferiore alla formazione della creta verde, da cui in generale è distinta per l'aspetto e la qualità delle rocce, e anco per una tal quale discordanza della stratificazione, ma eziandio pel suo presentarsi ordinariamente con forme più massicce nelle quali la stratificazione suole essere meno marcata. Serve anco a far riconoscere da lungi questa formazione, il terriccio di color quasi rosso che ricopre le calcaree ad essa appartenenti.

Ad essa appartiene la rocca su cui era l'antico castello di Nizza, e in mezzo a cui sono le famose breece ossifere, già da noi precedentemente descritte; ad essa pure appartengono i monti tra Nizza e Villafranca e l'estremità del capo sant'Ospizio. Da Utelle ove l'abbiamo indicata, la medesima formazione, dopo aver formate le gole di Duranus, passa sulla sinistra della Vesnbia, ove costituisce per la massima parte il monte Ferion e le alture sopra Levens non scarse di masse dolomitiche, quindi continua ad Aspramonte, formando la cresta che corre tra il Varo e il canale di Contes, affluente del Paglione, per mostrarsi anco non lungi da Nizza in mezzo ai terreni terziari che stanno sulla destra di quest'ultimo torrente. Un gesso

quasi saccaroide si mostra ai piedi di questa zona verso il Varo, al luogo detto la *Ville Vieille*, e ve ne è anco immediatamente presso Nizza stessa. Ma oltre questa zona di calcarea gialla che abbiamo indicata, un'altra ancora se ne può tracciare più a levante nella contea di Nizza; di essa potrebbe fissarsi l'origine presso Sospello ove abbonda il gesso e la *raucheake* o calcarea porosa ricoperta dalla calcarea compatta; quindi andando a mezzogiorno essa forma, come già abbiain detto, il Gran Mondo, e dividendosi in numerosi rami corre da un lato verso Peglia e Montalbano, ossia verso i monti sopra Nizza e Villafranca; si volge anco alla Turbia e Monaro, e più direttamente d'altra parte va a finire al Garavano, ai pittoreschi dirupi del ponte S. Luigi presso i Baussi rossi, nel qual luogo sono molte caverne e fenditure che sembrano talora uno dei caratteri di questa formazione; in quella località, non lungi da queste caverne, vi sono delle sperie di masse ferruginose, e la calcarea che sta loro daccanto sembra più cristallina; si direbbe quasi che alcune di queste grotte o caverne sono state prodotte dalla decomposizione di queste parti ferruginose. Le parti di calcarea dolomitica sono poi non rare in tutta la formazione. Quanto ai fossili questa calcarea gialla assai ne srarseggia; nella contea di Nizza vengono però citati i seguenti:

Belemnites dilatatus. Blain.

Ammonites virgatus. De Buch.

Aptius Diday.

Ammonites ixion. D'Orb.

Ammonites subfascicularis? D'Orb.

Inoltre in Francia, nelle montagne che possono dirsi continuazione di quelle della contea, si sono trovati altri fossili i quali rinvalidano l'opinione di trasportare questa calcarea da una delle ultime formazioni giuresi, alle quali fino ad ora si era riferita, nella formazione della calcarea neocomiana, la quale si lega di più colle formazioni cretaee.

Anco di questa formazione della calcarea gialla, siccome di quella della creta inferiore, che è a lei più vicina, non è possibile di rinvenire distinte tracce in Liguria più a levante delle vicinanze di Vintimiglia, ed è soltanto nello Stato pontificio e ai confini del regno di Napoli che possono trovarsi strati veramente riferibili a lei, siccome anche se ne rinvencono forse sul piede delle Alpi lombarde, ove è la creta inferiore, e ove anco sono le nummuliti, le quali,

sia detto qua di volo, sono state trovate dal prof. Balsamo associate a dei catillus. Il che vien in conferma dell'opinione, che vuole essere il terreno nummulitico quello del macigno e calcarea a fuocidi, con lui superiormente collegato, ancora appartenente alla creta, bensì alla parte superiore di essa, ma non ad una divisione del terreno terziario.

TERRENO DELLA CALCAREA GIURESE.

Il terreno di cui in ordine discendente, cioè andando dal più moderno al più antico, ci tocca ora di favellare è quello che può riguardarsi tra noi come il rappresentante di una o più delle suddivisioni che costituiscono la formazione giurassica, e che pertanto chiameremo il gruppo della calcarea giurese. Si può dire che diverse varietà e modificazioni di tale roccia formino essenzialmente la parte costituente di questo gruppo, il quale ha una parte assai importante nella costituzione geologica della Liguria.

Le principali varietà di calcarea che s'incontrano in una tale riunione di banchi, sono delle calcaree compatte a tinte più o meno grigie, sovente molto oscure e traversate da vene spatiche. Delle calcaree semigranulari di colore ugualmente grigio e più o meno massicce, talvolta poi molto screpolate; qualche calcarea mista ad un poco di argilla e alquanto scistosa; delle calcaree dolomitiche grigie e bianche; delle calcaree granulari o marmi quasi statuarii che forniscono materia a molte escavazioni e le cui varietà sono conosciute sotto il nome di marmo statuario ordinario, di bardiglio, ecc.

A queste numerose varietà di calcarea si associano altre modificazioni, ossia altre roccie, come sarebbe la calcarea porosa, ossia *rauchwacke*, alcune specie di breccie calcaree, le argille scistose o scisti argillosi, il gesso, ecc., modificazione quest'ultima, siccome anco la dolomite e la calcarea porosa o *rauchwacke*, sopravvenuta posteriormente alla formazione di quegli strati, e dovuta ad alterazioni cagionatevi da agenti ignei che hanno cambiato l'aspetto delle rocce su cui agivano. Oltre gli strati sopraccennati vi son anco, in picciolissima quantità e non frequenti, dei banchi alquanto arenacci.

La struttura in grande di questo gruppo è generalmente massiccia e pare che in non pochi punti la stratificazione sia molto confusa e scomparisca assolutamente, là in particolar modo, ove regnano le grandi masse dolomitiche e le calcaree saccaroidi. Queste rocce

calcaree giungono poi ad una grande elevazione giacchè toccano la altitudine di 2600 metri e più, sia nel contado di Nizza, come presso Raus, sia nelle montagne alle sorgenti del Tanaro, come al Carsino.

I fossili sono generalmente rari in questo gruppo; la dolomitizzazione o l'aspetto granulare di certi strati fanno sì che ogni traccia ne sia scomparsa, oppure sia così alterata da non permettere di riconoscere ordinariamente a quale genere o a quale specie abbiano appartenuto i pochi che se ne trovano; nondimeno nelle calcaree del contado di Nizza e in altre delle vicinanze della Spezia si sono trovati certi resti organici, i quali permettono di riporre senza alcun dubbio alcuni tra questi banchi nel *Lias*; in generale gli strati che contengono principalmente resti organici, sono certe calcaree compatte grigie e soprattutto gli strati scistosi.

I minerali accidentali che vi si ritrovano più frequentemente sono il ferro solforato, la grammatite, degli arnioni di selce, il quarzo; in altri luoghi si trova con loro del talco e della mica quando certe calcaree granulari passano al cipollino o che vi è associato con loro qualche poco scisto talcoso.

Le montagne formate dalla calcarea di questo gruppo hanno in generale forme molto pronunziate, sollevandosi a modo di guglie, ora a quello di alte muraglie: la loro superficie è nuda ed aspra, ed è in mezzo a loro che vedonsi in maggior numero le grotte o caverne, e quelle cavità imbutiformi che danno esito per mezzo di voragini a numerosi corsi di acqua. Queste voragini, che corrispondono ai *katavroton* dei greci, vengono chiamate sprugole nelle montagne delle vicinanze del golfo della Spezia, ove sono assai frequenti.

Di questa formazione si può cominciare ad indicare la presenza colà dove abbiamo quasi fissato l'origine della catena che forma al N. il limite della Liguria marittima; infatti là non lontano dalla cima del Lauzanier e sotto ai terreni cretacei dei quali la predetta cima è composta, si vedono presso il colle di Ponriac delle calcaree e del gesso, che sembrano appartenere a questo gruppo; da questo colle scendendo verso il Mediterraneo, e perciò seguendo il corso della Tinea, gli strati calcarei stanno un poco discosti sulla dritta di questo fiume; soltanto i gessi e le *rauchwacke*, che spesso occupano la parte più bassa, e quasi al contatto della roccia arenacea, ossia del verrucano alla calcarea inferiore, si accostano di più alla sponda della Tinea, mentre la calcarea dal lato di S. Dalmazzo il Selvag-

gio si estende verso le sorgenti del Varo e del Ciaus, passando vicino alla cresta che separa quest'ultimo dalla valle del Roubion, affluente della Tinea, e quindi viene a tagliare quest'ultimo fiume poco sotto S. Salvatore, presso il qual villaggio masse di gesso saccharoide, non divise in istrati e accompagnati da calcarea porosa si mischiano, e per così dire penetrano a traverso i banchi di una calcarea compatta grigia, ma di colore fosco che ben si può dire continuazione di quella che forma parte della catena che sta a destra della Tinea, nella quale si è rinvenuta la *griphyæa arcuata*, e che pertanto si è in diritto di dichiarare contemporanea alla calcarea con numerose grifee e con moltissimi altri fossili caratteristici del *Lias*, che trovasi in abbondanza e per grande estensione di paese in regioni poco da questi luoghi discoste, come sono le vicinanze di Castellane e quelle di Digne nel dipartimento delle basse Alpi.

Sulla sinistra poi della Tinea vi è ancora del gesso e della *rauchwacke*, e quindi superiormente della calcarea compatta nera dura con parti speculari più intensamente oscure che la pasta in cui si trovano. Queste calcaree sono in banchi mediocrementemente potenti che sembrano diretti a un bel circa S. O. N. E.; inclinando S. E. pare che non si estendano quivi per molto tratto, giacchè poco più a mezzogiorno che Rimplas e la Bolina le montagne che vanno verso Maria sono formate dai terreni cretacei, siccome anche quelle che sono a mezzogiorno di S. Dalmazzo il Piano. La calcarea giurese continua in seguito verso la Vesubia, e si cammina in gran parte su questa formazione quando si scende da S. Dalmazzo a S. Martino di Lantosca, quindi essa segue la destra sponda della Vesubia, ma sta soltanto alle falde della catena che fiancheggia da questa parte il detto fiume che traversa poi verso Bollena e Rocca Bigliera; in queste località sono frequenti le masse di gesso e di *rauchwacke*. Dalla Vesubia la detta formazione sale sul contrafforte che è tra essa e la Roia, e giunge al colle di Raus ad una notevole altezza. Daccanto a questo passo si vedono, andando dagli strati inferiori ai superiori, dapprima le arenarie e gli scisti della formazione arenacea rossa, ossia del verrucano, poi un potente banco non totalmente regolare di una roccia porosa contenente frammenti di diversa natura, la quale è una *rauchwacke* ben caratterizzata, dei gessi, quindi una roccia calcarea grigia-scura con numerose mandorle o noccioli di calcarea cristallina o granulare bianca, ch'è anco forse dolomi-

tica, il che ha l'aspetto di un'amigdaloidale calcarea, poi della dolomite bianca distintamente cristallizzata, e infine della calcarea compatta e altra semigranulare e screpolata di un colore scuro. Questa calcarea continua quindi da un lato lungo il vallone di Cairus che scende dalle alture di Raus verso Saorgio, si mostra nelle vicinanze di Breglio, accompagnando dal primo dei due paesi al secondo, il corso della Roia, sulla cui sinistra si estende qualche tratto anco lungo il canale di Saorgio; dall'altro lato corre verso le alture del Fontan, e occupando in continuazione e in amonte del massiccio di Saorgio ambe le rive del fiume, va alla Briga, e quindi seguitando al N. occupa nuovamente le due sponde del fiume che pel tratto dal Fontan a S. Dalmazzo aveva il letto scavato nella formazione arenacea inferiore e si congiunge colla calcarea che sta a levante del colle di Cornio, siccome anco con quella che sta a ponente di lui tra esso e la cima della Biscia; calcarea che fa parte di una zona della stessa natura e della stessa formazione, la quale, a partire dal precipitato colle di Pouriac, fascia a settentrione il massiccio cristallino delle Alpi marittime per la valle della Stura e per quella del Gesso, come quella che siamo andati descrivendo, lo cinge verso mezzogiorno, ossia dalla parte del versante Mediterraneo. A Saorgio la calcarea contiene frequenti arnioni silicei, e qui, siccome a Breglio, non sono rare le masse di gesso e della solita *rauecake*. Gli strati corrono a Raus O. E. e inclinano al S.

Queste masse calcaree della formazione giurese che abbiamo indicato sulla catena centrale immediatamente a ponente del colle di Cornio, ossia di Tenda, e che abbiamo detto congiungersi con una zona di ugual natura, che a partire dai monti i quali stanno alla origine della Stura, ove non sono rari i fossili giurassici del genere *terebratula*, ecc., cinge all'intorno il masso cristallino centrale delle Alpi marittime, si attaccano tosto, meno una brevissima interruzione, colla calcarea che sta a levante del colle di Cornio medesimo, donde, abbandonato per qualche momento il versante meridionale della Gioia centrale, questa calcarea va a costituire una porzione dei monti che sono all'origine del Negrone, prima sorgente del Tanaro, cioè il monte Carsino, donde prosegue per le montagne che sono a sinistra di questo fiume, finchè dopo il confluyente del Negrone e del Tanarello, luogo ove il fiume comincia a portare il nome di Tanaro, passi prima dal ponte di Nava sulla destra sponda, e formi quindi la parte

media delle alture che sono a mezzogiorno di Ormea, cioè la montagna di Caprauna, essendone le cime coronate dalla formazione del macigno, mentre invece essa calcarea giurese forma poi lungo la cresta dei monti, la sommità del Galet e di altra vetta sopra Nasino.

Al ponte di Nava la parte inferiore sulla destra del fiume è di una calcarea semicompatta, un poco cristallina, a cui succede un banco di un'argilla scistosa, untuosa, verdiccia, cui sopra incombe una massa considerabile di calcarea subgranulare, bigia, venata, più o meno secca, contenente degli arnioni silicei, al qual banco ne succedono altri di una calcarea rossiccia, e altre di calcarea argillosa, ricoperti a loro vece da altri di calcarea compatta, ai quali tengono dietro finalmente gli strati della formazione del macigno, che corona quel colle, e di là si estende nella sottoposta valle dell'Aroschia. Gli arnioni silicei sono in queste località un buon carattere a riconoscere, che la calcarea che li contiene sia da riferirsi alla formazione giurese; uno dei banchi che si vedono al ponte di Nava è formato da una calcarea venata di giallo d'oro sopra un fondo scuro, il che la fa perfettamente somigliare al marmo Portovenere o Portoro che vedremo al golfo della Spezia trovarsi in una uguale ed identica formazione. Al ponte di Nava la, forse parziale, direzione degli strati è S. E. N. E. inclinando al S. O.

La massa calcarea di cui in principio eravamo andati indicando l'estensione geografica nel contado di Nizza (meno quella delle immediate vicinanze del colle di Cornio spettante alla zona settentrionale) faceva parte della zona meridionale che fascia il masso cristallino del centro della catena, quella invece di cui ora abbiamo accennato l'esistenza al monte Carsino, al ponte di Nava, al monte Galet fa parte della zona meridionale, che si estende ai piedi di un altro nucleo cristallino antico, il quale si mostra nelle parti medie della valle del Pesio, in quelle dell'Elle e della Corsaglia, all'origine quasi della valle di Casotto e che traversa il Tanaro presso Gareggio, per andare nelle parti alte della valle di Bormida e venir quindi al mare presso Savona e Albizzola. Questo nucleo taglia obliquamente la catena centrale, e così anco può dirsi che presso a poco succeda della calcarea che lo fianeggia; infatti dalle vicinanze di Gareggio e del monte Galet essa calcarea seguita a Rocca Barbena e alle sorgenti della Bormida, donde un ramo scende per le valli della Nevia e della Pernavaira a Zucarello, ove ha l'aspetto di un marmo

bardiglio, e giunge poi al mare presso Ceriale e Borghetto pel mezzo dal contrafforte di S. Spirito.

Le vicinanze di Garessio forniscono dei bei marmi; tra gli altri vi è una breccia che somiglia alquanto al mischio di Serravezza, il quale si sa essere una riunione di frantumi di calcarea ordinariamente diventata saccaroide, impastati in una specie di *scake* nella quale sono dei piccioli e numerosi cristalli di pirossenio o di antibolo, con cui sono assai di sovente delle parti talcose e nella quale roccia tutto concorre ad indicare che hanno avuto luogo delle modificazioni probabilmente ignee e sicuramente posteriori all'epoca in cui la grande massa calcarea era stata depositata; sovente questi banchi di mischio avendo l'aspetto quasi di un filone o di un filonestrato. Io però non saprei positivamente asseverare che nelle brecce testè citate di Garessio siano stati ritrovati i piccioli cristalli di pirossenio e di antibolo sì frequenti nel mischio di Serravezza, ossia di Stazzema.

Da Rocca Barbena e dalla valle della Pennavaire la calcarea passa alle sorgenti della Bormida e forma sulla catena centrale il monte Calvo, che sta sopra il borgo della Pietra ed ha circa 1500 metri di altitudine. Questa massa calcarea si appoggia sullo gneis al colle tra Bardino e Bardineto. Essa è in istrati alquanto inclinati, e dapprima dopo un banco di calcarea grigia si trova un letto di argilla scistosa verdastra che pare quasi talcosa, al disopra della quale argilla ricomincia la calcarea che forma la sommità del monte; inclina dessa sull'alto in parte al S. S. O., ma cambia più basso d'inclinazione pendendo allora nel senso opposto, cioè immergendosi verso l'E. N. E. alle falde meridionali della montagna, comparendo quivi degli strati di uno scisto un poco talcoso che appartiene al gruppo probabilmente del Verrucano che suole essere inferiore. È in questa calcarea e nelle pendici meridionali del monte Calvo che trovasi la vasta grotta di santa Lucia presso Toirano: non distante pure da questo paese e verso Balestrino nella parte inferiore della principale massa calcarea vi è del gesso saccaroide con parti talcose verdastre, accompagnato, siccome al solito, dalla calcarea porosa, ossia *rauchwacke*.

Dopo monte Calvo la zona calcarea si accosta ancor più al Mediterraneo e costituisce le vicinanze della Pietra, il monte della Capra Zoppa coronato in alto dai terreni terziari in banchi orizzontali,

mentre i secondarii sono verticali; quivi la calcarea ha un colore scuro quasi nero ed è talora traversata da vene spatiche; nel basso lungo la strada pare vi sia anche della dolomite. Va poi verso Noli, ed ugualmente tra Finale e il Capo s'incontrano frequenti masse dolomitiche bianco-grigiastre come è quella che esiste accanto alla batteria che sta a levante della città di Finale e sotto cui si passa per mezzo di una galleria. Al capo Noli la grande massa calcarea è grigia più o meno fosca, la sua struttura è tra la compatta e la granulare, essa è interrotta da frequenti grotte o caverne. L'estrema punta del capo, in cui è forata una magnifica galleria pel passaggio della strada, è costituita da una calcarea compatta giallo-rossiccia, talora un poco violetta che ha assolutamente l'aspetto di un marmo; i banchi di essa sono non molto potenti ed immergonsi sotto la montagna dimostrando in generale di rialzare le loro testate dalla parte del mare. Accanto o in mezzo a queste calcaree del capo Noli, non che nel tratto che è tra Finale e Varigotti, spuntano delle rocce ora arenacee o piuttosto quarzo-talcose, in decomposizione, ora dei veri steascisti; non è così facile però d'indicare la loro precisa relazione colle nostre calcaree; è però constatato che la principale massa calcarea loro è assolutamente superiore.

Al di là del capo Noli, dopo alcune piccole interruzioni cagionate da rocce più antiche, la calcarea si mostra ancora a Spotorno, donde puossi seguire al mare verso Bergeggi e nell'interno delle terre al Segno, a monte S. Giacomo e a Monte Alto; in questi punti si accosta assai, per causa dell'assottigliamento, dirò così, del massiccio cristallino di cui abbiamo indicato l'andamento a traverso le valli del Tanaro e della Bormida, alla zona calcarea che accompagna anco questo massiccio dal lato del N., zona che per la massima parte si estende fuori dei limiti entro cui ci siamo prefissi di restringere la nostra descrizione, essendo quasi tutta questa zona situata nel versante dell'Adriatico e di cui indicheremo però che fanno parte le calcaree del monte detto Sotta di Bagnasco, quelle delle vicinanze di Millesimo, delle Carcare, e a cui spettano certe calcaree delle vicinanze di Montenotte, non lungi dalla catena centrale, e altre presso la stessa al luogo detto Stella, le quali a quelle di Montenotte congiungonsi, e ove trovasi anco del gesso. Forse pure a questa zona calcarea potrebbero aggiungersi certe altre calcaree di analogo aspetto che giungono al mare verso Cogoleto, ma la presenza

della serpentina che è venuta a penetrare in questi dintorni la formazione del macigno, e forse anco la più antica giurese, ha sconvolto tutte le posizioni e modificate in pari modo le diverse rocce, chè positivamente non può asserirsi se la calcarea isolata di Cogoleto faccia parte della formazione giurese e non di quella del macigno: alcuni dati però tendono a farla credere piuttosto appartenente alla più moderna tra queste due formazioni.

Più a levante che Savona e Cogoleto non vi è modo di rintracciare massa alcuna calcarea che si possa indubitatamente riferire alla formazione di cui ci stiamo ora occupando, essendo molto probabile che le masse calcaree di Arenzano e di Sestri, che pure hanno con quella di Finale comune l'aspetto mineralogico, siano invece dell'epoca del macigno.

Non è che all'estremità orientale della Liguria medesima, che accostandosi nuovamente ad un massiccio centrale cristallino, qual è quello delle Alpi Apuane, s'incontrano nuovamente terreni che sono più antichi, e tra questi principalmente la calcarea della formazione giurese. Si è sopra ambe le sponde del golfo della Spezia che questa formazione si mostra e anche con molto sviluppo.

Sulla destra ossia occidentale sponda di questo famoso golfo, si alza una catena di monti che l'aspetto suo varia dagli altri circostanti, e di cui le isole Tinetto, Tino e Palmaria sono punte emergenti, quando si abbassa al disotto del livello del mare; ad essa appartengono le punte della Castellana, di Coregna, di Fabiano e di Parodi, e poi si perde, perchè ricoperta dai sedimenti del macigno verso Pignone, poco oltre il qual paese questa striscia di terreno particolare scompare. Ora questa catena presenta un'associazione di strati che tutto dimostra appartenere all'epoca giurese ed una porzione specialmente di essa al *Lias*, di cui contiene un assai gran numero di fossili.

Quando imprendi a studiare questa catena dalla punta di Santa Maria o da quella del Varignano, che sono dalla parte interna del golfo, e cerchi avviarti verso la punta della Castellana, che è più a ponente e all'esterno, trovi dapprima degli strati di una calcarea semigranulare di colore oscuro che sembra inclinare in questo punto per breve spazio e con lieve inclinazione O. 7.° S.; su di essa e colla stessa inclinazione si stende altra calcarea ugualmente grigia-scura, ma porosa e forse un poco dolomitica, e poi altra nuovamente più

compatta; gli strati di queste due varietà, che sembrano costituire quella specie di ripiano o di picciolo contrafforte su cui è la fortezza di Santa Maria, cambiano assai presto d'inclinazione immergendosi verso E. 7.° N., e assai si raddrizzano, cosicchè venendoli a tagliare perpendicolarmente, e progredendo nella direzione della Castellana, ossia verso ponente, si può dire che si passa dalla parte superiore all'inferiore; si ritrovano infatti le stesse varietà vedute precedentemente alla punta di Santa Maria, e dopo, cioè inferiormente, succede loro un banco potente di calcarea compatta nera con vene spatiche di color giallo d'oro, che forma il tanto rinomato marmo di Portoveuere chiamato Portoro; sotto di lui, sempre con l'inclinazione E. 7.° N., evvi un banco di calcarea dolomitica non molto considerevole a cui succedono poi numerosi banchi, piuttosto sottili, di altra calcarea meno cristallina, più argillosa, un poco scistoide che contiene dei fossili, tra quali forse è la *Posidonia Liassina*, mentre nella calcarea compatta o semicristallina veduta presso Santa Maria e di cui è forse prolungazione il banco fossilifero del Tinetto esistono altre bivalvi non ben determinabili, dei polipai, alcune univalvi, tra le quali un *cerithium* che il celebre De Buch crede analogo ad un *cerithium* caratteristico della grande oolite.

Sotto gli strati sottili e scistosi che abbiamo indicato, viene poi una grande massa, direi quasi un'enorme *Dykes* verticale di dolomite, più o meno cristallina bianca e grigia, che si alza fino alla punta della Castellana e che continua quindi per Coregna e Parodi fino a Pignone; questa dolomite dà ora qualche indizio di stratificazione, ora ne è assolutamente priva. A ponente della dolomite cioè andando più verso l'esterno della catena succede poi una riunione di numerosi banchi calcarei sottili di colore più o meno grigio sovente assai chiaro, e quindi altre calcaree alternanti con scisti di colore bruno; si è in questa riunione di banchi calcarei e scistosi che si trovano in gran quantità dei piccioli arnioni di ferro solforato con belemniti e ammoniti, mutati frequentemente anch'essi in questo solfuro. Tutto poi sembra indicare che realmente questi strati siano inferiori alla dolomite, giacchè sebbene quasi verticali hanno però una inclinazione tal quale indicante che passano sotto di lei. Di questa serie di banchi presso la Castellana non si vede che la parte calcarea, sorgendo essa verticalmente dal mare; forse la parte scistosa calcarea ammonitifera sarà visibile nei dirupi che sono più bassi che

la Castellana medesima, e ne può essere buon argomento il trovarsi degli ammoniti al colle delle Grazie, donde i banchi che li contengono dimostrano di prolungarsi nel basso e a ponente della Castellana; è poi sicuro che detti banchi ammonitiferi stanno accanto e dirci sotto alle precedenti calcaree, quando si va al Nord, cioè quando si prosegue verso i monti di Coregna e di Fabiano. Chi continuasse ancor a progredire entro le terre e prendesse a traversare la catena più al Nord, per esempio verso Biassa, troverebbe dopo la dolomite, prolungazione di quella della Castellana, della calcarea nera compatta o meglio subgranulare sonora, in banchi sottili i quali diventano quasi verticali e pendono in parte O. 10° S. il che sembrerebbe indicare che detti banchi sono superiori alla dolomite, nondimeno la cosa è più che dubbiosa, vi sono sicuramente accollati e fanno parte della stessa formazione; più lungi ancora accanto alla calcarea vi sono degli scisti argillosi lucidi con vene di quarzo alternanti con banchi calcarei e più lontano ancora delle calcaree compatte argillose di colore oscuro, alle quali succedono altri scisti di una tinta violacea, ossia rosso feccia di vino, con macchie verdognole, ai quali sta daccanto presso Campiglia un macigno brecciato con frammenti di steascisto e di calcarea oscura; forma questo una massa poco stratificata e sovente dei grossi pezzi duri e solidi sono in mezzo al macigno friabile e decomposto. Nel modo con cui sono stati sconvolti gli strati in queste vicinanze egli è difficile il dire qualche cosa di molto positivo circa la situazione di questi strati di scisto rossiccio e verdognolo, che abbiain trovato prima di giungere al macigno; sono eglino superiori o inferiori alla massa calcarea e agli scisti calcarei ammonitiferi o in altri termini debbono eglino legarsi con la formazione giurese, oppure col macigno che sta loro daccanto presso Campiglia? In alcuni punti di queste montagne del golfo come in una sezione, che passando pel monte di Poreara va da S. Benedetto a Rio maggiore e in cui si vede la dolomite fiancheggiata dalla calcarea compatta scura, il modo di essere di questi scisti rossicci tenderebbe a far credere che sono di preferenza associati al macigno: la cosa nondimeno il ripeto, è molto dubbiosa. Percorrendo poi inoltre queste montagne viene anche il dubbio se la dolomite realmente formi uno strato parallelo alla stratificazione degli altri banchi calcarei, o se invece si comporti come un vero *Dykes*, cioè li traversi in un senso diverso e alla loro direzione un poco obliquo. Alcuni fatti come la penetra-

zione di una calcarea bianca dolomitica in mezzo a calcaree scure semiscistose a Portovenere, la parziale dolomizzazione di una parte di un banco di cui l'altra parte rimane non modificata, come si vede all'isola del Tinetto, ove sono amoni silicei e noduli di arragonite e fossili principalmente bivalvi in una parte del banco di detta calcarea, mentre nell'altro diventato più o meno cristallino e dolomitico, i fossili organici vanno desaparendo, indicherebbero quasi non che la dolomite sia un vero *Dykes* il quale abbia penetrato in istato semisolido e pastoso in mezzo agli strati, ma che l'azione della *dolomizzazione* abbia seguito talora una linea non assolutamente parallela agli strati medesimi ed abbia agito su' varii banchi ed anco a diverse distanze laterali dalla linea centrale secondo cui ha generalmente manifestata più intensità.

Se l'accennato modo di essere degli strati nella catena occidentale del golfo della Spezia lascia non pochi dubbi sulle vere relazioni che esistono tra loro, non minore perplessità si prova quando si debbono paragonare questi strati con quelli presso a poco analoghi che si trovano sull'altra sponda del golfo medesimo, cioè sulla catena orientale, e quando pure si vuole discutere la posizione relativa dei medesimi tra loro e certi altri banchi di agglomerati, di calcaree cristalline e di scisti quasi micaei che sono nella stessa catena e ne occupano l'estrema punta a mezzogiorno levante, eh' è quella che vien detta della batteria di santa Croce a levante del capo Corvo e non lontana dallo sbocco in mare del fiume Magra.

Chi partendo dal Telaro piccolo villaggio sulla sponda orientale del golfo, prende a traversare i monti che gli stanno alle spalle, cioè a levante per andare alla cappella o antico monastero di santa Croce alla bocca della Magra, vede dapprima davanti a sè e quasi al livello del mare una massa, che quasi sempre ricoperta dal mare medesimo non si può accettare se sia realmente di una calcarea impura e un poco porosa, oppure se sia arenacea; immediatamente vi stanno sopra degli scisti rossicci quarzosi che paiono immergersi sotto la montagna e così inclinare incirca E. 10° N.; a questi scisti succedono dei banchi piuttosto sottili di una calcarea compatta grigia accompagnati da scisti, i quali sono più raddrizzati che i precedenti, ma tendono però ancora ad inclinare E. 10° N., poi vengono degli strati potenti di calcarea compatta grigia traversata da venule di calcarea spatica, i quali strati vanno diventando ognor più verticali:

a questi succedono ancora altri banchi tra i quali alcuni dopo aver passato per la verticale, cominciano ad inclinare O. 10° S.; tra loro vi è qualche traccia di dolomite; a questi succedono ancora altri banchi calcarei compatti grigi, che assolutamente pendono O. 10° S. viene poi della calcarea porosa e ad essa succedono inferiormente delle arenarie silicee bianche e degli scisti color feccia di vino, che passano sotto la detta calcarea, i quali scisti paiono avere qualche analogia con quelli veduti presso il Telaro. Si può dire che la stratificazione in questa parte della catena orientale abbia quasi la forma di un ventaglio; è da notarsi, che nelle calcaree compatte un poco scistose sono stati trovati anco su questa catena orientale al monte Caprione, che ne è il più alto vertice, degli ammoniti, che paiono non essere diversi da quelli della parte occidentale se non che sono di alquanto maggior dimensione. Dopo il succitato scisto rossiccio viene in seguito dello scisto untuoso e poi una qualche arenaria quarzosa, ossia quasi quarzite, analoga ad una roccia frequentissima in riviera di Ponente e che vedremo appartenere al gruppo del Verrucano il quale è inferiore a quello della calcarea giurese di cui ci stiamo ora occupando.

Gli ultimi strati di cui abbiamo fatto parola s'incontrano poco dopo il paese di monte Marcello, posto sull'alto di questa catena orientale del golfo; per andare poi da questo paese all'estremità della medesima catena, cioè verso il Corvo e la Bianca, si cammina per alcun tratto sulla direzione degli strati medesimi e così per qualche tempo non se ne incontra alcuno di nuovo; in seguito, tosto che si tocca più verso levante e si giunge all'estremità del monte, un dirupo naturale lascia vedere come questi strati arenacei passino sotto le calcaree compatte grigie e come siano dessi poi sorretti:

- 1.° Da una roccia di aggregato duro con molti frammenti di quarzo, il quale aggregato è frammisto a scisti eloritici, esistendo nei banchi di aggregato quarzoso dei filoni di ferro speculari.
- 2.° Da' strati bruni micacei scistosi ne' quali è una picciola porzione di materia calcarea.
- 3.° Da altra calcarea cristallina bigia e bianca quasi marmo bardiglio.
- 4.° Da una calcarea bianca saccaroide.
- 5.° Da certi banchi micacei.
- 6.° Da altra calcarea saccaroide, che per la mica interposta diviene scistosa.
- 7.° Da altra calcarea sublamellare bruna e bianca.

vegetabili, sia animali appartenenti in generale ad epoche più antiche, si lasciano vedere unite in questi terreni alpini ed apennini a forme che altrove da sole esistono nei terreni a cui si vogliono riferire i nostri, per la classificazione dei quali io son di parere che tra le due opinioni le quali vorrebbero riferire i banchi fossiliferi della Spezia o al terreno *carbonifero* o al *lias* quella sia preferibile che in questa più recente formazione li vuole riporre, tanto più che questo nostro lembo di terreno si mostra analogo ed identico ad altri non da lui discostissimi, come quelli della Lombardia, e quelli soprattutto delle alpi marittime che si legano con quelli delle vicinanze di Castellana, di Digne e di altre località delle basse alpi, ove la presenza della *gryphus arcuata* non lascia dubbio che non si abbia a vedere il terreno del *lias* assai chiaramente caratterizzato perchè non si abbia a tener conto di alcune anomalie che si possono quivi osservare, trovandosi desso per l'appunto presso quella zona meridionale europea che nel sesto Congresso italiano il celebre De Buch indicava correre dalla Crimea, nel Tatra, nelle alpi orientali, ai confini del canton di Friburgo, piegare verso le alpi occidentali e passare per Barème poco distante da Digne, zona in cui le formazioni giurassiche sono da una speciale e peculiare riunione di fossili caratterizzata, e in cui mi par difficile di poter minutamente segnare tutte quelle molteplici suddivisioni che nei terreni della stessa epoca in Inghilterra e in parti più occidentali della Francia si sono stabilite.

TERRENO DEL VERRUCANO.

Inferiormente alla calcarea giurese di cui ci siamo fino ad ora occupati, regna una riunione di strati in generale arenacei, ma accompagnati pur anco da scisti e più da conglomerati a grossi elementi, che noi dal luogo, *la verruca*, ove in Toscana si trova la roccia che ne è spesso principal componente, chiameremo il gruppo del verrucano, per adottare un nome che ben indichi di che si tratta e che nello stesso tempo nulla giudichi anticipatamente circa la posizione di tal gruppo al disopra dell'orizzonte geologico, giacchè molto a questo riguardo variano i pareri dei geologi, volendolo gli uni legato alle formazioni giurassiche, altri invece in un'epoca alquanto più antica facendolo discendere.

Or questo gruppo, ossia questa riunione di strati che assai costantemente ritrovasi non solo in alcuni punti degli apennini, ma eziandio in molte parti delle alpi, frapposto alle rocce cristalline e alle calcaree del terreno giurassico, è principalmente costituito da rocce che appartengono alla classe delle rocce di aggregazione, potendosi considerare come un'insieme di puddinghe o conglomerati grossolani, di arenarie a diversi colori, di rocce di quarzo, ossia quarziti, di scisti argillosi, ma più talcosi che si alternano forse qualche rara volta con alcuni banchi calcarei.

In breve accenneremo le principali varietà delle rocce che abbiain nominato e che tutte, in vario ordine però, si trovano nella Liguria.

Le puddinghe sono aggregati più o meno grossolani a frammenti ora rotondati ora angolari di rocce più antiche, le quali consistono principalmente in quarzo, in gneis, in scisto micaceo, ai quali frammenti se ne aggiungono talora, ma ben raramente di quelli di granito e più raramente ancora di quelli di porfido. Questi frammenti sono impastati o in una specie di scisto o sono legati da un cemento di arenaria, ve ne è di color rossiccio siccome pure di un grigio chiaro; la pasta dello scisto ha ben sovente l'aspetto di uno scisto micaceo, ma più ancora quello di uno scisto talcoso.

Le rocce di quarzo o quarziti sono masse di un quarzo compatto grasso, ora screpolato, ora massiccio, ma che lasciano bene spesso travedere che sono composte di numerosi frammenti o cogoli di quarzo i quali hanno l'aspetto di essere stati fusi insieme e quasi concotti; parti talcosi si trovano in mezzo a queste masse, le quali contengono talora, ma non sovente, altri minerali e che essendo talvolta più disaggregate, dimostrano allora di essere una puddinga interamente quarzosa.

Le arenarie, come lo dice il nome, sono rocce arenacee per la massima parte quarzose, colle quali però si mescolano sovente pagliuzze di mica e allora somigliano ai psammiti, sono a grani fini spesso colorate in rosso, rosso bruno o color di mattone a cagione dell'ossido di ferro che contengono. Ve ne sono anco delle grigie e talora delle verdastre. Si vede di quando in quando una specie di passaggio fra queste arenarie e le rocce di quarzo di cui abbiain parlato, le quali sembrano formarsi in mezzo a loro, quasi che i granellini di quarzo si fossero fusi insieme; anche talvolta queste arenarie, per una maggiore attenuazione dei loro grani e per miscu-

degli scisti micacei della Bianca e della batteria di santa Croce alla bocca di Magra, i quali sono attualmente inferiori, si supporrebbe fossero stati un tempo superiori ed appartenessero così ad una parte della formazione giurassica assai più recente quale sarebbe l'*Oxford clay*, mentre invece osservazioni molteplici fatte altrove, tendono evidentemente a provare che quelle puddinghe sono realmente inferiori al *lias*. Pertanto nel modo mio di vedere io considero come una cosa a parte, cioè come appartenenti al sistema del verrucano quelli banchi di aggregati quarzosi e scisti alternanti che stanno più da levante e da mezzogiorno levante, nella catena orientale del golfo e come appartenente alla formazione del *lias* e a qualche porzione dell'*oolite inferiore*, i banchi calcarei e scistosi con fossili sì d'una sponda che dell'altra di quel bacino, riguardando quelli cogli ammoniti e belemniti come più antichi, e quelli con fossili bivalvi ed univalvi come un poco più recenti, e ponendo infine i macigni di Campiglia e certi scisti rossicei e bruni, che sono con questi a contatto, nella formazione del macigno a differenza del De la Beche che questi scisti e macigni voleva fossero anzi inferiori alla massa calcarea, mentre non è se non che per un accidente locale che in un sol punto in tal posizione si mostrano, cosicchè infine nel modo mio di vedere, il verrucano sarebbe ristretto alla catena orientale donde si congiungerebbe al disotto dei depositi più moderni colle rocce di analoga natura che al di là della Magra si trovano sì abbondantemente nelle alpi carraresi, ove osservasi presso a poco la stessa successione di rocce, e ove anco dal Guidoni, scopritore primo dei fossili del golfo, furono trovate presso la Tecchia bivalvi analoghe ed uguali a quelle rinvenute in alcuni banchi calcarei delle vicinanze della Spezia, siccome anco in montagne quasi dell'alpi carraresi dipendenti, perchè da loro poco discoste, all'alpe di Corfino in una calcarea giallo-rossiccia compatta, ammoniti e belemniti sono stati osservati, non che certe altre grandi conchiglie camerate che alcuni ed autorevoli geologi vorrebbero essere ortocere, ma che altri sostengono essere semplicemente giganteschi alveoli di belemniti.

Chi volesse dare una lista alquanto completa dei fossili trovati presso la Spezia intraprenderebbe lungo e ben difficile lavoro; giacchè di molti non si potrebbe, attesa la poca conservazione e la dura roccia in cui sono incastrati, accennare se non che il genere; noteremo soltanto alcuni dei principali ivi rinvenuti. Tra le bivalvi vi sono dei

limite delle puddinghe dal lato delle rocce primordiali è al Sud del Vallon di Molieres affluente della Tinea, scavato nello gneis e di cui soltanto la cresta del fianco sinistro o inerdionale è coronata dalle puddinghe delle quali enormi massi cadono nel letto di detto torrente, più ancora a levante, il limite è segnato dal torrente Saleze affluente della Vesubia, mentre che verso i terreni più recenti i limiti passano presso Rimplas e al Nord della Bollina; in questi dintorni masse o filoni di ferro particolarmente oligista, sono nello gneis che avvicina le rocce arenacee, se forse esaminando bene la lor posizione non sono invece in alcuni banchi del nostro gruppo arenaceo che a quello più antico gneis rassomigliano. Accostandosi in seguito alla Vesubia lo spazio occupato da questo terreno assai si restringe sulla destra di questo fiume di rimpetto a S. Martino di Lantosca, ma acquista quindi detto terreno una maggiore potenza sulla sinistra sponda verso Rocca Bigliera e giunge sul vicino contrafforte che è tra la Vesubia e la Roia all'altezza di 3000 metri alla sommità del monte Bego, formata da un'arenaria quarzosa grigia e rossiccia a grana fine, non che all'altra cima del *Capelet Sobran* identicamente formato e poco al precedente monte in altezza inferiore; nella valle poi si estende verso i terreni più recenti fino circa a Bollena, e sull'alto al colle di Raus, ove è separato al solito dalle calcaree giuresi dolomitiche e compatte per mezzo dei gessi e della *rauchwacke*, delle quali, guardando dalla valle presso Bollena, si vedono con mirabile uniformità ascendere i banchi interposti alle due formazioni, dall'imo della valle medesima fino alla sommità del colle, segnando con un colore ed un aspetto particolare i punti per cui si estendono nelle montagne che tra questo colle e quella valle si frappongono.

Lungo questo contrafforte si vede che la base di questo terreno al disopra dello gneis è formata dall'aggregato grossolano con rottami di gneis e forse qualche poco granito, non che con altri detriti di rocce che somigliano un poco al porfido; al disopra vengono le arenarie quarzose a grana media di color grigio o rossiccio, e infine la massa degli scisti o argille scistose di color rosso fosco, ossia quasi violacee talora screziate di verde tenero, ve ne sono macchie quasi circolari.

Quest'ordine di successione nei diversi strati di un terreno elastico, pare poi assai naturale, ove si rifletta che dopo un violento stato

di cose in cui le acque staccavano dalle masse preesistenti numerosi pezzi di rocce che dovevano essere in seguito gli elementi di un nuovo terreno, i primi tra questi rottami a depositarsi saranno stati i più voluminosi, i quali per conseguenza devono essere gl' inferiori e i più vicini alle masse da cui hanno avuto origine e di cui facevano parte; in seguito devono essersi depositati i granellini più minuti, quali sono quelli delle arenarie e infine le particelle più attenuate e più miste di sostanze diverse, quali sono gli elementi degli scisti e delle argille, le quali naturalmente sono rimaste più lungamente sospese nell'acqua, in cui erano in una soluzione bensì meccanica, ma che talora poteva partecipare dei caratteri di una soluzione chimica. Quanto alle quarziti, rocce compatte, non bisogna vedere in esse che delle rocce modificate, cioè riguardarle come rocce arenacee quarzose, nelle quali per così dire gli elementi si sono fusi insieme, modificazione ch'egli è più facile concepire che tante altre metamorfosi, le quali pur si vedono in questo terreno, che tutto indica aver soggiaciuto a potenti azioni modificanti; questa considerazione inoltre, dall'essere state le materie più sottili ed attenuate le ultime a depositarsi, può rendere anche ragione del non trovarsi in tal terreno i sedimenti calcarei se non che alla parte assolutamente superiore del medesimo.

Nella località di cui abbiamo fin ad ora fatto cenno nella valle, cioè della Vesubia e sul contrafforte di Raus gli strati sono inclinati verso il S. o il S. O. e corrono E. O. oppure N. O., S. E. Questi stessi scisti e arenarie che si vedono al N. del colle di Raus passano in seguito alla testa del vallone di Cairos e corrono verso la Valancia e S. Dalmazzo nella valle della Roia ove se ne vedono enormi masse nel basso della medesima, da questo paese scendendo fino al Fontan, tratto di paese lungo cui si può osservare ugualmente la successione dei conglomerati a grossi elementi, delle arenarie e degli scisti o argille scistose screziate di rosso e di verde chiaro; in queste località gli scisti sono più untuosi al tatto, e sembrano contenere una maggior quantità di materia talcosa.

Allo sbocco del torrente della Briga nella Roia, che ha luogo rimpetto S. Dalmazzo, vi è in mezzo alle quarziti e agli aggregati una roccia verde feldspatica, non dissimile da certe modificazioni o metamorfosi che subiscono delle specie di argilla del gruppo arcaico del dipartimento del Varo, quando vengono a contatto dei porfidi di

glio di parti eterogenee e particolarmente argillose, passano a delle specie di argille che sono di diverse tinte e colori.

Gli scisti sono ora argillosi di un aspetto terreo, ora lucidi e colorati in diverse maniere, cioè ora rossicci, ora bruni, ora verdastri, e perfino screziati di rosso violaceo e di verde-chiaro, diventano sovente talcosi e può dirsi che sono allora del quarzo, con delle foglie di talco formano dei veri steascisti: sono allora untuosi al tatto; ordinariamente lucidi e rasati di un verde-chiaro, quantunque ve ne siano anco di color bruno violaceo e rossiccio; qualche volta, e questo doveva essere il loro stato generale anteriormente alle modificazioni sopravvenute, non sono che vere argille un poco scistose.

La calcarea finalmente di cui alcuni pochissimi banchi sembrano subordinati, ma soltanto nella parte superiore del gruppo, alle rocce scistose e ad alcune arenarie è ordinariamente una calcarea granulare, forse qualche volta un poco dolomitica e prende anco l'aspetto del cipollino, giacchè è spesso tramezzata da fogliuzze di taleo o di mica.

Quest'insieme di rocce ben corrisponde, come si vede pei suoi caratteri mineralogici, siccome anco per la sua posizione a quel gruppo di rocce elastiche, che s'interpone spesso nelle alpi fra i terreni primordiali e le grandi masse calcaree, come sarebbero le puddinghe di Valorsina, alcune delle rocce di una parte della Tarentasia e il conglomerato di Sernft, rocce che si traversano dopo aver lasciati i terreni cristallini e primordiali di cui contengono ordinariamente un gran numero di frammenti.

Una differenza nondimeno di molta importanza non permette di indicare precisamente le relazioni generali di queste rocce, e si è l'assenza dei fossili nel gruppo della Liguria, ove non ho ancor potuto trovare alcuna di quelle numerose impronte di piante che hanno rese celebri le giaciture d'antracite della Tarentasia, qualche traccia però di combustibile fossile che il prof. Sismonda riporta allo stipite, pare sia stato trovato nella puddinga dei monti di Valdiblora nella contea di Nizza.

La disposizione geografica di questo gruppo non è facile l'indicarla molto particolarizzata; in generale esso circonda il terreno primordiale, formando intorno ad esso una zona più o meno estesa, ma in certi punti viene a mancare, e par che si passi senza alcun intermedio dal terreno cristallino alla calcarea; in altri punti è poi difficile il distinguerlo dal terreno primordiale, quando mancano o

quella regione. È forse questo masso che il Riso ha indicato, nella sua opera sulla contea di Nizza, come una massa di serpentina, ma certamente se è desso come tutto conduce a crederlo, egli andò lungi dal vero. Al confluyente del detto rivo e un poco sopra lungo il medesimo, gli strati dimostrano d'immergersi verso l'Est al disotto delle masse calcaree compatte o subgranulari, che sono presso il paese medesimo della Briga. Rimontando in seguito nella valle principale verso Tenda vi sono degli scisti talcosi untuosi, che sembrano essere in mezzo agli scisti e aggregati rossi; forse anco certi banchi di calcarea dolomitica che s'incontrano poco sopra questo borgo si trovano egliino ugualmente fra rocce arenacee, in mezzo alle quali fors'anco e in una loro particolare modificazione che le rapprossima allo gneis è il filone di piombo argentifero che si escavava un tempo alla così detta miniera di Tenda.

Giunti a questo punto noi abbiamo percorso, per così dire, il contorno meridionale del massiccio cristallino che abbiamo detto esistere al centro, ossia sulla giogaia centrale di quella parte dell'apennino che corrisponde alle alpi marittime, calcando la zona delle rocce arenacee che lo cingono da questa parte. Le arenarie poi della cima della Biseia sulla catena centrale, gli aggregati, ossia pietre da mola del Vernante sul pendio settentrionale si trovano ugualmente sul contorno di detto massiccio, ma dalla parte di levante. Se volessimo poi uscendo dai nostri limiti, seguitare il gruppo arenaceo nella zona che forma intorno al massiccio cristallino dalla parte del Nord, lo troveremmo molto meno sviluppato, giacchè ve ne è bensì qualche traccia verso Entraigues, ma tra il Gesso e la Stura, del qual colore eccetto forse qualche lembo presso Bergemole, la calcarea giurassica o qualche sua modificazione come sarebbe il marmo di Valdieri, viene a contatto immediato dello gneis.

Nondimeno sullo stesso versante N. vi è ancora traccia di questo terreno e si trovano degli scisti talcosi, che ne fan parte, venendo più a levante, cioè a Boves, alla chiusa in val di Pesio, a Roccaforte in val d'Ellea, ove sono associati a quarziti disaggregate che dimostrano essere vere puddinghe, ma queste arenarie e quarziti sono porzione, (siccome gli altri lembi che sono alla torre in val di Corsaglia, nella valle del Casotto e quelli di Murialdo e di Biestro) di una zona di rocce arenacee che forma la fascia settentrionale dell'altro grande elissoide cristallino che abbiamo accennato correre a

traverso le valli affluenti del Tanaro, non che nella sua valle principale e in quella della Bormida, il quale elissoide poi è ugualmente cinto da una fascia di rocce arenacee ancora più caratterizzate dalla parte di mezzogiorno e così più specialmente verso la Liguria marittima.

Se si parte dalle montagne che sono alle sorgenti dell'Ellea e della Corsaglia se ne incontrano dapprima alcuni lembi, ma le troviamo in seguito, queste rocce, molto più caratterizzate avanzando verso levante nella valle del Tanaro presso Garessio; di esse si vedono masse enormi nelle montagne della catena centrale che sono al S. e al S. O. di questa terra, consistono principalmente in puddinghe e rocce di quarzo bianche con qualche steascisto come alla base di monte Galet e al colle detto di S. Bernardo che conduce dalla valle della Nevia a quella del Tanaro. Una gran parte anco delle montagne che dominano la prima di queste valli e che si legano pel Sambrucco alla cima istorica di Rocca Barbena sono formate da queste rocce quarzose che sovente assumono un aspetto particolare e sono scisti rossicci o bianchi lucidi, rasati, che contengono e impastano numerosi pezzetti e granellini di quarzo; quantunque gli strati siano qui ondulati e contorti, nondimeno pare che generalmente inclinino verso il S. e il S. O.

Le rocce di questo gruppo continuano ancora a mostrarsi nelle valli che scendono a Toirano e alla Pietra, come verso Balestrino, Giustenice e dietro Finale; non formano però in queste località un tutto continuo, perchè le masse calcaree a loro sovrapposte non le lasciano vedere in ispazii non interrotti; sembra che i banchi di queste rocce abbiano subito delle piegature notevoli e pare che abbiano sentito gli effetti di un raddrizzamento che veniva dal Sud, giacchè talora dopo aver lasciato il massiccio cristallino centrale si incontrano delle rocce di quarzo e degli scisti inclinati al Sud, poi si traversano le masse calcaree loro sovrapposte e inclinate ugualmente nello stesso senso, e in seguito queste stesse masse calcaree si vedono prendere un'opposta inclinazione, cioè abbassarsi verso il Nord e più lungi ancora, e più verso il mare s'incontrano nuovamente gli steascisti che pendono anch'essi verso il Nord, e così in una maniera contraria a quelle che tenevano nel contorno immediato del massiccio cristallino. In queste località, cioè nelle vicinanze della Pietra e di Finale, alcuni fatti sembrano indicare che

non vi è una separazione totale tra il verrucano e le calcaree sovrapposte; giacchè si vede qualche banco di calcarea compatta granulare, alternare cogli steascisti come accade verso il capo Noli, ove si vede sulla sponda del mare una massa di calcarea granulare gialla, poi la testata di un banco di roccia di quarzo e di steascisto e in seguito nuovamente una calcarea grigia al disopra; ma questa apparenza perde molta della sua importanza se si protraggono le osservazioni più lontano verso il rivo sant'Antonio di Noli, ove le quarziti e gli steascisti più sviluppati ed associati ad un filone-strato di ferro oligista e ossidato si mostrano assolutamente al disotto della grande massa calcarea.

Progredendo verso l'Est si trovano maggiori difficoltà a tracciare precisamente i contorni del gruppo arenaceo, giacchè sembra modificarsi e presentare meno caratteri distintivi che aiutino a riconoscerlo, così per esempio fra Noli e Savona sono semplici steascisti che servono da intermediarii fra i terreni che si possono chiamare primordiali e le calcaree; più verso Genova poi, e ove regnano le serpentine, gli scisti talcosi che frequentemente s'incontrano, sembrano in generale doversi riferire di preferenza a modificazioni sopravvenute nelle argille della formazione del macigno e cagionate dalle enormi masse di serpentina che si trovano da quelle parti; pertanto vi è ragione di credere che qui vi sia assenza delle rocce del verrucano.

Da quanto poi abbiam detto si vede che a malgrado non poche interruzioni la zona del gruppo arenaceo, ossia del verrucano, può essere seguita e riconosciuta tutt'all'interno dei due grandi massicci cristallini, dei quali si è indicata l'esistenza in Liguria; ma non è soltanto nei luoghi citati che se ne vedono tracce, chè ne esistono pure dei lembi in alcuni punti interni dei su accennati massicci, come al colle di S. Giacomo, nella valle della Bormida orientale; pare anche ve ne sia qualche piccola isola costituita principalmente da rocce di quarzo associate agli steascisti. Se ne vedono inoltre altri massi sparsi nello spazio compreso tra il massiccio cristallino delle alpi marittime e quello che va dalle valli del Pesio e della Corsaglia a Savona, così ve ne è non lungi dal colle di Tenda a Limonetto, e più all'Est di questo punto sulle sommità stesse delle alte montagne delle Viosenne e d'Ormea sulla sinistra del Tanaro se ne vedono vari lembi; uno dei più notevoli è quello del colle del Pas; passaggio che conduce dalla valle del Tanaro in quelle della

Ellea; lasciando monte Carsino e progredendo per poco a levante sul vertice di quello sperone s'incontrano dapprima inclinati all'O. degli strati numerosi di una calcarea sabbiosa con amoni silicei; questi banchi sembrano contenere informi resti di conchiglie non determinabili, poi si vede uno scisto siliceo, (scisto coticula) in seguito dei banchi più potenti di calcarea compatta e altra semigranulare; questi strati corrispondono a terreni più recenti, ma al disotto di loro e con una forte inclinazione all'O. sorge poi una massa di steascisto sovrapposto ad altra potente massa di rocce di quarzo; questa roccia, che appartiene positivamente al nostro gruppo, sembra in alcuni punti composta di frammenti rotondati o cogoli di quarzo formanti quasi una puddinga; in altri punti l'aspetto frammentario è scomparso ed è allora una massa di quarzite compatta o granulare; accanto di tal massiccio poi, ed è ciò che rende tale località interessante, spunta una massa non stratificata di una roccia rossiccia porfiroidea con parti somiglienti al diaspro rosso e contenenti cristalli di feldspato; si può dire che è un vero porfido feldspatico, ed il diaspro che con lui si fonde e fa passaggio, una modificazione della roccia quarzosa; al di là di tal massa s'incontra quindi dello scisto argilloso e nuovamente della calcarea, ma le inclinazioni sono cambiate, ciò che spiega bene che il masso quarzoso e porfirico spunta al disotto di questa calcarea e che il verrucano forma un'isola circoscritta in mezzo a lei.

Fenomeno analogo è un'isola dello stesso terreno, ma più estesa che presentasi ancora più all'Est; continuando a camminare sempre sul vertice della catena secondaria di Ciamballù e del monte d'Ingioia composto di calcarea in lastre piuttosto sottili e compatte, dopo aver ritrovati dei banchi di calcarea semigranulare si vedono al luogo detto le trincee delle masse o strati di quarzo granulare, al disotto dei quali stanno immergendosi nello stesso senso, cioè verso il N. O., dei banchi di steascisto seguiti ancora da altri banchi più potenti di una puddinga quarzosa a noccioli, della grossezza di una noce o anco di un uovo, legati da un cemento parimenti quarzoso; tutte queste puddinghe si appoggiano sopra un massiccio di una roccia verdastra che si può quasi caratterizzare come una protogine porfiroidea, se meglio non si vuol dire un vero porfido, roccia la quale forma la sommità del Pizzo d'Ormea, che è una delle più alte di quella catena; dopo aver traversato questo punto si ritrovano nuo-

vamente le rocce di quarzo verso il pian de' Termini situato più all'Est, e in seguito le calcaree che hanno i loro banchi inclinati verso levante, il che serve ad indicare che si è nel contorno orientale della picciola isola, siccome ugualmente verso la parte meridionale che si estende nella valle del Tanaro non lungi da Nava e da Ormea si vedono gli strati calcarei inclinati presso a poco verso il Sud, addossarsi a banchi di roccia di quarzo inclinati ugualmente, i quali a loro vece si appoggiano sopra una roccia porfirica analoga a quella del Pizzo, di cui abbiamo parlato, o ad una specie di gneis che s'incontra anche in quella regione.

Eccettuate queste specie d'isole che abbiamo descritte non si può vedere, in fuori delle zone che lasciano il massiccio cristallino, altro lembo di terreno co' caratteri peculiari spettanti al nostro gruppo arenaceo o del verrucano, se non si giunge fino alle vicinanze del golfo della Spezia e precisamente come già abbiamo fatto presentire nella parte orientale, cioè verso capo Corvo e la batteria di santa Croce a bocca di Magra. Io riferisco soltanto al gruppo arenaceo quei banchi che si trovano al disotto della principale massa di calcarea compatta di monte Marcello, cioè quell'insieme di banchi di calcarea dolomitica alternanti con scisti cloritici, di scisti luclidi, di aggregati quarzosi rossastri i quali sono inferiori alla calcarea grigia che forma le alture di monte Murlo e del Caprione; io riferisco anche a questo gruppo, ma con una tal quale esitazione, le arenarie silicee delle immediate vicinanze di Lerice e pongo nella parte inferiore delle calcaree o nella parte superiore del Verrucano, anco quelle breccie che si vedono presso la batteria di S. Terenzo. Nell'esame de' contorcimenti bizzarri della stratificazione ho creduto vedere che questa parte di arenaria silicea passi sotto la calcarea e sia una modificazione particolare delle arenarie della parte orientale della catena del golfo, ossia di quelle che sono verso la Magra. Si potrebbe ugualmente essere tentati di riunire al gruppo del verrucano quelli scisti screziati che sono accanto al terreno ammonitifero della parte occidentale del golfo, ma come accennammo è dubbio molto che siano realmente inferiori alla calcarea giurese e vi sono degli indizii per crederli invece legati colla formazione del macigno a detta calcarea superiore.

Checchè ne sia di questi ultimi ravvicinamenti egli è indubitato, che in questa estremità orientale della Liguria ritroviamo, quale l'ab-

biamo veduto anco dalla parte della riviera di ponente, una riunione di rocce elastiche, le quali si collegano a scisti cristallini, che formano per così dire dei centri intorno ai quali sono andate deponendosi formazioni successivamente più recenti, giacchè anco pel verrucano della Bianca e della batteria di Santa Croce, può dirsi che dipende da quello poco lontano, che attornia e in parte costituisce il centro o massiccio cristallino delle alpi apuane, sopra cui sono venute in seguito a posarsi le calcaree compatte che abbiamo riferito alla formazione giurese.

Ma se nessun dubbio noi abbiamo sulla posizione parziale di questo nostro gruppo arenaceo, cioè se sia o no inferiore alle calcaree giuresi, molti invece ne sorgono quando si tratta di assegnarli una precisa posizione nella scala geologica; molti e chiarissimi geologi, dirò anzi i maestri della scienza, vorrebbero che questo notevolissimo gruppo non fosse altro che la porzione inferiore della formazione giurassica e altro cioè non fosse, che il rappresentante di quelle arenarie che in altri luoghi non contestati, si trovano essere sotto il *lias*; e sono dessi condotti a quest'opinione dall'aver ritrovati nelle alpi in certi banchi, i quali alternano con rocce arenacee che hanno qualche analogia colle nostre, dei fossili riferibili al *lias*, siccome anco vi sono condotti dal non aver potuto osservare un preciso stacco tra questo nostro gruppo arenaceo e la calcarea indubitatamente giurese. In tale stato di cose nell'emettere io un'opinione diversa, e non tutta d'accordo con quella di molti maestri della scienza potrei per vero, essere tacciato di temerità se non vi fossero dei fatti, e questi anco di non lievissima importanza che militassero a favore dell'opinione che io già a questo riguardo ho in altri luoghi proposta.

Badando alle analogie mineralogiche, che pur debbono avere un tal quale valore, quando soprattutto i confronti non siano istituiti tra luoghi molto distanti, e ponendo mente che gli altri caratteri, i quali potrebbero confermare o invalidare le conseguenze tratte dalla somiglianza nell'aspetto mineralogico mancano assolutamente, non sarà poi estrema ardittezza il trovare che l'analogia fra gli aggregati a frammenti di gneis e di scisto micaceo del nostro gruppo della Liguria, e quelli del dipartimento del Varo faccia pensare assai ai terreni di arenaria rossa o *rothliegende* non molto lontani dall'epoca carbonifera e in questo dipartimento francese riconosciuti o sospettati; che le marne scistose rosse, le arenarie grigie e verdastre ricordano

il *bunter sandstein*, che infuse le dolomiti, certe arenarie e altre marne variegata ricordano il *keuper* ossia le *marne screziate* superiori al *mushelkalk* ed inferiori al *lias*. Se noi però non vogliam tener conto di tutte queste suddivisioni e vogliam fare, come un certo numero di geologi, un solo gruppo di tutte le rocce arenacee che si estendono dall'arenaria rossa al *lias* esclusivamente, facendo astrazione dei banchi calcarei come del *zechstein* in certi punti, e del *mushelkalk* in certi altri, che si sono sviluppati o no in mezzo a queste rocce arenacee, io credo che non saremo lontanissimi dalla verità, supponendo che il nostro gruppo tal quale si trova nel contado di Nizza e in altri punti della Liguria è un rappresentante di una porzione almeno di quell'insieme di terreni che vengono complessivamente chiamati col nome di formazione del *trias*. Sono anche tanto più fondato a propendere verso quest'opinione e ad ammettere per conseguenza quest'analogia, perchè in una regione dirò immediata al contado di Nizza come è il dipartimento del Varo il gruppo del *trias* è assai sviluppato con caratteri che lo fanno indubitamente riconoscere e vi presenta moltissima somiglianza col nostro gruppo arenaceo, ossia del verrucano subalpino o subapennino che si voglia chiamare. Così gli aggregati dell'*Esterel* de' quali non si dubita che appartengano al gruppo del *trias* e che sono legati coi porfidi rossi, sono per l'aspetto assolutamente identici a quelli delle vicinanze del monte Bego, di S. Dalmazzo presso Tenda della valle della Roia; ambi contengono ciottoli di quarzo, di porfido, di gneis, di scisto micaceo. Le arenarie dello stesso monte Bego somigliano molto a quelle di Frejus e d'Hieres le quali sono forse in quella suddivisione del *trias* che corrisponde all'arenaria screziata; siccome gli scisti, le argille scistose rosse e verdi del Fontau somigliano in tutto anco nei più minuti particolari, meno l'essere un poco più talcose, alle marne screziate di Goufaron, perfino anco i minimi fenomeni che si possono chiamare accidentali si riproducono analogamente e nel Varo e nel gruppo delle alpi marittime; così il rame carbonato turchino si trova in ugual giacitura e in una regione e nell'altra; il gesso e la *rauchwacke* in analoga posizione, cioè nella parte superiore si fanno vedere e in una località e nell'altra, e se i banchi del *mushelkalk*, che si trovano chiaramente caratterizzati nel dipartimento del Varo, non si può osservare che precisamente s'incontrino nelle alpi marittime, pure non sarebbe assolutamente irragionevole il so-

spettare che certi banchi di dolomite subordinati alle rocce arenacee dal lato di Tenda e in altre località si siano sostituiti in questi paesi a quello del *mushetkalk* che ritrovansi nel dipartimento del Varo.

Questo confronto poi dei due gruppi rende anco tanto più probabile la sospettata analogia, se si esamini la relativa disposizione geografica dei due terreni.

L'estensione di paese che corre dalle montagne dell'Esterel e delle Maures a quelle del contado di Nizza verso l'origine della Tinea, presenta dapprima, partendo dalla costa, un massiccio primordiale composto di gneis e di micascisto, sul quale tosto si appoggiano le masse di aggregato rosso, di arenarie e di marne screziate con alcuni banchi di *mushetkalk*, questi banchi sono traversati da potenti masse di porfido di molteplici varietà ed inclinano in generale verso il N. oppure il N. N. E. Al disopra di loro si veggono delle masse calcaree riferibili ai terreni ginrassici, e poi al disopra ancora delle masse estesissime di terreni cretacei sviluppatissimi che si presentano in istrati molto meno inclinati. Si possono seguire queste masse fin nel contado di Nizza e vederle su molte delle alture che sono verso l'Esteron e quelle del contrafforte che sta fra la Tinea e la Vesubia. Rimontando successivamente questo stesso contrafforte fin dove si avvicina al suo punto di giunzione colla catena delle alpi, si comincia dapprima ad abbandonare il terreno cretaceo dalla parte di Maria e allora il geologo viaggiatore si ritrova sulle masse calcaree riferibili alla formazione ginrassica, che rissortono al disotto dei terreni cretacei e rimontando ancora per quelle creste e vallate vede venire alla luce, ma con una inclinazione contraria a quella che avevano nel dipartimento del Varo, le rocce arenacee rosse, cioè gli seisti o argille scistose, le arenarie di diverso colore, le rocce di quarzo, gli aggregati rossi, ed infine al disotto di tutto questo, il terreno cristallino della catena centrale. Dal che viene naturalmente l'idea che gli aggregati del dipartimento del Varo e quelli della valle della Tinea segnino le rive opposte di uno stesso antico bacino, lungo le quali hanno poi avuto luogo gli stessi fenomeni della formazione delle masse gessose e dolomitiche e in cui si erano depositati a mano a mano i terreni più recenti che le dette rocce arenacee; dalla quale considerazione poi appare che può tenersi per meno irragionevole quell'opinione che erede di vedere nel gruppo arenaceo del contado di Nizza, siccome in quelli a lui identici di altre parti della Liguria,

i rappresentanti di una porzione almeno della formazione del *trias*. Quest'opinione ancora ha poi ricevuto un'indiretta conferma da osservazioni, che il celebre De Buch ha recentemente istituite sopra i conglomerati rossi delle valli del Bergamasco, che pur si legghino con quelli del lago di Como, conglomerati che presentano analogia moltissima e di posizione e di aspetto mineralogico con quelli della Liguria, e che si volevano ritenere come facienti parte della formazione giurassica.

Il celebre geologo Prussiano ha esaminato un fossile rinvenuto in un lunco subordinato a quelli conglomerati delle valli del Bergamasco, e questo ha pensato essere uno dei fossili del *muschelkalk* il che l'induce a non essere alieno dal vedere in quelle rocce arenacee del Bergamasco dei rappresentanti del *trias*; e da ciò ne viene pure che forse i conglomerati del lago di Como, a quelli vicini, possano essere riguardati come della stessa epoca e che per conseguenza si possa sostenere con tutta ragionevolezza, che il nostro gruppo arenaceo, ossia del verrucano, il quale tutti si accordano a riconoscere analogo a quelli conglomerati del lago di Como, si possa con una certa probabilità riguardare anch'esso come il rappresentante di una porzione del *trias*.

GRUPPO CRISTALLINO.

Al disotto del gruppo arenaceo, ossia del verrucano di cui ci siamo fino ad ora occupati, e quasi fondamento visibile sul quale tutte le altre formazioni della Liguria si appoggiano, esiste una serie di rocce cristalline stratificate, che tutto ci conduce a riguardare come le più antiche del nostro paese, sia che si voglia vedere in esse delle rocce originariamente costituite quali lo sono presentemente, sia che si voglia considerare il loro stato attuale come un effetto di sopravvenute metamorfosi. Noi in tutti i modi denomineremo questa serie il gruppo cristallino e lo riguarderemo come composto di gneis, di scisti micacei, di scisti talcosi, e talora di certi scisti anfibolici.

Lo gneis presenta varietà notevoli che si mostrano indifferentemente su vari punti della sua massa; ora contiene, oltre i suoi soliti elementi, il quarzo e non differisce allora, se non che per la stratificazione da certi graniti; ora invece della mica contiene del talco, e allora diventa uno gneis steatitoso, varietà che predomina generalmente nelle montagne della riviera che si trovano verso le

sorgenti della Bormida, ora infine ha un tal quale aspetto porfirideo vedendosi in mezzo a lui dei cristalli più o meno regolari e distinti di feldspato, ora è glandulare, ora infine ha la composizione che suole essere la più comune ed essenziale di questa roccia, e non è composto se non che di mica e di feldspato.

Lo scisto micaereo presenta minori varietà che lo gneis, ed è facile confonderlo qualche volta con certi filladi, e più cogli scisti talcosi i quali si trovano più abbondantemente sparsi che questo in Liguria: contiene esso talora dei granati, ma in generale è poco ricco di minerali accidentali, giacchè certe tormaline, e certi attinoti che si vedono nelle montagne all'O. del colle di Tenda, si ritrovano di preferenza nello gneis o in certi graniti a piccoli grani, che sono al confine o al contatto del granito o *syenite* porfirioide, e de' quali forse il granito a piccoli grani, non è che una modificazione. Quanto agli scisti talcosi o steascisti mostrano diverse varietà, spesso sono totalmente untuosi al tatto e formano la varietà *steascisto*, *scatitoso* di Brongniart; talora hanno l'aspetto noduloso, talora infine si approssimano allo steascisto cloritico. È da notarsi nondimeno che molte di queste varietà s'incontrano ancor più spesso in quelli scisti talcosi che sono associati alle rocce arenacee, e così non fanno parte del nostro gruppo cristallino.

Lo scisto anfibolico infine ha minore importanza che le rocce precedenti; non presenta ordinariamente che quella varietà che corrisponde all'*anfibolite scistoide* di Brongniart e assai raramente si mostra in mezzo alle altre rocce stratificate e cristalline della Liguria.

Questo gruppo o complesso di cui abbiamo indicato le principali varietà, forma per così dire il nucleo intorno a cui vengono ad adagiarsi, siccome già ne abbiamo dato un cenno, i terreni più recenti; e composti dalle sue rocce si possono osservare in Liguria due principali massicci, siccome già ci è accaduto più volte di far sentire, e di questi due massicci; sebbene non si estendano interamente nella Liguria marittima, ci converrà in intero favellare, perchè delle loro parti non si può scindere la descrizione.

Il primo massiccio cristallino, ossia il più occidentale, è per così dire un grande elissoide di cui l'asse principale è presso a poco diretto dall'O. N. O. all'E. S. E.; la sua estremità occidentale si trova accanto al colle di Pouriac verso le sorgenti della Tinea, ove al di sotto di strati secondarii assai recenti, si vede emergere una montagna

chiamata *Pèbrun*, composta di gneis in cui sono sparse grandi piastre e quasi artoni di ferro oligista. Questo punto si trova situato sulla cateua centrale, di là sia che si discenda nella valle della Stura, sia in quella della Tinea, e che si segua una linea quasi parallela al vertice della catena, si cammina sopra delle rocce appartenenti a questo gruppo e soprattutto sullo gneis e qualche scisto micaceo; queste rocce vengono a finire sulla sinistra della Tinea tra santo Stefano e l'Isola; passano poi sulla destra dello stesso fiume al disotto di quest'ultimo villaggio, e un poco si estendono su detta riva stando alla base dei monti che separano questa valle da quella del Roubion suo affluente. A un'ora circa sopra S. Salvatore, la linea che serve loro di limite si volge all'Est e passa un poco al Sud del vallone di Molières, corre di là lungo la valle del Saleze presso S. Martino di Lantosca, segue la riva meridionale o sinistra della valle di Finestre, va a raggiungere il piede del monte Bego e quello occidentale della cima della Biscia, si volge in seguito al N., traversa la catena centrale, passa per Entraignes nella valle del Gesso e in conseguenza nel versante setentrionale, taglia un poco all'O. di Valdieri il contrafforte che è tra il Gesso e la Stura, e va a raggiungere questo fiume presso Vinadio; questo limite in seguito si mantiene poco lontano dalla riva sinistra fino a ponte Bernardo, ove passa sulla riva meridionale, per ripassare nuovamente poco dopo sulla sinistra, ma soltanto fino a Bergeggi, donde girando bruscamente al S. O. va a raggiungere il colle di Pouriac, situato a poca distanza al Sud da quest'ultimo villaggio.

Tutta l'estensione di montagne comprese dentro questi limiti presenta in generale una grande massa di gneis associata alle altre rocce che abbiamo indicate, vi si sollevano ad una grande altezza, e presentano assolutamente l'aspetto delle grandi alpi. La direzione della stratificazione dello gneis in questo massiccio cambia alquanto secondo i punti in cui si osserva, ma ciò che cangia ancora di più è l'inclinazione degli strati; sembrano infatti generalmente raddrizzarsi appoggiandosi verso il vertice della catena, e inclinano al di fuori di essa immergendosi verso l'emisfero meridionale sul piovante del mediterraneo e verso l'emisfero Nord dal lato del bacino del Po; così nella valle di Molières che si trova sul versante meridionale e presso a poco ugualmente distante dalla estremità del grand'asse dell'elissoide, si vede lo gneis glanduloso e scistoso correre N. E. S. E.

e inclinare al S. O.; in questi contorni però accanto allo gneis vi sono altri banchi ugualmente stentitosi associati a piccoli banchi di calcarea cristallina con forse dell'asbesto, che fanno sospettare vi sia un lembo di roccie metamorfiche più recenti che il restante del gruppo il quale ha maggiormente i caratteri primordiali. Sul piovante settentrionale invece presso Valdieri tra questo borgo e i bagni, lo gneis corre ancora dall'O. N. O. all'E. S. E., ma inclina al N. N. E. La stessa direzione e la stessa inclinazione si osservano pure presso i bagni di Vinadio nello gneis granitoideo di quella vallata, quantunque non lungi da questo punto paia che gli strati avvicinandosi forse ad un'estremità dell'ellissoide pieghino un poeo diversamente, prendendo dapprima la direzione S. O. N. E. e in seguito quella di S. S. O. colle inclinazioni corrispondenti, ma sempre verso l'esterno del massiccio. Lo stesso fenomeno della variazione della stratificazione si presenta quasi nello stesso modo all'estremità orientale dell'asse, cioè verso l'origine della Valancia e della Gordolasca, la prima, affluente della Roia, l'altra della Vesubia, ove gli gneis granitoidei, che passano sotto le arenarie più recenti del monte Bego e si accostano alle cime che stanno a ponente del colle di Tenda, presentano una direzione che si approssima di più a quella del N. al S. avendo l'inclinazione verso l'E.

Questi cangiamenti di stratificazione che seguono i contorni e la figura dell'ellissoide indicano una certa regolarità nei fenomeni che hanno dovuto produrre questi raddrizzamenti e queste inclinazioni degli strati; si potrebbe trovare la spiegazione della causa di questi cangiamenti nei fatti che stiamo per enunciare.

A malgrado che abbiamo detto, essere le montagne dal monte Bego al colle di Pouriac, generalmente composte di roccie cristalline stratificate, nondimeno vi è qualche eccezione, giacchè la parte più centrale di questo massiccio è occupata da roccie di altra natura. Il granito si mostra infatti quasi nel bel mezzo dell'ellissoide nelle montagne che sorgono a ponente del colle di Finestre, e corrono fino al colle di Chatillon verso la valle di sant'Anna. Esso occupa la parte alta del corso del Boreon, di là passa al colle di Frema Morta al disopra di Molières, e poi per la cima di Orgias giunge sul versante N. ai bagni di Valdieri, e in amonte di Entraigues. Questo massiccio di granito in generale biancastro, a struttura porfiroidea con larghi cristalli di feldspato, potrebbe ben essere la ca-

gione del raddrizzamento degli strati che lo circondano, e che vengono ad appoggiarsi su di lui da una parte, ma che da un'altra egli sembra penetrare, e dirò così, modificare per mezzo dei numerosi filoni ch'egli manda in mezzo a detti strati nelle sue vicinanze. Vi sono numerosi esempi di questo fatto dal lato della valle di Finestre, ove la massa della montagna composta di gneis granitoideo sembra frastagliata da filoni o vene di granito a grossa grana. Lo gneis poi nella vicinanza immediata del granito, ha preso una tessitura ancor più cristallina, ed ha esso stesso in alcuni punti l'aspetto d'un vero granito a piccoli grani; pare che analoghe modificazioni si mostrino ancora un poco più all'Est presso i laghi di Vermasca, ove altro picciolo lembo di granito spunta a traverso gli gneis delle vicinanze, i quali quasi possono confondersi con lui; ed è pure in un'analogia modificazione dello gneis, e presso la grande massa granitica del Matto e del colle di Frema Morta, che sorgono le acque termali de' bagni di Valdieri, le quali giungono ad un'altissima temperatura; pare anco che quelle non men calde di Vinadio situate all'O. N. O. in circa, e alla distanza di non moltissimi chilometri dalle precedenti, sorgano da una roccia analoga, disposta in modo da far vedere che dei filoni di granito i quali partono da una massa che non deve essere molto lontana si sono iniettati in mezzo allo gneis: si sa d'altronde che le sorgenti termali sono considerate come indizi di sollevamenti e perturbazioni che può aver subito il terreno in mezzo a cui sorgono. Un'altra sorte di fenomeni che pur si legano al sollevamento e dislocazione del suolo, sono i filoni metalliferi, e di questi se ne possono osservare alcuni in varii punti del massiccio cristallino che noi consideriamo. I principali sono quelli di piombo sulfurato argentifero di Vinadio, quelli delle vicinanze del Nombego e di Tenda, al limite del terreno cristallino, e del gruppo arenaceo, e alcuni altri sia sul piovente Nord verso Bergemole, sia nel piovente meridionale al Sud del vallon di Molières e in alcuni altri punti. Dalle quali cose tutte risulta, che non si può negare che il gruppo cristallino delle alpi marittime non abbia sofferto forti dislocazioni, e che probabilmente il nucleo granitico centrale indicato presso i monti del colle di Frema Morta ne sia stato il principale agente.

Oltre questo granito vi sarebbe anco una specie di roccia anfibolica che si osserva nella valle della Tinea scendendo dal villaggio

d'Isola a S. Salvatore, la quale si potrebbe credere aver contribuito a questi movimenti e dislocazioni, ma si mostra dessa sopra un così picciolo spazio, che difficilmente le si possono attribuire questi giganteschi effetti; è vero però, che il professor Sismonda ha riconosciuto al colle della Longa un'altra massa di una roccia, ch'io sospetto analoga a quella dell'Isola, sebbene il prelodato professore tenda a classificarla colla serpentina, la quale, come che più estendasi, ed è in masse più considerabili, può realmente aver contribuito a cert'une delle dislocazioni degli strati di quelle vicinanze.

Il secondo massiccio di rocce cristalline, che si può osservare in Liguria, è situato più a levante del precedente, ed è anch'esso una specie di ellissoide più allungato, di cui l'asse maggiore è diretto dall'O. qualche grado N. all'E. qualche grado al S.; i suoi contorni meno regolari che quelli del precedente sono più difficili a determinarsi, e non giunge che ad altezze assai minori, potendosi dire inoltre che alcuni banchi i quali si trovano in esso, è cosa dubbia se realmente possano con lui classificarsi, o se pure non si abbiano a riunire a banchi quasi analoghi che si trovano nel terreno arenaceo che lo seguita. Si può dire che comincia ad una piccola distanza all'E. N. E. dell'estremità orientale del massiccio cristallino delle alpi marittime, giacchè lì gneis che s'incontrano verso la Vermenagna, e più quelli della Bresimanda, fanno già parte di quella estensione di terreni cristallini che giungono fino a Savona; questo gruppo occupa poi la parte media delle valli del Pesio, dell'Ellera, della Corsaglia, traversa la valle del Tanaro sotto Garessio, raggiunge l'alto delle valli delle due Bormide, e finisce sulle sponde del mare presso Savona ed Albissola. Esso contiene forse maggior varietà di rocce che il precedente, e pare che gli scisti e gneis talcosi vi predominino. Le direzioni ed inclinazioni dei banchi vi sono tanto variate, quanto nel più occidentale, e siccome questo massiccio non occupa che sopra una picciolissima parte della sua estensione il vertice della catena centrale, la quale esso taglia obliquamente, così è più difficile di coordinare colla direzione di questa, la direzione e l'inclinazione degli strati medesimi.

Si può dire nondimeno che supponendo una linea diretta dall'O. pochi gradi al N., all'E. pochi gradi al S., la quale partendo dalle montagne che sono al disopra, e all'Est del Vernante nella valle della Vermenagna, giunga nelle vicinanze di Savona, gli strati sono

generalmente diretti come essa, e che eretto in alcuni punti inclinano da un lato e dall'altro di questa linea, cioè da una parte presso a poco verso il N. N. E., e dall'altra verso il S. S. O., così nella valle del Pesio, dopo aver traversata la zona calcarea che sta verso la pianura ed inclina al N., si trovano sotto di lei delli gneis steatitosi inclinati dapprima nello stesso senso, che passano tosto ad avere un'inclinazione contraria, cioè sono volti al S. S. O. e vanno ad immergersi sotto la calcarea del Carsino, inclinata essa pure S. S. O. e faciente parte della zona meridionale. Lo stesso andamento si presenta pure più a levante in val di Corsaglia e di Casotto, e nella parte della valle del Tanaro che è fra Garesio e Bagnaseo; lo gneis steatitoso, che è più vicino alla prima di queste due terre, inclina verso l'emisfero Sud per immergersi sotto la catena centrale, e quello che è più verso Bagnaseo inclina al N. N. E.; lo stesso accade nella valle della Bormida da Murialdo a Calissano, ove gli steascisti lucidi alternanti con scisti anfibolici e sovrapposti a gneis steatitosi con aspetto granitoideo, inclinano da un lato N. N. E. immergendosi sotto la calcarea granulare di Millesimo, e dall'altro verso S. S. O. passando sotto le rocce di quarzo steatitoso, le puddinghe e la calcarea compatta di rocca Barbena e di monte Calvo, che pendono esse pure verso il Mediterraneo. Gli stessi fenomeni si ripetono ancor più lungi a Settepani e Melogno, ma le direzioni nel senso dell'O. N. O. all'E. S. E. sono meno generali e costanti; delle masse di granito che sorgono in mezzo allo gneis alle spalle di Savona e l'accostarsi delle grandi masse serpentinosi che s'incontrano a levante di Savona e Albissola, sembrano aver sturbate queste direzioni, le quali sono cambiate invece in quelle di S. S. O., N. N. E.

Nella parte orientale del gruppo che siamo andati indicando, lo gneis e delle specie di micascisto alternano talora con specie di scisti anfibolici neri, come presso Savona ed Ellea e con scisti cloritici come all'Alpicella al N. di Varagine. Si è anco da questo lato che il detto gruppo è più frequentemente tagliato da vene e filoni granitici, dei quali non si vedono tracce nella parte più occidentale; quanto ai filoni metallici non sono nè molto notevoli nè molto frequenti, vi sono nondimeno delle tracce di piombo sulfurato argentifero nello gneis delle vicinanze di Garesio; in quello di Rialto presso Finale e non lungi da Quiliano nella valle della Corsaglia, il filone di ferro che si scava a Montaldo, sembra piuttosto essere negli scisti talcosi e rocce quarzose del gruppo arenaceo.

Oltre poi i due massicci principali di sopra indicati, altri se ne trovano nelle loro vicinanze e questi sono un picciolo lembo ad Ormea e un altro più vasto verso Noceto, ma siccome sono fuori della regione di cui ci occupiamo, nè la cognizione delle loro particolarità è necessaria alla spiegazione dei fatti che si osservano nella Liguria marittima, così ci asterremo dal farne parola.

Più oltre infine ed a levante di Albissola non si può dire che vi sia traccia di rocce riferibili al gruppo di cui ci stiamo occupando; per così dire a dare la storia, e non è se non che all'estremità orientale della Liguria al capo Corvo, cioè che esiste un picciolo lembo di scisto alquanto micaceo che si sarebbe dapprima tentato di riferire al nostro gruppo cristallino, ma che però è assai più probabile faccia parte del gruppo arenaceo, ai cui aggregati in quella località egli si può dire assai intimamente legato.

ROCCHE DI TRABOCCO.

Fin qui le rocce di cui ci siamo occupati hanno un'origine comune e prodotti sono di sedimenti operatisi in mezzo ad un fluido, sia che gli elementi delle dette rocce vi fossero allo stato di una soluzione meccanica, o a quello di soluzione chimica; questa loro origine viene indicata dal modo con cui dette rocce sono disposte in istrati, cioè più o meno distinti, che dimostrano l'essersi esse successivamente depositate in una posizione dapprima orizzontale, o almeno non molto inclinata, cambiata poi in altre assai inclinate, e anco verticali dalle successive rivoluzioni o sconvolgimenti, che ne alterarono la originaria posizione, e modificarono perfino la natura delle rocce medesime. Quelle di cui ora infine ci resta a favellare, hanno una ben diversa origine, e partite dall'interno in uno stato di fusione, o di semifusione, vennero alla luce in masse ingenti traboccando alla superficie della terra, pertanto giustamente il nome di rocce di trabocco può loro accordarsi. Le principali tra queste sono il granito, il porfido e le rocce serpentinosi, tra le quali anco possono comprendersi certe rocce, che si accostano alla classe delle anfiboliche.

GRANITO.

Il granito nella Liguria non ha grande importanza, e fatta eccezione di quello che abbiamo indicato nel cuore della giogaia centrale delle Alpi marittime, ove si mostra in una massa assai potente che dirama per così dire dei filoni laterali attraverso lo gneis e gli scisti cristallini, non vi sono che le vicinanze di Savona e di Albissola che ne presentino qualche lembo isolato. Quello delle Alpi marittime è in generale di un colore grigio con larghi cristalli di feldspato e perciò presenta la struttura porfiroidea; parte invece di quello delle vicinanze di Savona ha una struttura alquanto diversa; in quest'ultimo infatti gli elementi in generale hanno presso a poco tutti le stesse proporzioni, e la mica prende un colore verdastro, potendosi dubitare anco che talora non vi sia sostituito del talco, onde quella roccia piuttosto una protogine che un vero granito potrebbe chiamarsi; in questo granito frequentemente la cristallizzazione degli elementi non è tanto marcata e quasi si direbbe che cade in disaggregazione. Tale è in gran parte la roccia di cui sono composte le montagne di pian del Merlo e di Cà de' Ferrè mentre in alcuni punti più vicini al colle di Cadibona accenna un poco di più alla struttura porfiroidea, la quale è poi marcatissima nel masso granitico che si trova nelle vicinanze di Albissola, cioè tra il Riabasco e il paese di Ellera ove abbondano larghi cristalli di feldspato e la mica ha un colore grigio scuro; quest'ultimo masso manda pure dei filoni negli gneis e negli scisti anfibolici che sono in quelli dintorni.

Un'osservazione si potrebbe fare non circa il granito del Riabasco, di cui in ultimo abbiamo fatto parola, ma di quello ad aspetto più disaggregato e talcoso, ed è che guardandolo indigrosso potrebbe confondersi con certe varietà di eufotidi e forse di eufotidi talcosi che regnano più verso Genova, cioè a Varagine, eufotidi alle quali il detto granito verso l'alto della catena anco geograficamente assai si ravvicina.

Nel favellare di uu terreno o di una formazione, uno dei principali scopi che si prefigge la geologia, si è di fissare l'epoca relativa in cui si suppone che detto terreno siasi depositato, e se si tratta di rocce di trabocco la scienza cerca in qual epoca siano desse

romparse alla superficie; sarebbe quindi importante di stabilire qualche cosa circa i graniti della Liguria relativamente alla loro apparizione e veder per esempio se prima o dopo siano sorti che le rocce serpentinosi, le quali hanno tanta parte negli accidenti del suolo della Liguria soprattutto orientale; ma in queste ricerche ci mancano quei dati che soli possono positivamente decidere la questione. Qui tra noi infatti non è per esempio come all' Isola d' Elba, ove la serpentina è traversata da una particolare specie di granito, perlocchè questo a quella posteriore bisogna asserire. Noi a mia cognizione non possiamo in nessun luogo vedere il contatto tra le due rocce eruttive, onde nulla di sicuro può asseverarsi. Varie congetture però tenderebbero a farmi pensare che il granito che si rinviene in Liguria sia alla serpentina anteriore; ed infatti pare che di questo granito esistano già dei rottami in alcuni degli aggregati del Verrucano, che tutto conduce a credere essersi 'prima dell' apparizione della serpentina depositato. Inoltre, sebbene sia difficile l' accertare l' identità delle due specie di granito, esistono certi massi di questa roccia conomitanti le breccie serpentinosi e i quali per conseguenza si può supporre che fossero alla serpentina, la quale gli ha divelti dalle viscere della terra, anteriori, massi che hanno una tal quale analogia col granito della riviera di Ponente; per locchè il sentimento che il granito nostro sia alla serpentina anteriore, si può con un certo fondamento sostenere.

PORFIDO.

Se non è molta l' importanza del granito, minore ancora d' assai si è quella del porfido, il quale soltanto a due località e a picciolissima estensione di paese si limita, anzi può dirsi quasi, che nella parte della Liguria che è oggetto della presente nota non esista realmente, trovandosi soltanto nelle montagne che sono immediatamente fuori dei confini della medesima. Un masso di questa roccia è quello del colle del Pas già da noi indicato, un altro trovasi nelle vicinanze d' Ormea. Il colore della pasta di questo porfido è ordinariamente rosso, ve ne è però di quello che tira un poco sul verde. I cristalli di feldspato non vi sono molto bene determinati e quasi sembrano leggermente ottusi agli angoli, il quarzo non vi è abbondante, ma piccioli amoni di materia verde vi sono frequenti.

Tali sono i caratteri ch'egli generalmente presenta nella valle del Tanaro, ove se n'incontrano potenti massi rotolati nel letto stesso del fiume, senza che però il masso originario d'onde sono staccati si mostri per gran tratto allo scoperto, pare che la sede sua principale sia nelle montagne immediate ad Ormea e alle Viosenne ove esiste anche quella varietà di questa roccia ch'è colorata in verde. Questo porfido è generalmente in mezzo al verrucano ed è accompagnato dagli aggregati più o meno grossolani di questa formazione. Questa sua posizione richiama alla memoria come nel non lontanissimo dipartimento del Varo, il porfido rosso quarzifero il meglio caratterizzato, sia sviluppato tutt'all'intorno dagli aggregati di una delle suddivisioni del *trias*, coi quali anco gli aggregati del verrucano della contea di Nizza hanno tanta analogia.

ROCCIE SERPENTINOSE.

Più importante assai che quella del granito, e che quella del porfido, si è la parte che hanno nella nostra Liguria le rocce serpentinose, infatti regnano sopra grandissima estensione della medesima e causa sono, dirò visibile, dei mutamenti notabilissimi, che hanno subiti i terreni sedimentosi, attraverso i quali dette rocce sono venute a traboccare alla superficie del suolo.

Sotto questo gruppo delle rocce serpentinose, io comprendo e le diverse varietà di enfotide, e quelle più numerose ancora di ofiolite e di oficalce, non che certe rocce anfiboliche verdi, fusibili in smalto nero, con qualche rarissimo cristallo di feldspato allungato, che si direbbe vitreo, rocce che si mischiano tra di loro, e che è difficile molto per non dire impossibile l'assequerare che non siano di un'unica formazione. Riunisco poi a questo gruppo serpentinoso alcune di quelle rocce sedimentose che sono talmente modificate dalle rocce ignee vicine, che con queste quasi si confondono, non che quelle breccie che prodotto sono dell'eruzione o del trabocco della serpentina, giacchè di essa composte e dei frammenti delle rocce che traversava, e i quali portava seco nella sua uscita dall'interno della terra.

Le varietà principali dell'enfotide che abbiamo tra noi, sono quelle dell'enfotide scistosa in cui pare che alcun poco talco si associi alla diallagia; quella detta verde di Corsica, in cui ad un giadio bianco

violaceo si associa la diallagia di color verde pistacchio chiaro; altra varietà infine assai notevole è quella in cui col giadio o feldspato è abbondante la diallagia metalloide color di bronzo.

Quanto alle varietà di rocce ofiolitiche sono tanto numerose e si trascinano da una nell'altra che è superfluo il notarle, ve ne ha però della scagliosa, di quella compatta nera che pare quasi basalte, di quella tutta ripiena di lamine di diallagia per cui ofiolite diallagica può essere denominata, siccome ve ne è altra con molto asbesto che pertanto asbestifera potrà chiamarsi.

Il primo masso di rocce serpentinosi che incontrasi da chi vien da ponente e lungo il litorale è un poco prima di Savona a Vado, ma è questo isolato e di pochissima importanza; non comincia realmente a vedersi la formazione serpentinosi che presso Varagine, ove un' eufotide dapprima un poco scistosa, poi invece molto massiccia e compatta forma i monti del così detto piano d'Invrea; con quest' eufotide trovasi anco una serpentina compatta verde scura, la quale, se si potesse fare una distinzione di epoca di eruzione tra le due rocce, si direbbe che è posteriore, perchè ha l'apparenza di tagliare detta eufotide. Passato il picciolo paese d'Invrea la serpentina continua dietro Cogoleto ed Arenzano, e in mezzo a banchi di scisto di aspetto cristallino, sebbene forse dell'epoca del macigno e della creta, manda ora degli enormi dykes alle rive del mare, ora si alza fino in cima alle alte montagne che formano la catena centrale alle spalle di Arenzano e di Voltri, ove al monte Faiallo raggiunge l'altitudine di più di 1200 metri. Di là seguita sul versante Nord dell'apennino, formando una gran parte dei monti che dall'origine dell'Olba si estendono fino ad Ovada; nei quali monti con la serpentina sono associate rocce attinotose e altre contenenti del ferro ottadro ossidato; si è anco in rocce dipendenti o almeno legate colla serpentina che fu trovata dal professor Viviani di chiara memoria la *ligurite*, la quale pare che si accosti molto ad uno sfeno.

Parallela alla zona accennata, la quale deve considerarsi come un enorme dykes diretto dal S. S. O. al N. N. E., esiste un'altra più stretta zona delle stesse rocce serpentinosi, la quale comincia dopo Voltri e corre nello stesso senso che la precedente dai monti sopra Prà, cioè dal Martino e la Scaglia ai monti all'origine della Polcevera, e a quelli delle Figne e del Tuggio che stanno alle sorgenti della Stura, della Peota e del Crozente. Questa zona comprende ogni

modo di varietà di rocce serpentinosi e in ispecial maniera eufotidi e serpentine diallagiche; manda qualche ramo laterale che la congiunge colla zona precedente presso Campo e Rossiglione e confina colle colline di terreno terziario medio del Monferrato, essendone soltanto divisa da una non larga striscia di scisti talcosi lucidi, probabilmente modificazioni di certi scisti del macigno; questo stesso aspetto, dirò antico, hanno ugualmente gli scisti semimicacei del canale dell'Aequa Santa che si trovano rinchiusi tra le due zone serpentinosi che abbiamo indicate. In questa massa serpentinosi, sia che si trovino nell'ofiolite stessa o in alcuni scisti che ne dipendono, s'incontrano filoni generalmente di poca potenza, di un quarzo cellulare ocraceo che contiene ferro e qualche granellino d'oro, ed è nelle alluvioni che scendono da questi monti o dai colli terziari medii composti dai detriti delle rocce serpentinosi, che un tempo si faceva una pesca assai proficua d'oro nei letti dei torrenti Olba, Stura e soprattutto Peota e Crozente. In pari modo da questo massiccio di monti in gran parte composti di rocce serpentinosi, scendono quelle sabbie ferro-titanifere, ossia di Manakanite che trovansi sulle spiagge di Pegli, e delle quali si sono dette cose non poche circa la loro influenza, e anco ad una certa distanza, sull'ago magnetico. Ugualmente queste serpentine dei monti all'origine della Varenna, presentano delle specie d'incrostazioni e vene silicee calcedoniose che hanno somiglianza a quelle tanto celebrate nelle serpentine di parte del Piemonte.

Dopo questa seconda zona, la quale è sopra Pegli, un'altra, venendo verso levante, ancor se ne trova prima di giungere a Genova ed è quella che comincia al capo di sant'Andrea e corre pei monti detti *Bigie* che fiancheggiano la destra sponda della Polcevera fino a nostra Donna della Guardia. La serpentina propriamente detta ha minor parte in questa catena, la quale è più particolarmente composta di rocce anfiboliche o di grunstein; queste or sono più marettamente cristalline, or quasi assolutamente terrose e disaggregate. Non so se debbansi dire anteriori o posteriori alla serpentina, la quale in alcuni punti ha l'aria di tagliarle; nondimeno sospetto che alcune parti possano anco essere larghe modificazioni di altri terreni, ed è quando formano quell'impasto che chiamasi forse gabbro grossolano dai toscani. Alcune porzioni di questa roccia anfibolica sono variolitiche altre assolutamente scoriacee; l'epidoto non è raro in essa o nelle

rocce che l'avvicinano. Un qualche filone a pasta feldspatica e con cristalli di feldspato, però non ben determinati, avente l'aspetto di un portulo verde, ossia meglio di una roccia che somiglia alle ofiti taglia certe serpentine in questa zona. Nella serpentina anco spettante a questa zona che trovasi nella valle della Ceravagna dietro Sestri a ponente, un filone di pirite cupriferà era un tempo escavato, non tanto pel poco rame che se ne ritraeva, quanto per ottenere, mediante la combinazione della magnesia della ganga e dell'arido solforico sviluppatosi nell'operazione del tostamento del minerale, il solfato di magnesia che allor vendevasi a caro prezzo; ma perfezionatisi successivamente i metodi pe' quali può ottenersi artificialmente quel sale in modo più economico, fu abbandonata l'estrazione di quella miniera. I cambiamenti che questa terza zona di rocce serpentinosi ha fatto subire alle rocce sedimentose che l'avvicinano, eccettuate quelle che forse furono mutate in gabbro e che presentano un aspetto un poco brecciato, in cui i frammenti sono fusi insieme, sembrano meno intense che quelle ragionate dalle altre varietà di rocce serpentinosi e dalle altre due zone precedentemente indicate; gli seisti infatti che sono accanto a questa terza zona non hanno preso quell'aspetto cristallino ed antico che hanno verso Voltri per cui somigliano quasi a degli seisti micacei; ma la ragione forse si è che in quest'ultimo luogo le masse sedimentose erano da ogni parte avvolte e contornate dalla serpentina, e verso Genova invece non sentivano questo potente agente di modificazione, se non che da un solo lato. Collegato ugualmente con questa terza zona, pare quel picciolo lembo di gesso che trovasi ad Isoverde in Polcevera tra le calcaree e gli seisti argillosi, che avvicinano una picciola isola serpentinosi dipendente da questa zona, località ove per così dire si tocca con mano che i vapori solfurei sviluppatisi all'epoca del trabocco della serpentina sono quelli che hanno cangiato in solfato di calce, il carbonato calcareo che ivi esisteva, potendosi quasi seguire tale operazione nell'osservare come le calcaree che avvicinano il gesso, furono rese porose dai vapori che le traversavano modificandole.

Dipendenti ancora da questa zona sono quei molteplici filoni e vene di quarzo che in vari sensi traversano gli seisti lucidi di una gran parte della riva destra della Polcevera e che tendono a dare un aspetto di antichità a rocce, le quali probabilmente occupano un posto assai moderno nella scala geologica. Oltre quest'azione imme-

diata della zona serpentinoso della Guardia sui scisti che l'avvicinano, sarei tentato di attribuire a rocce anfiboliche analoghe a quelle che ne formano gran parte, quei movimenti e sollevamenti che osservansi in alcune parti del Bisagno, ove sotto specie di volte o cupole di calcarea a fucoidi sollevata, compariscono delle argille e scisti rossicci bruni e verdi con manganese e con frequenti sublimazioni di rame; sono portato tanto più ad attribuir questi effetti a parte delle rocce anfiboliche del gruppo serpentinoso, chè di queste rocce ho trovato appunto traccia presso questi centri di sollevamento, i quali se ben si osserva la loro direzione, sono allineati nel senso di S. S. O., N. N. E., il che potrebbe farci dire che sebbene quasi interamente nascosta, vi sono indizii di una quarta zona serpentinoso, e questa è immediatamente a levante di Genova, mentre le altre già notate sono a ponente della stessa città; farà però mestieri osservare che in questa linea, la roccia ignea ha avuto bensì il potere di spingere in alto le rocce sedimentose soprastanti, ma non ha avuto quello di trahoccare essa stessa alla superficie.

Passata questa terza zona, e le immediate vicinanze di Genova, le rocce serpentinoso non ricompariscono più nelle vicinanze del litorale che al di là di Chiavari, e nei monti che sono alle spalle di Sestri di Levante. In questa parte della Liguria, moltiplicatissime sono le masse serpentinoso, come può ben vedersi dall'abbozzo di carta geologica che a questa nota si aggiunge, e alla quale per brevità rimandiamo.

Il primo massiccio di queste rocce della riviera di Levante può dirsi quello di Bargone e di monte Pù, ove ofioliti accompagnate da qualche eufotide, ma anche dalle già descritte rocce anfiboliche soventi volte variolitiche e spesso scoriacee di un color bruno e quasi color di ferro, corrono pei monti che sono tra la Casarza e la Gravaglia, e quindi vanno verso le sorgenti della Vara da una parte, e quelle della Sturla dall'altra, per passar poi, ma con varie interruzioni, sul piovante Nord nel contrafforte tra la Trebbia e l'Aveto, e più nei monti che sono sopra santo Stefano d'Aveto e alle sorgenti della Nura, del Ceno e del Taro donde frequentissime diramazioni però in molte delle loro parti nascoste, si protendono in tutte quelle catene secondarie che vanno dal giogo alle pianure del Piacentino e del Parmigiano. Questa massa di serpentina che va da Sestri a Varese, è notevole per le modificazioni prodotte nella calcarea di una delle

suddivisioni del macigno che l'avvicinano, pare che l'abbia resa molto dura e compatta, privata de' suoi colori e resa quasi silicea; questa stessa serpentina ha anco modificato in diaspro le argille della montagna di Bargone, che sono legate colla calcarea su mentovata.

Ma il fenomeno più notevole che accompagna queste serpentine che sono all'origine della Sturla e quelle di S.^{to} Stefano d'Aveto, di Arpe piana, di Rovegno sul versante N. si è la grandissima quantità di breccie e aggregati che per così dire avviluppano e fasciano in alcuni punti queste serpentine medesime. Tali breccie sono composte di cogoli medioeremente rotondati delle rocce molteplici, che si trovavano sul passaggio della serpentina al momento del suo trabocco, e delle quali essa portò seco i numerosi rottami, legandoli talora della propria pasta o indurendo e mutando quasi in diaspro o in un argilla assai dura quella melma o quella riunione di particelle più attenuate, che s'interponevano tra i pezzi più grossi e che quasi di cemento a loro dovevano servire. Tra questi rottami vi sono molte calcaree le quali sono diventate e compattissime e qualche poco silicee, sovente hanno preso una tinta verde chiara, e le parti che le collegano, quando non siano di serpentina, della qual roccia nelle breccie esistono pure delle parti ben determinate, sono di una specie di scisto rosso bruno jaspoide; a Rovegno alcuni cristalli di un feldspato roseo o carnicino pur vi si trovano, e questi in pari modo hanno apparenza di essere stati staccati da rocce preesistenti e non di essersi formati in mezzo alla pasta della breccia medesima; in questo luogo detto di Rovegno in val di Trebbia, la breccia è accompagnata dal diaspro e la serpentina che l'ha generata ha un aspetto nero compatto e contiene della diallagia.

Ma quello che rende più interessante ancora molte delle località dell'Apennino nostro in cui si trovano serpentine, si è il presentarsi presso di loro un fatto, che riprodottosi in epoche più recenti su grandissima scala, intorno alle alte e grandi catene di montagne, tanto ha esercitato la fervida immaginazione de' geologi a ricercare la probabile cagione che l'abbia prodotto; io voglio parlare di massi erratici, cioè della presenza de' grandi o piccioli massi di rocce di una data natura, delle quali nella regione ove s'incontrano questi viaggiatori, non v'è indizio alcuno apparente che esistano *in situ* montagne o masse grandiose da cui sono stati staccati; anco dun-

que le vostre montagne hanuo i loro massi erratici, ma tutto indica che sono di diversa origine, siccome di epoca diversa da quelli per esempio che sono ai piedi delle alpi in molti punti della gran valle Svizzera, che sta tra quei monti e la catena del Giura, diversi da quelli che sul versante Italiano delle medesime alpi si trovano accumulati, e ad altezze considerabili allo sbocco delle principali valli che scendono da quei monti, come presso il lago di Como sui colli della Brianza ec. Anco i vostri massi dell'apennino sono, come molti di quelli delle alpi, di granito, e noi non abbiamo granito in posto più a levante di Albissola, nè la disposizione de' monti può permettere che si suppongano venuti e staccati dai piccioli lembi che trovansi presso Savona, e portati da forze superficiali ad altezze tre o quattro volte maggiori di quelle che hanno i monti dai quali si vorrebbero far provenire; nè per altra parte i massi dell'apennino somigliano quanto alla qualità del granito, a quelli più generalmente sparsi nelle alpi, onde nè anche da queste per nessuna maniera può immaginarsi che siano provenuti. La sola spiegazione probabile di tal fenomeno si è, che al disotto delle formazioni sedimentose della Liguria orientale, esistano non visibili, delle grandi masse di quel peculiare granito di cui sono generalmente composti i massi erratici della Liguria, e che questi all'epoca dell'uscita della serpentina siano da lei stati portati in alto, come perfettamente lo fa credere la loro posizione sempre legata colla serpentina che spesso gli avviluppa, e l'essere dessi riuniti ordinariamente alle breccie, la formazione delle quali alla medesima roccia dobbiamo attribuire.

Che questa particolare specie di granito col feldspato ordinariamente color di rosa o carnicino colla mica di un aspetto brillantissimo nero, di cui sono formati i massi erratici della Liguria, esista realmente al disotto delle formazioni secondarie di questa regione, ne è anche una prova un certo banco frammentario trovato tra gli strati delle argille e della calcarea a fucoidi del macigno nelle vicinanze di Borgo Ratto nel Vogherese, il quale banco è tutto composto di rottami che si vedono venuti poco da lungi, perchè quasi angolari, di un granito assolutamente identico a quello de' massi erratici, e di questo banco ve ne sono altri esempi verso le valli della Trebbia e della Nura, regioni nelle quali principalmente è meno raro il fenomeno de' massi erratici, che noi collo Studer chiameremo secondarii, perchè nell'epoca dell'apparizione delle serpentine devono

essere venuti alla superficie, mentre quelli del piede delle alpi in un'epoca più recente sono stati portati o dalle correnti o dai ghiacciai nel posto in cui or si ritrovano.

Oltre la serie di protuberanze di rocce serpentinosi indicate nella valle della Casarza, all'origine di quelle della Sturla e della Vara, progredendo più a levante altre se n'incontrano. Tra queste notevolissima è quella che si segue lungo la strada da Bracco a Mattarana, protuberanza in cui domina l'eufotide, e soprattutto quella bellissima varietà in cui la diallagia ha un aspetto metalloide color di bronzo, varietà in cui sovente oltre il giadio bianco, esistono delle parti rosse probabilmente petro-silicee le quali possono formare di quelle masse una bella pietra di ornamento, siccome può dirsi bellissimo il diaspro rosso, e quello screziato, che verso Levante e Rocchetta di Cravignola si mostra accanto ad altra delle tante numerose isole ofiolitiche, che qua e là lungo la Vara, e lungo il corso de' suoi affluenti si vedono sorgere ad ogni passo. Nelle vicinanze di Levante un filone ferifero accompagna la serpentina, siccome alla già nominata Rocchetta di Cravignola; il rame che si trova nelle rocce a contatto di lei e il manganese, sono senza dubbio dovuti a sublimazioni provenienti da questa roccia all'epoca del suo trabocco. Di queste tracce di minerale di rame ne esistono poi anche ad Ambrusco nella valle dell'Aveto, ed è pure escavata una miniera di ferro nella serpentina medesima al luogo detto *le Ferriere* nella valle della Nura; lungo cui frequenti ancora sono queste masse ofiolitiche le quali generalmente formano delle specie di cupole più o meno elevate. I monti di Mossolasca sopra S.^{to} Stefano d'Aveto, quelli dell'Ariona sulla catena centrale alle sorgenti della Sturla e del Taro che giungono all'altitudine il primo di circa 1800 metri, il secondo di 1600, sono formati o dalla serpentina o dalle rocce del suo gruppo.

Troppo lunga cosa sarebbe poi se si volesse citare nominalmente i massi tutti isolati di rocce che trovansi e nei monti della catena centrale che corre dalle sorgenti della Vara a quelle della Magra e in quelli che seguono il corso di ambi questi fiumi; ci limiteremo pertanto a quanto circa questo gruppo abbiamo detto. Un'osservazione però ci occorre, ed è che può dirsi, che siccome a ponente di Genova le masse serpentinosi sono allungate nel senso del S. S. O. N. N. E., così a un bel circa può dirsi che sono allineate le serie delle

protuberanze ofiolitiche in riviera di Levante, e in quelle parti del versante Nord dell'apennino che lor corrispondono, potendosi di queste protuberanze, per così dire, riconoscere due serie, una più orientale, l'altra più occidentale; è da notarsi però che questo allineamento S. S. O. N. N. E. si muta un poco in quello di N. O. S. E. ove si prendano a considerare soltanto le masse che corrono da Levante alle sorgenti della Vara.

Indicata in questo modo la situazione di molte delle masse serpentinosi della Liguria, ci rimane ora soltanto a cercare qual sia l'epoca probabile del trabocco di questa roccia. In tutte le formazioni secondarie della nostra regione, compresovi il macigno e la calcarea a fucoidi, non mi è riuscito mai di trovare frammento alcuno rotolato di serpentina, onde potersi dire che questa roccia esistesse già alla superficie, quando quelle formazioni sedimentose si depositavano, giacchè le breccie ofiolitiche di cui abbiamo fatto parola, sebbene in mezzo ai terreni secondarii, non ne fan parte e soltanto sono come la fasciatura della roccia in fusione. I primi indizi di ciottoli rotolati serpentinosi si trovano, e in grande abbondanza, nei terreni terziarii, e specialmente nei terreni terziarii medii, onde nell'intervallo delle due epoche pare che la serpentina, e le rocce serpentinosi siano venute al giorno.

In alcuni luoghi vi è apparenza che una parte della serpentina fosse già bella e formata quando il terreno terziario medio si depositava; in altri punti però vi sono grandi indizi che il suolo subisse dei movimenti, e questi dovuti anco al sollevamento delle serpentine posteriormente al periodo terziario medio, il qual sollevamento corrisponderebbe a quello delle alpi occidentali, cioè a quello avvenuto nella direzione S. S. O. N. N. E., donde si può concludere che forse una porzione delle rocce serpentinosi emergesse prima del periodo terziario medio, e l'altra posteriormente a lui, senza di che non si potrebbe conciliare la presenza d'infinita quantità di ciottoli serpentinosi in questo terreno, coll'attribuire dall'altra all'apparizione della serpentina i dislocamenti considerabili che ha sofferti, dislocamenti che tenendo conto delle direzioni non si possono distinguere da quelli delle alpi occidentali, i quali d'altronde tutto conduce a credere dovuti realmente all'emersione di masse serpentinosi. Sarebbe poi in questa questione dell'epoca, in cui le rocce serpentinosi traboccarono, pregio dell'opera, il poter dire quale tra loro precedesse

se l'eufotide, cioè o l'ofiolite, ma sebbene da alcuni si sia tentato d'indicarla, io la credo cosa molto difficile, giacchè tale è l'intersecarsi delle due rocce, tale il modo con cui si mischiano e si fondono insieme e fanno passaggio dall'una all'altra, che non è ragionevole il separarle.

Coll'indicazione delle rocce serpentinosi e de' fatti che le accompagnano, io credo aver messo fine a quanto dovea dire circa le formazioni principali che costituiscono il suolo della nostra Liguria; vorrebbe ora il complemento della descrizione, che si desse una nota dei principali minerali che in essa si trovano. Ma superflua cosa io estimo questo catalogo, il quale inoltre riuscirebbe brevissimo, perchè mano a mano che di una formazione ci siamo occupati, quasi tutti i singoli minerali anco accidentali che in quella si trovano siamo andati enumerando, onde questo catalogo sarebbe una vera ripetizione. E se poi abbiamo taciuto di alcuni minerali come per esempio dell'arsenico solfurato di Luceram nella contea di Nizza, se non abbiain indicato la barite, l'arragonite e altri minerali che sono generali in tutti i filoni, se abbiain lasciato da parte i granati e qualche altro minerale che trovasi colle serpentine e cogli scisti sia cristallini che metamorfici, si è perchè ben poca importanza potevano avere, ed il quadro adottato per questi semplici cenni geologici sulla Liguria non permetteva di allargare una descrizione che quasi già oltrepassa i limiti che venivano prescritti, e la quale nondimeno è molto lungi da quella che il soggetto avrebbe desiderato.

Osservazioni di un altro genere, seguendo i modi coi quali or si desidera che sia studiata la geologia di un paese, pur si richiederebbe che venissero notate e sono quelle che concernono i diversi sollevamenti dai quali il suolo nostro pare sia stato affetto, e de' quali l'insieme ha concorso a dare al medesimo l'attuale sua fisionomia; ma oltre che non sempre chiaramente nel loro intralciamento possono detti sollevamenti distinguersi, il dire minutamente ove regna l'uno o l'altro di essi esigerebbe troppo lungo discorso, così mi starò contento ad accennare che tracce, ma molto oscure del sollevamento del monte Viso cioè di quello che diretto N. N. O. S. S. E. si è effettuato tra l'epoca della creta inferiore e quella della creta superiore, possono forse vedersi in alcuni punti della contea di Nizza e verso Antibio. Che più inarcate e molteplici tracce dell'altro sistema chiamato de' Pirenei e degli Apennini si vedono frequente-

mente in riviera di Ponente e in quella di Levante e che a questo si devono riferire gli accidenti del suolo diretti presso a poco O. N. O. E. N. E. Accennerò che se del sistema Sardo-Corso cioè diretto N. S. molto dubbiosamente si possono supporre delle tracce in alcuni allineamenti di sommità verso l'estrema Liguria orientale, invece sono notevolissime le impronte del sollevamento delle Alpi occidentali, al quale si devono le direzioni S. S. O. N. N. E. degli strati del macigno e della calcarea a fucoidi delle vicinanze di Genova e dei monti liguri, non che quelle nello stesso senso delle mollasse di Portofino, della valle di Scrivia e delle valli dell'Erro e della Bormida; indicherò come questo sollevamento delle alpi occidentali fu accompagnato probabilmente dall'ultimo trabocco delle serpentine, le masse delle quali sono allincate nel suo medesimo senso e terminerò con dire che infine una qualche, ma dubbiosa traccia del sollevamento delle grandi Alpi, ossia delle Alpi orientali forse si può riconoscere là ove si vedono portati in alto i banchi del più recente tra i terreni terziarii, cioè quelli del terreno subapennino.

Chi poi per metter termine a questa descrizione volesse indicare quale probabilmente fosse l'aspetto del nostro paese alle diverse epoche geologiche da noi passate a rassegna, lasciate da parte le più antiche circa le quali è impossibile il pronunziar qualche cosa di men inesatto, potrà dire che prima dell'epoca terziaria media e durante la medesima probabilmente il massiccio della riviera di Ponente era separato dalle masse delle montagne di quella di Levante, e che perciò il luogo, ove sono ora i monti a levante di Genova, formava un'isola separata per un braccio di mare dai monti i quali sono al di là di Savona, e che all'epoca del sollevamento delle Alpi occidentali coll'alzarsi del suolo, là ove è ora il giogo di S.^{ta} Giustina sovra Sassello e ove sono le valli della Bormida e dell'Erro, si saldò la parte dell'Apennino che sta a levante di Genova con quella che sta più a ponente, e che allora si fece la separazione del bacino del mediterraneo da quello della Lombardia o dell'Adriatico. Si potrà dire infine che un ultimo movimento avendo nell'epoca del terreno terziario subapennino fatti emergere i piccoli lembi di tal terreno, che nel nostro paese si trovano, ha dato alla stretta zona di terra che sta tra il vertice dell'Apennino ed il mare mediterraneo cioè alla Liguria marittima, la sua attuale configurazione.





AL LETTORE

Il lavoro che presentiamo ai lettori della Guida sulla meteorologia della Liguria, o più esattamente parlando della città di Genova, è opera del chiarissimo professore D. Giacomo Garibaldi che la morte ha da poco rapito alle scienze all'affetto ed all'ammirazione di quelli cui era dato di conoscerlo intimamente. Caldo egli dell'amore della sua patria cercò sempre per quanto era da lui, promoverne il decoro ed il lustro; ed infatti a lui si deve primieramente lo stabilimento dell'osservatorio meteorologico della nostra Università, e per mezzo di questo gli fu dato di constatare fatti molteplici circa la nostra meteorologia, che dapprima soltanto sospettavansi, ma de' quali non eravi

esatta dimostrazione. Le osservazioni eseguite in quest'osservatorio durante un decennio, e con tutta accuratezza, se non possono uguagliare la certezza e l'ampiezza de' fatti, che per la meteorologia di altri paesi, ne quali da più lungo tempo furono stabiliti osservatorii è stato dato raggiungere, presentano nondimeno indizii sufficienti a farci concepire un'idea esatta di quanto concerne la meteorologia d'un punto, che per la sua situazione è interessantissimo e che dai più dotti è stato indicato come uno di quelli che può somministrare osservazioni più pregevoli ed atte a far progredire una scienza che puossi dire ancora sul nascere.

Situati noi nel punto più settentrionale del mediterraneo, e ove quasi si congiungono due grandi catene di montagne, era facile il sospettare che qualche particolare fenomeno dovesse presentare la nostra meteorologia. Dall'esatto ed accurato lavoro del professor Garibaldi si può riconoscere che questo sospetto aveva stabile fondamento; straordinaria infatti tra noi la quantità della pioggia, speciali le direzioni de' venti; e quanto alle temperature, certamente Genova è uno de' punti in cui a più settentrionale latitudine corrisponde più mite clima. Tutte queste cose nel dotto lavoro dell'egregio, che noi piangiamo, appaiono, siccome vi appariscono nuove osservazioni sull'abbassamento o rialzamento del livello delle acque del nostro mare a seconda dell'aumento o diminuzione delle pressioni barometriche.

Avrebbe bramato quell'esimio poter dare per complemento al suo lavoro sulla meteorologia un sunto delle sue osservazioni sulla declinazione e inclinazione dell'ago magnetico in un punto sì notevole della periferia del mediterraneo qual è Genova, ma la morte lo rapì mentre queste osservazioni stava portando al termine. Non mancò però un dotto sacerdote,

D. Fortunato Ciocca, che ne istituì altre le quali infine dell'articolo sulla meteorologia noi presentiamo in supplemento di quanto il professor Garibaldi stava preparando, e per far conoscere esattamente la quantità di deviazione dell'ago magnetico su queste nostre sponde, e in una città in cui tutto ciò che concerne gli studi nautici deve avere sulle altre scienze il primato, perchè questi soli possono fornire un tal quale compenso alle passate grandezze e ancor farci gloriosi percorrere quell'elemento di cui un Nostro misurò primo la più ampia estensione e aprì la strada a tutto percorrerlo per quanto esso cerchia la stabile terra.

Io ho ardito, o cortese lettore, anticipare il tuo giudizio e fare un elogio del lavoro che ti presento, il quale è opera di un egregio di cui la nostra città compiangere la perdita. Tu confermerai senza dubbio quanto ne ho accennato, perchè nel giudicare non fui guidato da spirito prevenuto e perchè mi stava davanti la massima che ai morti devesi tutta la verità. Avrei dovuto, lo so, astenermi dal pronunciare alcun giudizio, ma mi doleva di lasciar trascorrere l'occasione di tributare alla memoria di un amico e di un dotto cultore delle scienze, quell'omaggio che la città nostra e quelli tutti che conoscevano l'alto sapere di lui congiunto ad estrema modestia, si compiacevano di proferirgli durante la vita.

Vivi felice.

LORENZO N. PARETO

NOTIZIE METEOROLOGICHE

Il marchese Domenico Franzoni fu il primo in Genova che siasi occupato d'osservazioni meteorologiche eseguite con tutta quella attenzione e regolarità che richiedonsi in simili lavori, quando si vogliano render utili alla scienza.

Di queste egli componeva un suo diario in cui segnava due volte al giorno regolarmente, alla mattina ed alla sera, le altezze barometriche, le indicazioni del termometro e dell'igrometro, l'aspetto del cielo, la direzione e forza de' venti, la quantità della pioggia e dell'evaporazione, le nebbie, le nevi, gli uragani, le tempeste, notando le ore e tutte le circostanze di questi fenomeni, tanto ordinarii quanto straordinarii; il tutto osservato con quella precisione che si poteva attendere dagli strumenti in esse adoperati. Queste osservazioni formano un periodo di quattordici anni, che comincia dal dicembre del 1782 e finisce nel 1796.

Quantunque coteste osservazioni in complesso non siano mai state fatte di pubblica ragione, non è a dire però, che in seguito non fossero per la scienza utilmente impiegate: ripigliavansi infatti poco dopo questi lavori meteorologici da un altro genovese, il prof. ab. cav. Muledo, e dalla discussione e paragone delle proprie osserva-

zioni con quelle del Franzoni, ne uscivano due memorie di meteorologia che egli presentava, la prima nel 1802, la seconda tre anni dopo all'istituto ligure; notevole quest'ultima principalmente per una legge di relazione fra le indicazioni barometriche e lo stato di agitazione del nostro mare, eh'egli vi stabilisce come derivata dall'osservazione.

Nell'istesso tempo questo illustre professore, penetrato dall'utilità di cotali studi, volendo dare maggior vita ai medesimi, insisteva affinchè fosse creato un pubblico osservatorio, e tracciava la miglior via da tenersi nei lavori delle osservazioni. — Le sue parole, dettate dall'amore della scienza, trovarono posteriormente un favorevole accoglimento, e ciò avvenne nell'anno 1852, quando si decretò fosse eretto nella R. Università un osservatorio meteorologico, e si provide perchè fossero eseguite le osservazioni con tutta quella regolarità e precisione che il progresso della scienza e la maggior perfezione degli strumenti permettevano d'introdurvi.

Furono scelti a tal uopo una galleria ed un terrazzo esistenti nell'angolo N. O. del palazzo di questa Università, e quivi furono collocati i diversi strumenti necessari per le osservazioni. La posizione di questo osservatorio venne determinata nel modo seguente: latitudine $44^{\circ} 24' 59''$, longitudine $6^{\circ} 35' 24''$ E. dal meridiano di Parigi, altitudine $47^m,18$ dal pavimento della galleria al livello medio del mare.

La galleria è divisa in due compartimenti. Nel primo fu situato un barometro a pozzetto, a fondo mobile, di costruzione del Fortin di Parigi, con iscala fissa tracciata sopra un tubo d'ottone, divisa in centimetri e millimetri, la cui origine viene indicata da una punta fissa d'avorio, e munita di un nonio che dà direttamente i ventesimi di millimetro. Il diametro interno del tubo è di 9 millimetri, la larghezza della superficie annulare del mercurio nel pozzetto 16^{mm} , e la distanza della punta d'avorio alla superficie interna dello stesso pozzetto 4^{mm} . L'altezza del menisco, che limita superiormente la colonna barometrica, fu trovata eguale a $0^{mm},53$ prendendo la media di molte osservazioni, e l'altezza del menisco annulare del pozzetto $2^{mm},5$.

Attiguo alla canna del mercurio, fissato all'armatura che le serve di difesa, si trova un piccolo termometro centigrado che denota la temperatura del mercurio medesimo. L'origine della scala suddetta è

alta sul pavimento metri 0, 83, e quindi alta metri 48, 03, sul livello medio del mare. Questo barometro fu confrontato nel 1829 con quello dell'osservatorio di Parigi dal sig. Bouvard, e si ebbe da varii paragoni il seguente risultato medio corretto della capillarità.

Altezza barometrica di Parigi — altezza Fortin $+ 0^{\text{mm}},153$. Avvertiamo fin d'ora che tutte le altezze barometriche che riferiremo in seguito, osservate con questo strumento, son già ridotte a zero di temperatura instrumentale, ma non corrette delle capillarità.

Nel secondo compartimento della galleria furono situati, in faccia al N., all'aria aperta, difesi quanto è possibile dalle irradiazioni dei corpi circonvicini, ma in modo da lasciar liberissima la circolazione dell'aria: 1.° un termometro sensibilissimo del Fahrenheit per la lettura delle temperature dell'aria; 2.° un termometro ad indice, ossia termometrografo, del canonico Bellani per le massime e minime temperature delle 24 ore, da osservarsi ogni giorno alle 9 del mattino; 3.° un igrometro a cappello del Saussure per la misura della umidità dell'aria.

Le letture fatte sulle scale dei termometri sono tutte ridotte in gradi del termometro centesimale avanti di essere notate nel diario dell'osservatorio.

Sul terrazzo superiore alla galleria, ad un'altezza di metri 9, 68 presa dal pavimento della stessa e perciò di metri 56, 86 dal livello del mare, fu collocato un udometro consistente in un vaso di forma cilindrica del diametro interno di metri 0, 76, con fondo conico, situato col suo asse verticale. L'acqua raccolta dal medesimo passa per un tubo che traversa il tetto e si deposita in un recipiente chiuso, che è fissato inferiormente in uno stanzino attiguo alla galleria; estratta dal medesimo, vien misurata per mezzo di due vasi di forma cilindrica i quali hanno un'area di sezione che è per l'uno il decimo e per l'altro il centesimo dell'apertura dell'udometro stesso. Questi sono muniti di scale interne, divise in millimetri che corrispondono al decimo e centesimo di millimetro dell'udometro.

Finalmente fu stabilito su questo terrazzo un anemoscopio formato di non banderuola, il cui asse passa attraverso al tetto e termina in un pignone, che rotando mette in movimento un indice, il quale scorre sovrà un quadrante dove sono segnati gli otto venti principali.

Gli strumenti descritti son quelli con i quali furono eseguite le osservazioni notate nel diario dell'osservatorio. Ve ne sono poi altri

di simil genere disposti in diversi luoghi che servono di verifica-
zione e di confronto ai precedenti.

Stabilito così l'osservatorio, ne venne affidata la direzione al pro-
fessore di fisica della R. Università, e fu nominato un osservatore
il quale avesse cura di notare quattro volte al giorno, cioè alle 9
di mattina, a mezzodì, alle 3, alle 9 di sera, le indicazioni de' pre-
detti strumenti, nonchè lo stato del cielo e del mare, e tutti quei
fenomeni ordinari e straordinari che potessero meritare di tesserne
memoria in un diario meteorologico.

Egli è al primo gennaio del 1855 che poté quivi cominciarsi la
nuova serie di osservazioni meteorologiche, che da indi in poi non
furono più interrotte, grazie allo zelo indefesso del chiarissimo no-
stro professore d'idraulica sig. Giacinto Grillo, il quale con somma
intelligenza le condusse fino a questo giorno.

Dal primo decennio di queste osservazioni noi abbiamo dedotte
quelle poche cose che ci venne fatto di raccogliere sulla nostra lo-
cale meteorologia.

TEMPERATURA.

Per dare un'idea del clima di Genova e del posto che gli com-
pete fra i varii climi della nostra penisola presentiamo in diversi
quadri il sunto delle osservazioni termometriche del decennio, or-
dinate nel modo da noi stimato più acconcio a far conoscere la
media temperatura del luogo, le principali modificazioni di essa ca-
gionate dalle varie posizioni del sole nell'eclittica e rispetto al me-
ridiano, ed ancora le massime e le minime temperature dei mesi,
delle stagioni e degli anni.

Il primo quadro presenta i medii annuali delle temperature ora-
rie, delle massime e minime temperature diurne, e le semisomme
di questi ultimi medii, le quali, come è ben noto, corrispondono
assai prossimamente ai medii annui delle medie temperature gior-
naliere.

Il secondo contiene le medie decennali delle temperature orarie,
nonchè delle massime, minime e medie temperature corrispondenti
ai diversi mesi e stagioni; considerando le stagioni non astronomi-
camente, ma giusta la consuetudine de' meteorologisti, cioè pren-
dendo per l'inverno i mesi di dicembre, gennaio e febbraio; per
l'estate i mesi di giugno, luglio ed agosto; e gli altri mesi per le
stagioni intermedie.

Nel terzo son riferiti i medii decennali delle estreme temperature osservate nei periodi dei mesi e delle stagioni, ed i medii consimili delle massime oscillazioni termometriche avute ne' suddetti periodi e nei periodi diurni.

Finalmente nell'ultimo si sono riferite le massime e minime temperature assolute d'ogni anno coll'indicazione delle epoche ad esse corrispondenti.

Dalla discussione delle cifre di questi quadri deducansi diverse generalità, riguardo all'andamento delle temperature in Genova, che passiamo ora ad esporre.

In primo luogo vediamo che la media delle temperature, osservate alle 9 del mattino, è presso a poco eguale alla media temperatura dell'anno, la quale, calcolata sull'insieme di tutte le osservazioni, ascende a 15.^o 58. ¹ Questa è ben poco diversa dalla media temperatura di Nizza, Firenze e Roma, ed è notabilmente maggiore di quella che si dovrebbe aspettare, avendo soltanto riguardo alla latitudine di Genova, e non considerando tutte quelle circostanze particolari del suolo, che influiscono nella distribuzione delle temperature alla superficie del globo, tra le quali sono primarie la vicinanza del mare ed il riparo de' monti ².

Le medie temperature annuali variano assai da un anno all'altro; la maggiore di quelle del decennio fu di 16.^o 83 nell'anno 1834, e la minima di 14.^o 62 nel 1838; alle quali corrisponde una oscillazione di 2.^o 21. La grandezza di questa oscillazione ci avverte, che per avere la *media temperatura assoluta del luogo* indipendente dalle cause accidentali che possono modificarla, si richiederebbero osservazioni prolungate ad un maggior numero d'anni.

La media temperatura annuale sarebbe insufficiente a caratterizzare il clima di Genova, quando non si avesse riguardo alle variazioni cui son soggette le temperature dei giorni, de' mesi e delle stagioni.

L'andamento medio della temperatura durante il periodo diurno si rileva prossimamente dal modo in cui si succedono i valori orari della medesima. In generale il termometro alle 9 del mattino

¹ Vedasi il prospetto n.^o I.

² Che il riparo de' monti influisca moltissimo sulla media temperatura, ne fanno fede diverse località delle nostre riviere, le quali, perché difese in questo modo più immediatamente dai venti settentrionali, godono d'un clima anche più mite del nostro; tali sono Portofino, Camogli, Nervi, Prègli, S. Remo e Bordighiera.

segna una temperatura pressochè eguale alla *media diurna*, di poi con progressione alquanto diversa nei varii mesi e stagioni, sale gradatamente sino ad un *massimo*, che raggiunge intorno le 3 pomeridiane nella primavera e nell'autunno, verso le 2 nell'inverno, e presso le 4 in estate: quindi esso discende verso un secondo *medio* che raggiunge prima delle 9 di sera, e così continua fino ad un *minimo* che tocca alla mattina prima del levare del sole.

L'oscillazione media, compresa fra le 9 di mattina e le 3 pomeridiane, non arriva a 2 gradi, mentre la media oscillazione, compresa fra il massimo e minimo giornale, oltrepassa i 5 gradi.

L'andamento medio delle temperature nel corso dell'anno si rileva similmente dal modo in cui si succedono le cifre dei medii mensuali e dei medii delle stagioni ¹.

Si vede che la media temperatura, ridotta al suo minimo grado in gennaio, ascende, durante sette mesi, verso un valore massimo che raggiunge in sul finire di luglio, ed oltrepassato questo, essa, durante gli altri cinque mesi, discende per ricondursi al minimo. Avendo le epoche delle estreme temperature d'ogni anno si poterono calcolare le epoche medie della minima e della massima temperatura annuale, e si è trovato che la prima corrisponde ai 13 di gennaio e la seconda ai 27 di luglio. Variando fra questi estremi la temperatura passa due volte pel suo valor medio, e ciò avviene il 14 aprile ed il 21 di ottobre. Queste epoche medie determinano i limiti veri delle diverse stagioni in Genova.

La differenza fra la minima e la massima delle medie mensuali è di 17 gradi, i quali sono inegualmente distribuiti nei diversi mesi: infatti paragonando le differenze successive delle temperature dei singoli mesi si trova che dopo il minimo di gennaio le stesse temperature ascendono lentamente nei primi quattro mesi, lascia assai più rapidamente nel quinto e sesto, e di nuovo lentamente nel mese adiacente all'epoca del massimo; oltrepassato questo, le temperature mensuali discendono verso il minimo; lentamente assai sul principio, ma ben tosto con corsa molto veloce, che diviene velocissima in novembre.

Paragonando le medie delle stagioni colla media annuale, si rileva che quest'ultima supera di 1°, 7 la media di primavera, ed è su-

¹ Vedasi il prospetto n.° 2.

perata di 1° dalla media autunnale; che inoltre la temperatura dell'inverno discende di 7°, 2 al disotto della media annuale, mentre quella d'estate ascende a 7°, 9 al disopra.

Il clima di Genova è rinomato per l'incostanza delle temperature: infatti la colonna termometrica vi è soggetta a frequenti oscillazioni, talvolta assai estese anche nel breve periodo d'una giornata. Il medio valore delle massime digressioni giornali del termometro ascende a 8°, 5 nei periodi mensuali, ed a 9, 5 nei periodi delle stagioni: le maggiori di queste digressioni si trovano nella primavera e nell'estate, le minori nell'inverno e nell'autunno ¹.

Dal confronto della media annuale con i medii delle massime e minime temperature dei mesi e delle stagioni, si desume che il termometro, nelle sue maggiori elevazioni, rimane in gennaio un grado circa al disotto della suddetta media annuale, che tocca la stessa media in febbraio, e che la sorpassa in tutti gli altri mesi sino a discostarsene di 15 gradi, il che succede nei mesi di luglio e di agosto, ne quali la massima temperatura supera di poco i 50° ¹/₂. Invece nelle sue maggiori depressioni è nei soli mesi di luglio e d'agosto che si sostiene di 2 circa gradi al disopra della media annuale, mentre in tutti gli altri scende al disotto della medesima, e se ne allontana sino a 16 gradi, il che avviene nel mese di gennaio in cui la minima temperatura è 0°, 4.

Ricercando le massime oscillazioni mensuali del termometro le troviamo tutte comprese fra 12°, ³/₄ e 16°, ³/₄. Maggiori di queste e più divergenti tra loro sono le massime oscillazioni delle stagioni: quelle della primavera e dell'autunno si estendono a 24°, la invernale è limitata a 18°, e l'estiva, che è la minore di tutte, arriva a soli 17°; la media di tutte queste rinviene 20°, 8.

Da quel che abbiamo detto disopra intorno alle massime oscillazioni diurne possiamo conchiudere che nella primavera queste concorrono colle massime oscillazioni delle stagioni, mentre nell'estate le massime oscillazioni giornali s'incontrano colle minime delle stagioni.

Rispetto in ultimo alle estreme temperature annuali, troviamo che in questi dieci anni la massima oscillò fra 50°, 5 e 52°, 5, e la minima fra 1° sopra lo zero e 5°, 1 al disotto; onde l'oscillazione del massimo freddo fu doppia di quella del massimo caldo ². I medii va-

¹ Vedasi il prospetto n.° 3.

² Vedasi il prospetto n.° 4.

* r. i.

lori di queste massime o minime assolute li troviamo eguali a $31^{\circ},67$ sopra, ed $1^{\circ},25$ sotto lo zero, dimodochè il movimento della colonna termometrica, dal massimo caldo estivo al massimo freddo invernale, può dirsi in Genova di 33 gradi. Questa massima digressione, che risulta dal concorso simultaneo delle cause che producono le variazioni annue e diurne del termometro, ha un valore quadruplo quasi di quella sopra notata, compresa nei soli periodi diurni.

La massima di tutte le temperature osservate nel deceunio, ascese a $32^{\circ},5$ il 13 agosto del 1842, e la minima fra le medesime discese $3^{\circ},1$ sotto lo zero il 2 gennaio 1836; quindi la massima digressione assoluta in questo periodo fu di $35^{\circ},6$.

Il massimo caldo estivo fu sempre in luglio od agosto, tranne una volta in giugno. Il massimo freddo invernale fu generalmente in gennaio; due volte soltanto sui primi di febbraio, ed una sola in dicembre. Le epoche medie del massimo caldo e del massimo freddo, dedotte da quelle osservate nei singoli anni, corrispondono, come già dicemmo, al 26, 6 di luglio, ed al 12, 5 di gennaio.

In due soli anni la minima temperatura annuale si sostenne al disopra dello zero, negli altri scese al disotto, meno una volta che si fermò a zero. Durante il deceunio si ebbero in tutto 84 giorni di gelo, cioè una media di giorni 8 per ogni anno, de' quali la metà cadde in gennaio ¹.

PRESSIONI BAROMETRICHE.

Per far conoscere le condizioni più generali della pressione atmosferica in Genova, e le principali modificazioni ch'essa subisce nei

¹ Il Giustiniani nel quinto libro de' suoi annali fa menzione di un freddo quasi incredibile per queste parti, che oppresse Genova nell'anno 1493, e tale che coagelossi il mare attorno ai poati ed agli scali del porto, di maniera che i baccaroli non potevano allargar le loro barchette dalla terra, nè navigare. Il Casani ricorda un freddo pure assai rigido avvenuto in febbraio del 1621, per cui essendo nei giorni 8 e 9 piovuto, rimasero le strade coperte di una lastra di ghiaccio che fu duopo rompere a forza di piccoai: videsi in allora pure agghiacciato il mare in alcune parti della Darsena (Cas. Ann. lib. 2). I freddi memorabili che si fecero sentire in Genova nel nostro secolo furono nel 1814 il 22 febbraio, nel 1816 il 31 gennaio, e nel 1830 il 2 febbraio: in questi il gelo fu assai intenso per tutta la città ed anche in alcuni luoghi interni del porto.

periodi dei giorni, dei mesi, delle stagioni e degli anni, presentiamo in compendio i medii delle altezze barometriche, osservate nel decennio, ordinati in diversi quadri somiglienti a quelli già descritti trattando delle temperature.

È noto che nei nostri climi le pressioni barometriche, come nelle regioni equatoriali, sono soggette ad una doppia oscillazione periodica, diurna, che si manifesta nelle osservazioni; quando essendo fatte in ore opportunamente scelte, sono anche in quel numero che si richiede perchè vengano compensati nei loro medii gli effetti delle cause perturbatrici accidentali. Quale sia l'andamento di questa oscillazione in Genova lo mostrano le cifre de' nostri quadri.

Si scorge primieramente che la pressione atmosferica in tutti i mesi dell'anno, verso le 9 del mattino, acquista un massimo valore, dal quale discende poi, gradatamente dirigendosi ad un minimo che più generalmente tocca intorno le 3 di sera, e fra le 3 e 6 nei mesi caldi d'estate: oltrepassato questo minimo, essa rimonta verso un secondo massimo, alquanto minore del primo, che raggiunge intorno alle 9 di sera nei mesi d'inverno, e posteriormente negli altri.

Il medio valore della oscillazione o *periodo discendente*, compreso fra le 9 di mattina e le 3 di sera, è uguale a 0^{mm},692, e quello del *periodo ascendente*, compreso fra le 3 e le 9 di sera, è uguale a 0^{mm},449: quest'ultimo corrisponde ai due terzi circa del primo ¹.

Prendendo i medii diurni di altre osservazioni barometriche eseguite pure in Genova nella R. Scuola di Marina, ma ripetute di ora in ora durante le 24 ore del giorno, abbiamo riconosciuto un sufficiente accordo fra questi medii ed i valori che s'ottengono facendo la semisomma delle altezze massima e minima osservate alle ore 9 di mattino e 3 di sera. A seconda di cotesta relazione si son dedotte da quelle estreme orarie le medie giornali, e da queste le medie mensuali ed annuali, nonechè la media assoluta di tutte le pressioni barometriche osservate nel decennio.

Questa media pressione assoluta, ossia decennale, si è trovata di 736^{mm},619: notabili sono le differenze che s'incontrano nelle medie dei singoli anni; la massima fra queste ascese nel 1854 (che fu pur l'anno della massima temperatura) a 759, 159, e la mini-

¹ Vedasi il prospetto n.° 3.

ma rimase a 755, 079 nel 1858, anno in cui si ebbe la temperatura minima; quindi le massime lor digressioni, rispetto alla media assoluta, furono di 2^{mm},52 al disopra, e di 1^{mm},54 al disotto.

L'ampiezza di queste digressioni, che superano unite 4^{mm}, lascia sul vero valore della media pressione assoluta una leggera incertezza, la quale cesserà quando possa dedursi da un maggior numero di osservazioni.

La media pressione assoluta, eguale a 756^{mm},619, si riferisce alla temperatura 0 del mercurio barometrico, alla temperatura media dell'aria di 15, 6, ed all'altezza di metri 48 sul livello medio del mare. Riducendo la stessa a quest'ultimo livello l'abbiamo trovata eguale a 761^{mm},268 conservate le sopradette condizioni relative alle temperature, corrette le capillarità, e fatta la riduzione al barometro normale dell'osservatorio di Parigi.

Considerando l'andamento delle pressioni nei loro medii mensuali, si scorge ch'esse nei mesi di dicembre e gennaio ascendono ad un valor massimo che sorpassa il medio annuale di 1^{mm},9, che in aprile discendono ad un minimo inferiore al suddetto medio di 2^{mm},6, e che nei mesi di luglio ed agosto si tengono assai prossime a questo stesso valor medio che, come già dicemmo, è uguale a 756, 6; vediamo anche che l'intera oscillazione, compresa fra queste estreme pressioni, è circa 4^{mm},5¹.

Considerate nelle diverse stagioni le medie pressioni, si trovano al massimo nell'inverno, al minimo nella primavera; mentre assumono nell'estate e nell'autunno un medio valore assai prossimo alla media assoluta dell'anno.

Dall'esame dei medii valori delle massime e minime pressioni corrispondenti ai mesi e stagioni, e dall'andamento delle differenze tra questi e la media annuale, rileviamo che la colonna barometrica nelle sue maggiori elevazioni si discosta dalla media annuale assai meno che nelle maggiori sue depressioni; infatti mentre la media escursione superiore si limita ad 8^{mm},4, la media inferiore arriva ad 11^{mm},4.² Vediamo altresì che ai mesi di gennaio e febbrajo, di minima temperatura, corrispondono ad un tempo le più alte pressioni e le più grandi oscillazioni barometriche; laddove a luglio ed

¹ Vedasi il prospetto n.° 6.

² Vedasi il prospetto n.° 7.

agosto, mesi di massima temperatura, vi corrispondono bensì le minime oscillazioni, ma non le minime pressioni che troviamo invece nei mesi di novembre, gennaio e febbraio. La massima di queste oscillazioni mensuali ascende a $27^{\text{mm}},58$, e la minima rimane ad $11^{\text{mm}},47$.

Riguardo alle stagioni è nell'inverno che troviamo riunite le più alte e le più basse pressioni, accompagnate dalla più estesa oscillazione che monta quasi a 54^{mm} ; minima è l'oscillazione estiva ed eguale alla metà circa della invernale, cioè a 17^{mm} quella di primavera è la media aritmetica delle precedenti, cioè $23^{\text{mm}} \frac{1}{2}$ circa, e quella d'autunno supera quest'ultima di quasi tre millimetri.

Nel quadro n.° 8 abbiamo raccolte le massime e minime pressioni annuali, e le epoche corrispondenti alle medesime. La media delle massime supera di poco 775^{mm} , e corrisponde all'epoca media dei 27 gennaio, e la media fra le minime è prossima a 736^{mm} , e corrisponde all'epoca dei 9 dicembre, cosicchè l'oscillazione media annuale del barometro si estende a 37^{mm} , ed è compresa nel breve intervallo di 49 giorni.

La massima assoluta di tutte le pressioni osservate nel decennio fu di $775^{\text{mm}},66$ il 27 febbraio 1834 alle 9 di mattina, con calma perfetta di vento e di mare e con cielo sereno: la minima assoluta fu di $727^{\text{mm}},28$ il 26 febbraio 1838 alle 8 antimeridiane, essendo il cielo piovigginoso, con venticello E., e con mare straordinariamente grosso. L'intervallo, compreso fra queste estreme pressioni decennali, ascende a $48^{\text{mm}},38$, cioè alla sedicesima parte circa della media pressione annuale. Gli anni in cui furono osservate queste estreme pressioni sono gli stessi nei quali trovammo la massima e la minima delle medie pressioni annuali e delle medie temperature. Nell'anno 1803 e nei giorni 21 e 22 gennaio si ebbe in Genova una pressione del barometro anche maggiore di quella sopra notata, essendo lo stesso disceso a 724^{mm} ; questa pure fu accompagnata da una furiosissima tempesta di mare.

UMIDITA' DELL'ARIA.

Per indicare almeno approssimativamente lo stato d'umidità dell'aria in Genova e le sue principali modificazioni nelle ore differenti del giorno, nei diversi mesi e nelle varie stagioni, daremo il sunto

delle osservazioni igrometriche, fatte mediante un igrometro a cappello del Saussure. È bensì vero che le indicazioni di questo strumento lasciano molta incertezza nella misura assoluta dell'umidità atmosferica a cagione della difficoltà di renderlo comparabile con sè stesso, e di conservarlo tale per lungo tempo: ma quando si voglia prescindere dai valori assoluti, e limitarsi soltanto a considerarne i relativi, le sue indicazioni riescono più soddisfacenti, e s'accordano abbastanza con quelle d'altri strumenti igrometrici reputati più esatti.

Considerando nel quadro n.° 9 l'andamento dell'igrometro nelle varie ore del giorno in cui venne osservato, si scorge che l'umidità dell'aria varia in ordine inverso delle temperature; cosa che ben naturale si manifesta per la proprietà che ha l'aria vaporosa di allontanarsi tanto più dal punto di saturazione, quanto più ne cresce la temperatura. Quindi possiamo ritenere che l'umidità dell'aria è da noi al massimo grado prima del levar del sole, e che discende al minimo grado intorno alle 3 pomeridiane.

L'andamento dell'umidità atmosferica nelle diverse stagioni procede invece secondo l'ordine delle temperature; infatti se paragoniamo le medie igrometriche lor relative, per conoscere qual sia la maggior o minore distanza dell'aria dal punto di saturazione, troviamo che questa distanza è massima nell'inverno, minima nell'estate, e che quella di primavera è alquanto maggiore dell'altra di autunno.

Assai ampie sono le oscillazioni mensuali dell'igrometro: il valore medio di queste è di 40 gradi, quelle delle stagioni sono ancora più estese; le massime trovansi nell'inverno, le minime nell'estate, ed in primavera superano d'assai quelle d'autunno.

Raccogliendo separatamente le indicazioni igrometriche che corrispondono ai diversi venti e paragonandone i medii valori si trova che da noi portano maggior umidità nell'aria i venti che spirano nelle direzioni comprese fra il S. e l'E.; fatto che si appalesa, indipendentemente dall'igrometro, per quell'abbondante umidità che allora si depone sui lastricati della nostra città. Abbiamo invece nell'aria la maggior siccità quando spirano i venti del N., e segnatamente quelli del N. O. i quali per lo più determinano le massime depressioni igrometriche.

Accade non di rado di vedere nell'igrometro una variazione di 50 ed anche 40 gradi nel breve spazio di poche ore; ciò avviene se-

guatamente allorchando al vento umido di S. E. subentra improvvisamente un vento N. o N. O., oppure se succede il contrario.

Per lo più a queste variazioni igrometriche ne corrispondono altre simili nelle temperature perchè i venti N. e N. O. sono da noi generalmente assai più freddi di quelli che vengono nella direzione S. E.

PIOGGIA.

Fra le particolarità meteorologiche le quali maggiormente distinguono Genova dalle altre località della nostra penisola, dobbiamo porre in primo grado la grande dovizia delle sue piogge e la somma variabilità colla quale esse trovansi ripartite nei singoli anni.

Il quadro n.° 10 presenta il prospetto dell'acqua o neve raccolta nell'udrometro durante il decennio: la media generale di questa vi ascende a 1346^{mm}, quantità che supera d'assai quella che cade in altri luoghi d'Italia compresi nella nostra zona apennina, od adiacenti alla stessa; infatti l'annua pioggia in Milano la troviamo di soli 964^{mm}, in Livorno di 959^{mm}, ed in Napoli di 947^{mm}. Comparabili alla pioggia di Genova troviamo solamente quelle di Pisa e Lucca, che sono: la prima di 1218^{mm}, e la seconda di 1272^{mm}.

Paragonando questa media generale colle piogge parziali dei singoli anni si trovano delle differenze assai grandi in più ed in meno che dinotano esserne assai variabile l'annua misura. La minima quantità di pioggia si ebbe nell'anno 1840 eguale a 1151^{mm}, e la massima nel 1842 che fu di 1644^{mm}. Queste piogge estreme presentano la differenza enorme di 513^{mm}, che equivale ai due quinti circa della media generale; cotali anomalie trovate nelle piogge annuali dipendono principalmente dall'ineguale distribuzione de' venti piovosi negli anni diversi. Le nostre piogge vengono per lo più cagionate dallo scontro dei venti di N. E. e di S. E. che spirano in due regioni diversamente elevate dell'atmosfera, come sovente ne fan fede l'anemoscopio terrestre volto in una di quelle direzioni, e le nuvole superiori che muovonsi nel senso dell'altra. Le correnti d'aria messe in moto nello spirare di questi venti, impedito dai monti che ne circondano, si confondono insieme e premousi a vicenda determinando una precipitazione di vapore che cresce in ragione della minore temperatura della corrente settentrionale, e della maggiore umidità che d'ordinario sovrabbonda nell'altra meridionale.

Succede talvolta nell'inverno un'irregolare distribuzione delle nevi, per cui il nostro Appennino ne rimane sprovvisto, mentre i monti meridionali della Corsica e della Sardegna ne sono coperti; predominano allora i venti umidi della parte meridionale che rendono maggiormente abbondanti le nostre piogge.

Se la distribuzione della pioggia fosse uniforme, nei vari mesi dell'anno, la media d'ogni mese sarebbe di 112^{mm} . Si trova invece che nei mesi in cui più sovrabbonda, cioè in settembre e novembre, ne cadono 175^{mm} , e soltanto 50^{mm} nei mesi ne quali più scarseggia, cioè in quelli di giugno e luglio; nei soli mesi di aprile, maggio ed agosto se ne trova una quantità prossimamente uguale alla suddetta media. Similmente paragonando le piogge delle varie stagioni troviamo che ne cade in autunno la massima quantità, la quale è più che doppia della minima che si ha in estate; e che nell'inverno e nella primavera si hanno quantità pressochè uguali tra loro, corrispondenti prossimamente ai due terzi della pioggia autunnale.

Nel quadro n.º 11 abbiamo riprodotti i valori delle medie piogge dei mesi, accompagnati dai numeri dei giorni piovosi e dai rapporti calcolati di queste due quantità. Vi abbiamo anche aggiunto i numeri esprimenti i giorni di neve, di grandine e di gelo.

Da questo prospetto si rileva che in Genova i giorni ne quali si raccoglie acqua, in quantità più o meno grande, sommano a 131, cioè ad oltre il terzo dei giorni dell'anno. Se ne fosse uniforme la distribuzione nei periodi mensuali sarebbero 11 in ogni mese questi giorni piovosi; troviamo invece che il loro numero varia precisamente da 7 a 14. Inoltre la naturale ripartizione di essi non è in ragione delle quantità delle piogge mensuali; cosicchè i mesi nei quali primeggiano i giorni piovosi non son quelli delle maggiori piogge, ed i mesi in cui scarseggiano le piogge non sono i più poveri di giorni piovosi.

Le piogge diurne mensuali si trovano dividendo le piogge d'ogni mese per i suoi giorni piovosi. Queste ancora risultano assai variabili: le maggiori, comprese fra 13 e 14^{mm} , sono in febbraio, agosto, settembre ed ottobre; la minima è quella di luglio, uguale a 6^{mm} , $\frac{1}{3}$. Finalmente il medio valore di tutte trovasi corrispondente a 10^{mm} , $\frac{1}{4}$ circa.

Durante i 10 anni, in 63 giorni soltanto fu veduta la neve in

città; quindi 6 sono i giorni di neve per ogni anno, ne' quali più frequentemente essa si scioglie senza accumularsi. Nello stesso periodo si ebbero 63 giorni di grandine, cioè 6 giorni ugualmente per ogni anno.

Ai quadri già presentati, aggiungesi ancora quella delle piogge dirette che s'ebbero durante il decennio: da questo si rileva che tali piogge furono quasi sempre accompagnate dai venti N. E. e S. E. La più abbondante di tutte fu il 25 agosto dell'anno 1842: in meno di 10 ore caddero 247^{mm} d'acqua; quantità assai superiore alla media di novembre che è soltanto di 173^{mm}; in soli 69 minuti se ne raccolsero 111^{mm}, il che corrisponde ad 1^{mm},6 per ogni minuto.

Nel forte del rovescio del 16 settembre 1838, che durò meno del precedente, si ebbe 1^m,5 d'acqua per minuto. Questi però sono assai inferiori al rovescio senza esempio, che ebbe luogo il 25 ottobre 1822, nel quale cadde sul suolo di Genova l'enorme quantità di 82 centimetri d'acqua che cagionò danni gravissimi ¹.

VENTI.

L'atmosfera che preme il suolo di Genova è di rado tranquilla; non però fortissimi sono i venti che in essa spirano, anzi sono generalmente moderati, ma soggetti a frequenti variazioni nella loro direzione e forza. Le molteplici ineguaglianze di temperatura, cagionate in una massa d'aria che da un lato insistendo sul mare, s'appoggia dall'altro sopra aspri monti intersecati da molte valli, sono la causa di questa copiosa ventilazione.

Per determinare la direzione de' venti ci siamo limitati a riferirci alle otto principali divisioni dell'orizzonte, ed abbiamo distinti in essi 4 gradi di forza qualificati colle solite denominazioni di fortissimo, forte, vento, venticello.

¹ Le nostre storie fanno menzione di alcuni rovesci di pioggia che cagionarono danni gravissimi alla nostra città; il più memorabile è quello del 1278 riferito dal Giustiniani. Il giorno 8 ottobre di quell'anno vi fu tal diluvio d'acqua che questa si alzò a 10 palmi sulla piazza di Banchi. Le piogge del 1407 31 ottobre e 1414 3 ottobre furono anche assai terribili: in quella del 1407 le acque scorrevano alte 6 piedi in varie strade della città e rovinarono parecchie case e muri (V. Giust. Ann. lib. 5.^a e 5.^a).

L'Arcandri fa pur memoria d'una pioggia che cadde continuamente per più di due mesi l'anno 1703.

La frequenza relativa dei venti, che spirano durante l'anno in ognuna delle sovraccennate direzioni, è assai variabile nei diversi mesi e nelle varie stagioni; ciò si vede assai chiaramente nel quadro n.º 13, il quale mostra, fra mille venti osservati in quei periodi di tempo, quanti ve ne furono in ciascuna delle stesse direzioni.

Da questo si rileva che i dominanti sono il N. ed il N. E. dalla parte boreale; il S. E., il S. ed il S. O. dalla parte australe.

Considerando l'andamento medio del vento N., che è il più dominante di tutti nella media generale, troviamo che la frequenza di questo, resa al massimo in dicembre, durasse gradatamente durante sei mesi, cioè sino a giugno, per crescere di bel nuovo durante i mesi rimanenti dell'anno. La cifra che esprime la massima frequenza di dicembre, corrisponde alla metà circa dei venti osservati, mentre quella della frequenza minima di giugno, non è che il decimo. I venti N. E., quantunque meno predominanti, seguono un andamento presso a poco analogo; ma per questi è novembre il mese di massima frequenza. I venti di S. E. e di S. O., che dopo il N. sono i più predominanti nella media generale, seguono un andamento inverso di quello che notammo nei venti settentrionali e meno regolare: la loro minima frequenza corrisponde a dicembre, e la massima è a giugno pel S. O.; ma pel S. E. è essa trasferita in settembre; dimodochè i mesi di massima frequenza per i venti di N. E. e S. E. son quelli stessi ai quali corrispondono le massime quantità di pioggia.

Considerandoli in ordine alle stagioni, si vede che nell'inverno, nella primavera e nell'autunno il vento N. vince tutti gli altri in frequenza, e che nell'estate il S. O. è quello che predomina.

I venti di O. e N. O. spirano di rado in Genova e non si trovano in una giusta proporzione rispetto agli altri che discostandosi per un certo tratto sul mare. Dando uno sguardo alla topografia de' nostri dintorni si conosce che questa rimarchevole mancanza è cagionata dal riparo che ci presenta la catena dei monti che sovrastano a Voltri, i quali, partendo dal mare a ponente di Genova, si estendono in una linea spezzata che corre per breve tratto un poco a greco, ripiegandosi a settentrione sino quasi all'origine della Polcevera. La valle di questo torrente è aperta interamente nella direzione settentrionale, e questa è la principal causa che rende predominanti i venti N.; non solamente per il libero ingresso lasciato per essa ai medesimi veggenti da lontano, ma ancora per le altre correnti che si formano entro le sue prolungate concavità.

Nell'inverno la temperatura del suolo lombardo, situato al di là dall'Apennino, si mantiene inferiore a quella del nostro mare, mentre nell'estate avviene il contrario. Il disequilibrio termometrico, che per siffatta cagione si avvicenda nell'aria di queste regioni vicine, determina quel predominio alternato dei venti boreali ed australi, che notammo di sopra nelle due diverse stagioni. Egli è nell'inverno che l'aria fredda della regione lombarda, versandosi dall'Apennino sul mare, ci arreca in copia i venti del N., mentre d'estate è l'aria più fredda del nostro mare, che sormontando l'Apennino e dirigendosi sul suolo lombardo, rende frequenti da noi i venti meridionali.

Nei tempi belli d'estate abbiamo dei venti regolari che compiono durante il periodo diurno il giro dell'orizzonte. Alla mattina al levar del sole sorge un venticello d'Oriente che girando si volge prima al mezzodì e poi all'ocaso, che raggiunge verso le 3 o 4 ore pomeridiane: continuando poscia questo suo giro, s'incammina verso il N. che raggiunge intorno alle 9 di sera, ove si ferma durante la notte. Questa continua ventilazione dell'atmosfera tempera assai opportunamente il calore estivo.

Per dare un'idea almeno approssimata della velocità de' venti che spirano, aggiungiamo un quadro n.º 14 simile al precedente, che fa vedere sopra mille venti, dei quali si è in ogni mese notata la forza, quanti ne corrispondessero ai 4 summentovati gradi, coi quali vennero al principio distinti, e quanti fossero i giorni di calma. Da questo si dimostra che ben pochi sono i venti fortissimi e forti, i quali spirano per lo più nell'inverno, mentre in tutto l'anno sono dominanti i venti di mediocre intensità.

I giorni di calma o quasi calma possono essere calcolati a cento circa nell'anno.

STATO DEL CIELO.

Tra i varii aspetti osservabili nel nostro cielo dipendenti dalle diverse condizioni del vapore acqueo sparso nell'atmosfera, non sempre invisibile, ma sovente condensato in strati o masse nuvolose, varie di forma e d'intensità, che più o meno ne turbano la trasparenza, ne abbiamo distinti tre soli principali, cioè il *sereno*, il *mezzo coperto* ed il *nuvoloso*. Diciamo sereno, un cielo tutto senza nuvole, o segnato soltanto da qualche leggera striscia di nube o di vapore: mezzo coperto, un cielo parte sereno e parte nuvoloso, o sparso a

tratti di nubi e di sereno: finalmente nuvoloso, quello interamente coperto o quasi coperto. Per la retta intelligenza del prospetto n.º 15, nella parte che concerne lo stato del cielo, dobbiamo premettere che questo, notato 14608 volte durante il decennio, lo fu quale appariva nelle ore delle quattro osservazioni diurne; cosicchè le cifre riferite nel prospetto esprimono soltanto quante volte si presentasse il cielo in ciascheduno dei tre aspetti summentovati in quelle medesime ore, e non quanti giorni così fatti s'avessero.

Da questo prospetto si rileva che la nostra atmosfera è ben sovente serena e limpida, per cui non di rado godiamo lo spettacolo d'un bellissimo cielo, a ragion meritevole delle lodi che gli stranieri tributano al cielo d'Italia. La maggiore frequenza di questo bel cielo è nell'estate e nell'inverno, e lo dobbiamo per lo più allo spirare dei venticelli settentrionali.

La magg'or frequenza del sereno parziale o mezzo coperto è ancora nell'estate non che in primavera, mentre la massima frequenza del nuvoloso completo cade nell'inverno e nell'autunno.

Se supponiamo che quattro osservazioni relative al medesimo stato di cielo rappresentino un giorno permanente in esso stato, troviamo che fra i giorni dell'anno, 118 sarebbero i sereni, 160 i mezzo coperti, ed 87 i nuvolosi: ed i giorni interamente sereni sarebbero 31 nell'inverno, 25 in primavera, 35 nell'estate, e 28 nell'autunno. Notiamo che ne' mezzo coperti e nuvolosi sono compresi i giorni di pioggia che, come dicemmo, sommano nell'anno a 131.

Rispetto ai giorni nebbiosi, pur segnati nel medesimo prospetto, dobbiamo premettere che in effetto rare sono da noi quelle nebbie generali che si osservano frequentemente in altri luoghi, per esempio a Milano nei mesi di novembre e dicembre: onde quelle riferite nel nostro prospetto sono in parte nebbie locali, circoscritte in poca estensione, formate nelle valli de' nostri monti, od intorno alle sommità de' medesimi, che vengono dissipate facilmente dalla ventilazione abbondante che regna nella nostra atmosfera. Altre ci vengono dal mare, e sono le più frequenti ed incommode; consistono in una nebbia leggiera, che accompagna talvolta il vento umido di S. E., la quale in certi tempi agisce assai svantaggiosamente sulla vegetazione, e più di tutto sulle vigne che danneggia moltissimo quando le coglie sul loro fiorire. Il numero medio de' giorni dell'anno in cui si ebbero nebbie, sommano a 42, cioè 14 in inverno, 11 in primavera, 6 in estate, ed 11 in autunno.

STATO DEL MARE.

Nel prospetto surriferito è pur notato lo stato del mare, quale osservossi ogni giorno all'istante del mezzodì pel corso di sette anni. Da queste osservazioni si desume che nell'anno il medio numero de' giorni di mare calmo riviene a 212; che 82 son quelli di mare agitato, e 71 quelli di grosso mare. Si vede ancora che il maggior numero di giorni di grosso mare cade in autunno, ed il minor numero in primavera. Le grandi agitazioni del nostro mare sono prodotti dai venti di S. E., S. e S. O.; non già quand'essi dipendono da un disequilibrio leggiero della nostra atmosfera locale, ma bensì quando spirano con certa forza, percorrendo un largo tratto dal mare. Questa speciale azione dei venti suddetti deriva dalla posizione geografica del mare ligustico che, circondato ovunque dalla terra, s'apre soltanto in quelle direzioni alle onde mosse dai venti. Al S. O., ossia libeccio, devono segnatamente i grandi sconvolgimenti che produssero in certe occasioni danni gravissimi al nostro porto.

Le maree lunisolari che s'osservano nei grandi mari, ed anche in alcune località del nostro Mediterraneo, non sono sensibili presso il litorale ligustico. Non è a dire però che il livello del nostro mare si mantenga ad una altezza costante; anzi da una serie d'osservazioni fatte durante 18 mesi, negli anni 1834 e 1835, risulta che l'altezza di questo livello è continuamente modificata da diverse cause, ed in ispecie dai cambiamenti cui van soggetti, ed i venti che spirano sul mare, e le correnti che muovono parallelamente alla nostra costiera da levante a ponente, ed infine le pressioni barometriche.

Dalle suddette osservazioni abbiain rilevato che le variazioni dell'altezza barometrica inducono variazioni inverse nell'altezza del livello del mare; cosicchè questo s'abbassa a misura che aumenta la pressione dell'aria, e s'innalza a misura che la stessa diminuisce. Paragonando i medii di queste variazioni abbiain trovato che ad ogni variazione d'un millimetro nell'altezza barometrica ne corrisponde una di circa 14^{mm} in quella del livello del mare. Avvertiamo però che per ben stabilire questo rapporto sarebbero necessarie maggiori osservazioni.

I nostri uomini di mare derivano da queste modificazioni che si

osservano nel livello delle acque, quei medesimi pronostici intorno al bello e cattivo tempo, che i meteorologi desumono direttamente dalle osservazioni barometriche, ed è fra essi comune il proverbio: *acque basse tempo bello, acque piene cattivo tempo* ¹.

ELETTRICITA' ATMOSFERICA.

Fra i fenomeni straordinari comparsi nella nostra atmosfera, durante il decennio cui si riferiscono le osservazioni finora discusse, abbiamo particolarmente notati quelli dovuti all'elettricità fulgurante, accumulata in certe nuvole temporalesche, e da queste scaricata con una emissione subitanea di luce, accompagnata da uno strepito più o meno prolungato. I giorni ne' quali si ebbero più o meno intensi quei segnali dell'elettricità atmosferica, cioè i giorni di lampi e tuoni, sommano a 518 per i dieci anni; quindi possiamo dire che il numero medio ne fu per ogni anno di 52. La ripartizione di questi fenomeni, nei diversi mesi e stagioni, si può vedere nel prospetto n.° 12: noi osserveremo soltanto ch'essi seguitarono un andamento analogo a quello delle medie temperature mensuali: trovasi infatti che la massima frequenza delle fulgori è nell'estate, la minima nell'inverno, e che la frequenza d'autunno è maggiore di quella di primavera. Dei 52 giorni fulgoranti dell'anno, circa la metà appartiene all'estate, ed il decimo soltanto all'inverno.

Non è però questo il numero de' giorni in cui si ebbero tempo-

¹ Esiste nel porto di Genova un seno di mare difeso da ogni lato per natura e per arte dall'ondeggiamento, ed ampio abbastanza, non che profondo, per contenere le regie fregate in disarmo. Nella parete verticale della calata interna vi è fissato un marmo nel quale sono tracciate delle divisioni metriche destinate a far conoscere le variazioni di altezza che in questo recinto subisce il pelo del mare in conseguenza delle diverse pressioni comunicate da fuori. Egli è in questo luogo che furono fatte le osservazioni intorno alle maree accennate nel testo. La massima oscillazione del mare, tanto al di sopra che al di sotto del livello medio, non eccede generalmente i 25 centimetri. Ponendo pertanto che l'intera oscillazione annuale sia di 500 millimetri, questa, divisa per 14, dovrà darci, come dà infatti, la media oscillazione annua del barometro.

Il 28 febbrajo del 1843 essendo il barometro disceso al di sotto dei 750^{mm}, il pelo dell'acqua s'elevar di 60 centimetri al di sopra del livello medio inondando la calata; alzamento di cui i più vecchi marinai non si ricordano di aver veduto altro esempio.

rali fulminei, con scariche elettriche ripetute ed abbondanti; non sommano essi a tanto; 11 circa se n'ebbero in ogni anno, e non più, e corrispondono perciò al terzo soltanto dei 32 giorni fulguranti dell'anno sopra notati.

TERREMOTI.

Le forti scosse di terremoto sono da noi assai rare; quelle di cui si conserva la memoria nelle nostre storie non cagionarono alterazione sensibile nel nostro suolo. Nel diario dell'osservatorio trovansi notate quattro soltanto avvenute nel periodo decennale da noi considerato.

Una forte scossa ondulatoria, nella direzione N. O., della durata di tre in quattro secondi, si ebbe il 4 luglio 1834. Altra più leggiera, nella direzione E. O., della durata di due secondi circa, fu l'11 aprile 1837. Si sentirono due o tre scosse di terremoto ondulatorio, non leggiera, tutte di brevissima durata, il 5 maggio 1838. Infine una assai breve e leggiera ne accadde il 31 gennaio 1840.

La più forte fra le scosse in Genova sentite nel presente secolo, anteriormente al decennio, fu quella del 9 settembre 1828 a mezz'ora dopo la mezzanotte che si ripetè per ben due volte durante le 24 ore. Fu tale lo spavento nel popolo che per varie notti grandissima parte ne dormì all'aperto; non si ebbero tuttavia danni gravi nei caseggiati.

Numero 1

MEDIE ANNUALI DELLE TEMPERATURE OREARIE, DELLE MASSIME MINIME E MEDIE TEMPERATURE DIARNE.

ANNI	MEDIE ANNUALI DELLE TEMPERATURE CONSERVATE ALLE ORE				MEDIE ANNUALI DELLE TEMPERATURE		
	9 Mattina	Mezzodi	3 Sera	9 Sera	Massime diurne	Minime diurne	Medie diurne
1833	15,80	16,78	17,49	15,56	18,11	12,96	15,35
1834	16,77	18,03	19,00	16,10	19,73	13,97	16,85
1835	15,01	16,33	17,04	14,61	17,76	12,33	15,16
1836	15,20	16,37	17,01	14,74	17,75	12,75	15,24
1837	14,66	15,83	16,31	14,53	17,23	12,30	14,76
1838	14,36	15,64	16,34	14,18	17,13	12,12	14,62
1839	15,82	16,93	17,61	15,38	18,37	13,32	15,85
1840	13,47	16,59	17,31	14,99	18,02	13,14	15,56
1841	16,26	17,39	18,06	15,77	18,82	13,90	16,56
1842	15,67	16,90	17,66	15,22	18,38	13,37	15,74
Medie . .	15,52	16,68	17,40	15,07	18,13	13,05	15,58

NUMERO V

MEDIE DECENNALI DELLE TEMPERATURE CORRISPONDENTI AI MESI ALLE STAGIONI ALL'ANNO.

MESI E STAGIONI dal 1853-1862	MEDIE DELLA TEMPERATURE OSSERVATE ALLE ORE				MEDIE DELLE TEMPERATURE			Differenza delle medie mensuali in torno alla media annuale
	9 Mattino	Mezzodi	3 Sera	9 Sera	Massime diurne	Minime diurne	Medie diurne	
Gennaio . . .	7,20	8,39	8,67	7,18	9,44	5,16	7,30	- 8,28
Febbraio . . .	8,27	9,02	10,20	8,29	10,97	5,96	8,46	- 7,12
Marzo . . .	10,48	11,82	12,69	10,23	13,26	8,09	10,67	- 4,91
Aprile . . .	13,11	14,40	15,13	12,67	15,96	10,46	13,21	- 2,37
Maggio . . .	17,01	18,93	19,77	17,21	20,61	13,08	17,83	+ 2,27
Giugno . . .	22,33	23,22	24,12	21,33	24,87	19,34	21,94	+ 6,36
Luglio . . .	24,27	25,37	26,13	23,39	27,14	21,42	24,17	+ 8,59
Agosto . . .	24,32	25,31	26,37	23,31	27,14	21,44	24,29	+ 8,71
Settembre . .	20,73	21,83	22,87	19,92	25,56	18,07	20,82	+ 5,24
Ottobre . . .	16,73	18,13	18,02	16,39	19,35	14,48	17,02	+ 1,44
Novembre . .	11,80	12,89	13,24	11,69	13,92	9,77	11,83	- 3,73
Dicembre . .	9,22	10,34	10,68	9,22	11,39	7,59	9,39	- 6,19
Inverno . . .	8,25	9,45	9,85	8,23	10,60	6,17	8,38	- 7,20
Primavera . .	13,83	15,03	15,87	13,38	16,61	11,21	13,91	- 1,67
Estate . . .	23,61	24,60	25,35	22,68	26,31	20,73	23,47	+ 7,89
Autunno . . .	16,42	17,02	18,34	16,00	19,01	14,11	16,56	+ 0,98
MEAN . . .	15,52	16,68	17,40	15,07	18,13	13,05	15,58	"

Numero 3

MEDIE DECENNALI DELLE ESTREME TEMPERATURE DEI MESI E STAGIONI E DELLE LORO MASSIME DEPRESSIONI.

MESI E STAGIONI dal 1833-1842	MEDIE DELLE TEMPERATURE		MEDIE delle Massime Dipressioni	DEPRESSIONI DELLA MEDIA ANNUALE DELLE TEMPERATURE		MEDIE delle Massime Variazioni diurne
	Massime	Minime		Massime	Minime	
Gennaio	14,42	- 0,40	14,82	- 1,16	- 15,98	8,25
Febbraio	13,49	+ 0,75	14,76	- 0,09	- 14,85	8,56
Marzo	18,04	3,22	14,82	+ 2,46	- 12,56	8,29
Aprile	21,78	5,02	16,76	6,20	- 10,56	9,07
Maggio	26,12	10,14	15,98	10,54	- 5,44	9,04
Giugno	29,56	15,05	14,51	15,98	- 0,55	9,02
Luglio	30,55	17,19	15,56	14,97	+ 1,61	8,96
Agosto	30,72	17,97	15,75	15,14	+ 2,39	8,02
Settembre	28,06	13,78	14,28	12,48	- 1,80	8,47
Ottobre	25,90	8,28	15,62	8,32	- 6,30	8,26
Novembre	18,57	4,05	14,54	2,79	- 10,55	7,74
Dicembre	16,26	2,56	15,70	0,68	- 12,02	6,95
Media	22,77	8,15	14,64	+ 6,69	- 7,45	8,49
Inverno	16,96	- 1,25	18,19	+ 1,58	- 16,81	8,97
Primavera	26,48	+ 2,35	24,15	10,90	- 13,25	10,17
Estate	31,67	14,71	16,96	16,09	- 0,87	9,75
Autunno	28,06	4,05	24,05	12,48	- 11,55	8,92
Media	25,79	6,96	20,85	+ 10,21	- 10,02	9,45

NUMERO 5.

EXTREME TEMPERATURE ANNUALI

ANNI	Massime	EPOCHE	Minime	EPOCHE	Massime Differenza annuali
1833	+ 31, 3	Il 9 Giugno	+ 0, 6	Il 3 Gennaio	30, 9
1834	31, 6	" 10 Luglio	+ 1, 0	" 11 Febbraio	30, 6
1835	31, 3	" 10 Agosto	- 1, 3	" 12 Dicembre	33, 0
1836	32, 3	" 17 Luglio	- 3, 1	" 2 Gennaio	33, 4
1837	31, 7	" 26 Agosto	- 1, 9	" 2 Gennaio	33, 6
1838	30, 3	" 10 Luglio	- 3, 0	" 10 Gennaio	33, 3
1839	32, 3	" 2 Agosto	0, 0	" 26 Gennaio	32, 3
1840	30, 6	" 27 Agosto	- 2, 5	" 12 Gennaio	33, 1
1841	32, 0	" 17 Luglio	- 0, 4	" 2 Febbraio	32, 4
1842	32, 3	" 13 Agosto	- 1, 3	" 10 Gennaio	33, 0
Media . .	31, 67	Il 26, 6 Luglio	- 1 25	Il 12, 5 Gennaio	32, 9

VOLUME 3.

5
MEDIE ANNUALI DELLE PRESSIONI BAROMETRICHE OGIARIE, DELLE MEDIE DIURNE E DEI PERIODI BAROMETRICI.

ANNI	MEDIE DELLE PRESSIONI OSSERVATE ALLE ORE				Medie delle Medie diurne	PERIODI BAROMETRICI	
	9 Mattina	Mezzodi	3 Sera	9 Sera		Discendente	Ascendente
1833	756,664	756,575	756,042	756,431	756,553	0,622	0,409
1834	59,568	59,329	58,711	59,238	59,439	0,857	0,527
1835	57,733	57,616	57,115	57,309	57,434	0,638	0,454
1836	56,807	56,618	56,102	56,387	56,454	0,705	0,485
1837	56,903	56,826	56,298	56,800	56,601	0,607	0,502
1838	53,428	53,261	54,751	53,062	53,079	0,697	0,361
1839	56,387	56,274	55,809	56,153	56,098	0,578	0,344
1840	57,129	56,905	56,585	56,734	56,786	0,746	0,371
1841	55,887	55,746	55,187	55,651	55,537	0,700	0,444
1842	57,122	56,838	56,353	56,947	56,757	0,709	0,594
Media . .	756,965	756,806	756,275	756,722	756,619	0,692	0,449

Parte I.

12

N. 2200 6

MEDIE DECAENALI DELLE PRESSIONI BAROMETRICHE CORRISPONDENTI AI MESI ALLE STAGIONI ALL' ANNO.

MESI E STAGIONI dal 1833-1862	MEDIE DELLE PRESSIONI OSSERVATE ALLE ORE.				MEDIE delle Medie diurne	PERIODI BAROMETRICI MEDII		DIFERENZE delle medie mensuali dalla media annuale
	9 Mattina	Mezzodi	3 Sera	9 Sera		Discendenti	Ascendenti	
Gennaio. . .	758,938	758,393	758,107	758,622	758,522	0,854	0,515	+ 1,905
Febbraio . .	37,678	37,412	36,807	37,383	37,242	0,874	0,376	+ 0,625
Marzo . . .	36,626	36,394	35,714	36,422	36,170	0,912	0,708	- 0,449
Aprile . . .	35,383	34,246	33,642	34,270	34,012	0,741	0,628	- 2,607
Maggio . . .	36,376	35,847	36,267	36,287	36,125	0,356	0,420	- 0,494
Giugno . . .	37,389	37,350	36,862	37,052	37,135	0,307	0,130	+ 0,316
Luglio . . .	36,784	36,072	36,324	36,190	36,134	0,460	0,060	- 0,065
Agosto . . .	36,879	36,745	36,250	36,109	36,334	0,449	0,269	- 0,065
Settembre. .	36,718	36,628	36,099	36,373	36,408	0,619	0,476	- 0,211
Ottobre. . .	37,425	37,050	36,304	36,862	36,757	0,752	0,474	+ 0,138
Novembre. .	35,798	35,615	35,129	35,094	35,465	0,609	0,363	+ 1,136
Dicembre . .	38,802	38,600	38,106	38,052	38,484	0,756	0,346	+ 1,805
Inverno. . .	38,495	38,302	37,675	38,219	38,085	0,820	0,346	+ 1,464
Primavera . .	35,804	35,671	35,068	35,653	35,456	0,756	0,385	- 1,185
Estate . . .	37,017	36,915	36,479	36,640	36,748	0,338	0,161	+ 0,129
Autunno . .	36,546	36,434	35,875	36,377	36,209	0,675	0,504	- 0,410
MEDE . . .	756,905	756,806	756,375	756,722	756,619	0,692	0,449	"

NUMERO 7

MEDIE BIENNALI DELLE ESTREME PRESSIONI BAROMETRICHE DEI MESE E STAGIONI E DELLE LORO MASSIME DIGRESSIONI.

MESE E STAGIONI dal 1835-1842	VALORI DELLA PRESSIONI BAROMETRICHE		MEDIE delle Massime Digressioni	DIGRESSIONI DALLA MEDIA ANNUALE DELLE PRESSIONI	
	Massime	Minime		Massime	Minime
Gennaio	769,450	742,065	27,385	+ 12,851	14,354
Febbraio	699,600	42,251	27,375	12,987	14,388
Marzo	66,745	45,797	22,940	10,124	12,822
Aprile	62,608	45,712	18,896	6,079	12,907
Maggio	65,654	47,598	15,650	6,415	9,221
Giugno	62,874	48,740	14,154	6,255	7,879
Luglio	61,450	49,952	11,478	4,811	6,677
Agosto	61,775	48,185	15,590	5,154	8,456
Settembre	65,710	46,516	17,194	7,091	10,105
Ottobre	65,084	42,800	22,275	8,465	15,810
Novembre	66,557	41,950	24,598	9,958	14,660
Dicembre	68,014	45,225	22,789	11,595	11,594
Media	65,081	45,216	19,825	8,462	11,405
Inverno	72,542	58,758	35,804	15,925	17,881
Primavera	67,559	41,950	25,409	10,740	14,069
Estate	65,589	46,258	17,551	6,970	10,561
Autunno	67,445	58,815	28,638	10,824	17,804
Media	67,755	44,440	26,265	11,414	15,179

N. 1120 R.

ESTREME PRESSIONI BAROMETRICHE ANNUALI E MASSIME OSCILLAZIONI DELLE MEDESIME.

ANNO	Massime pressioni	EPOCHE	Minime pressioni	EPOCHE	Massime Digressioni annuali
1833	772, 13	Il 6 Gennaio	739, 37	Il 31 Agosto	32, 76
1834	75, 66	" 27 Febbraio	40, 23	" 24 Ottobre	33, 43
1835	73, 78	" 6 Gennaio	36, 49	" 11 Ottobre	37, 59
1836	73, 07	" 23 Gennaio	32, 73	" 23 Dicembre	40, 34
1837	73, 80	" 8 Febbraio	33, 78	" 20 Novembre	38, 41
1838	69, 96	" 21 Dicembre	28, 97	" 26 Febbraio	40, 99
1839	73, 87	" 7 Febbraio	36, 33	" 30 Gennaio	37, 34
1840	73, 06	" 26 Dicembre	36, 73	" 4 Febbraio	36, 33
1841	73, 66	" 4 Marzo	33, 08	" 4 Gennaio	38, 58
1842	73, 38	" 12 Febbraio	39, 47	" 26 Novembre	34, 21
Mezz. . .	73, 246	Il 26, 8 Gennaio	36, 078	Il 9, 2 Dicembre	37, 168
Nel decennio . .	773, 66	Il 27 Febbraio 1834 alle 9 A. M.	727, 28	Il 26 Febbraio 1838 alle 8 A. M.	48, 38

N.º 9.

UNITÀ DELL' AHA SECONDO LE INDICAZIONI DELL' IGROMETRO DI SAUSSURE.

MESI E STAGIONI dal	MEDIE DECENNALI DELLE IGROMETRICHE OSSERVATE ALLE ORE				IGROMETRICHE ESTREME		
	9 Mattina	Mezzodi	3 Sera	9 Sera	Massime	Minime	Massime digerzioni
1833-1842							
Gennaio. . .	80,0	78,7	78,9	79,8	98,3	49,1	49,2
Febbraio . .	78,2	77,7	76,3	77,1	96,7	51,4	43,3
Marzo . . .	79,3	78,8	78,4	80,7	93,8	48,8	47,0
Aprile . . .	80,1	79,6	78,9	81,2	96,6	54,0	42,6
Maggio . . .	84,7	84,0	82,6	84,9	97,3	60,4	36,9
Giugno . . .	84,6	83,8	83,3	83,2	93,7	62,1	33,6
Luglio . . .	85,0	84,7	83,4	86,3	96,2	61,2	33,0
Agosto . . .	84,9	84,1	83,0	85,0	97,2	61,5	33,7
Settembre. .	84,2	84,1	82,9	85,0	97,4	62,5	34,9
Ottobre . . .	81,9	80,2	79,2	82,4	96,7	58,4	38,3
Novembre. .	83,0	82,1	81,7	83,2	97,8	56,6	41,2
Dicembre. .	79,2	78,8	78,9	79,1	93,9	57,7	48,2
Inverno. . .	79,1	78,4	78,1	78,7	98,4	44,6	33,8
Primavera . .	81,4	80,8	79,9	82,3	97,9	48,2	40,7
Estate. . . .	84,8	84,2	83,3	83,3	97,7	56,2	41,5
Autunno . . .	83,0	82,1	81,3	83,7	98,4	53,6	44,8
Media . . .	82,1	81,4	80,6	82,5	96,8	56,2	40,6

F. I.

82.

Novizio 10

PROSPETTO GENERALE DELLE PIOGGE CADUTE IN GENOVA DAL 1.° DEL 1855 A TUTTO IL 1862.

MESE E STAGIONI	1855	1856	1857	1858	1859	1860	1861	1862	MEDIE
Gennaio	96, 10	135, 06	170, 32	104, 80	126, 90	85, 48	11, 96	42, 35	100, 01
Febbraio	102, 26	29, 39	77, 97	300, 94	65, 06	244, 64	106, 48	70, 74	132, 69
Marzo	183, 90	0, 98	21, 29	125, 02	197, 26	135, 50	91, 22	16, 18	85, 37
Aprile	173, 04	145, 35	116, 72	86, 20	145, 13	102, 29	29, 49	121, 05	113, 80
Maggio	53, 52	84, 69	208, 99	77, 04	125, 96	72, 41	111, 25	210, 16	110, 24
Giugno	36, 64	102, 04	41, 67	4, 21	18, 62	154, 45	3, 98	7, 09	30, 01
Luglio	215, 79	45, 96	1, 95	17, 22	57, 37	49, 45	0, 00	42, 95	52, 52
Agosto	25, 75	281, 95	345, 69	12, 28	56, 21	55, 11	65, 45	26, 35	114, 99
Settembre	244, 67	24, 02	165, 10	135, 91	75, 92	320, 52	242, 25	197, 91	175, 50
Ottobre	16, 18	152, 01	145, 42	87, 70	122, 20	54, 58	175, 50	285, 09	189, 64
Novembre	230, 20	178, 37	78, 67	154, 79	49, 08	176, 15	345, 91	88, 71	175, 02
Dicembre	6, 05	1, 15	2, 05	89, 56	181, 58	86, 87	205, 46	24, 37	94, 26
Inverno	204, 41	186, 38	230, 32	495, 50	371, 54	414, 99	521, 90	137, 46	526, 96
Primavera	412, 26	251, 22	345, 06	288, 26	464, 55	530, 20	521, 94	517, 37	511, 58
Estate	296, 16	427, 90	387, 51	55, 71	110, 20	216, 99	68, 05	76, 37	217, 52
Autunno	511, 05	554, 40	384, 19	378, 40	245, 20	551, 25	961, 66	569, 71	490, 06
Pioggie annuali	4425, 88	1199, 90	1566, 82	1195, 07	1191, 09	1495, 45	1585, 35	1150, 91	1543, 92

Numero 12.

PIOGGE DIRETTE CHE CADDERO IN GENOVA
DURANTE I 10 ANNI.

1833. Li 25 novembre 127 ^{mm} , 4. Vento NE.
1834. " 26 agosto dalle 9. ¹¹ / ₁₆ mattina alle 3 sera 110 ^{mm} , 4. Vento N. in soli 20 ^{mm} si ebbero 23 ^{mm} .
1835. " 22 agosto 141 ^{mm} , 7. Vento NE. dalle 9 alle 10 si ebbero 66 ^{mm} .
1837. " 10 dicembre 103 ^{mm} , 2. Vento NE.
1838. " 16 settembre 139 ^{mm} , Vento NE. ed E.; in 20 ^{min} si raccolse, 30 ^{mm} ; il totale si ebbe in 4 ore.
1839. " 4 e 5 novembre. 2 rovesci che diedero insieme 279 ^{mm} Vento NE.
1840. " 3 settembre, dalle 9 mattina alle 9 sera 86 ^{mm} con vento variabile ora NE. ora SE.
1840. " 28 novembre 134 ^{mm} . Vento variabile NE. al SE.
1841. " 17 febbraio 132 ^{mm} , 24. Vento NE. e SE.
1842. " 25 agosto in meno di 10 ore 247 ^{mm} , 4 in soli 69 ^{min} se ne ebbero 141, 1 che corrispondono a 1 ^{mm} , 61 per minuta. Vento NE.

Numero 11.

PIOGGE DECENNALI IN ORDINE DEI MESI
E NUMERI DEI GIORNI PIOVOSI.

MESI	PIOGGE decennali	NUMERO dei giorni piovosi	RAPPORTI delle piovge ai giorni piovosi
Gennaio	1000, 06	115	8, 70
Febbraio . . .	1526, 86	95	15, 97
Marzo	835, 74	118	7, 25
Aprile	1158, 00	125	9, 41
Maggio	1102, 06	138	7, 99
Giugno	800, 14	78	6, 41
Luglio	925, 17	67	7, 84
Agosto	1140, 92	85	13, 85
Settembre . .	1755, 00	151	15, 25
Ottobre	1437, 42	109	15, 19
Novembre . . .	1750, 18	147	11, 77
Dicembre . . .	942, 60	106	8, 89
NEDIE	1345, 92	151	10, 27

Numero 13

FREQUENZA RELATIVA DEI VENTI NEI MESI E STAGIONI DELL'ANNO.
dal 1853 al 1842.

MESI E STAGIONI	N.	NE.	E.	SE.	S.	SO.	O.	NO.
Gennaio. . .	435	237	85	124	27	35	9	33
Febbraio . .	431	244	62	125	47	54	17	22
Marzo . . .	322	164	78	194	84	121	19	21
Aprile . . .	500	147	65	170	89	158	29	42
Maggio . . .	189	92	44	257	137	228	39	14
Giugno . . .	101	59	55	252	165	348	29	15
Luglio . . .	105	58	42	242	205	297	52	21
Agosto . . .	456	80	58	222	192	288	30	14
Settembre. .	215	120	58	256	157	189	17	10
Ottobre . . .	367	198	47	161	97	13	15	18
Novembre. .	385	262	75	167	45	44	12	16
Dicembre. .	470	244	95	105	59	26	7	16
Inverno . . .	455	244	80	115	38	38	11	24
Primavera . .	270	135	62	199	110	169	29	26
Estate. . . .	114	66	58	238	186	511	50	17
Autunno . . .	521	195	59	195	92	110	15	15
Nell'anno. . .	290	159	60	187	406	157	21	20

NUMERO 14.

FREQUENZA RELATIVA DEI VENTI NE' MESI E STAGIONI DELL' ANNO IN BAGNOVE DELLE LORO VELOCITA'.

MESI E STAGIONI	FORTISSIMO	FORTE	VENTO	VESTITELLO	CALMA
Gennaio	50	124	284	329	213
Febbraio	20	111	324	308	237
Marzo	8	71	324	308	289
Aprile	16	55	307	303	259
Maggio	3	43	243	340	371
Giugno	2	55	179	347	417
Luglio	3	42	275	333	323
Agosto	6	32	229	340	303
Settembre	6	68	280	397	340
Ottobre	11	83	342	331	231
Novembre	30	99	318	328	225
Dicembre	26	137	330	266	221
Inverno	32	124	319	301	224
Primavera	9	56	201	337	307
Estate	4	43	228	347	378
Autunno	16	84	316	319	205
Nell' anno	15	77	289	326	283

NUMERO 13

MESI E STAGIONI	PROSPETTO PER LO STATO DEL CIELO					PROSPETTO PER LO STATO DEL MARE A MEZZODI					
	NUMERO DELLE OSSERVAZIONI CON CIELO					NUMERO DEI GIORNI					
	Sereno	Mezzo- coperto	Nuvoloso	Nebbioso	di Grandine	di Neve	di Gelo	di Tuoni	Grosso	Agitato	Calma
Gennaio.	393	427	418	39	2	19	43	4	43	32	122
Febbraio.	426	363	337	38	9	18	21	7	32	63	86
Marzo.	385	326	351	41	6	7	7	8	28	37	132
Aprile.	294	604	302	20	12	2	"	21	30	38	162
Maggio.	369	614	287	46	6	"	"	38	43	44	130
Giugno.	394	677	129	34	4	"	"	44	33	43	134
Luglio.	433	678	109	9	7	"	"	48	37	37	138
Agosto.	406	607	137	22	2	"	"	39	36	30	151
Settembre.	412	525	203	32	4	"	"	33	33	42	133
Ottobre.	443	524	275	33	6	"	"	22	61	48	108
Novembre.	282	435	483	48	3	3	3	8	60	53	97
Dicembre.	432	406	402	63	4	12	10	4	33	71	111
Gennaio.	1235	1198	1157	140	13	49	74	13	150	186	517
Primavera.	986	1774	920	107	24	9	7	67	101	139	404
Estate.	1343	1062	373	63	13	"	"	131	111	110	423
Autunno.	1137	1482	1021	113	13	5	3	85	154	143	340
Giorai nell' anno . . .	118	160	87	42,5	6,3	6,3	8,4	34,8	71	82	212

MAGNETISMO TERRESTRE

Gli elementi del magnetismo terrestre conseguiti in quest' articolo sono stati determinati per mezzo di due bussole costrutte dal Gambey di Parigi, onde è inutile parlare della bontà e perfezione di questi strumenti. La bussola di inclinazione porta un nonio che scorre sul circolo azimutale e lascia leggere i minuti; il circolo verticale è diviso di dieci in dieci minuti, e la punta dell' ago di inclinazione, il cui asse di rotazione passa pel centro di questo circolo, serve di indice, onde altri è costretto a valutare approssimativamente le unità dei minuti. Nella bussola di declinazione il circolo azimutale è percorso da due nonii divisi di dieci in dieci secondi, e l' asse magnetico dell' ago declinatorio è tracciato dall' incrociamiento di due finissimi fili nell' interno di due circoli situati uno per parte alle due estremità dell' ago, ai quali si collima mediante un cannocchiale, il cui asse ottico è determinato dall' intersezione di due fili perpendicolari e che montato sopra due colonnette come uno strumento dei passaggi, si move insieme coi nonii.

Per eseguire con questi strumenti le osservazioni fu fatto costruire provvisoriamente, a qualche distanza dall' osservatorio della R. Marina, un solido terrazzino di pietra nell' allineamento fra lo strumento

dei passaggi, e la mira meridiana situata alla distanza orizzontale di circa 2000 metri. Su questo terrazzino fu determinato un punto che fosse esattamente nell'allineamento suddetto, e quivi sempre furono collocati gli strumenti per le osservazioni; queste furono fatte nel mese di luglio del presente anno 1846; non prima delle cinque del mattino, e non mai protratte al di là delle nove parimenti del mattino. Per la declinazione, fatte prima allo strumento le dovute rettificazioni, veniva diretto l'asse ottico del cannocchiale al centro della mira meridiana, e letti i due nonii; poi messo l'ago nella sua staffa veniva dato un movimento in azimut, fino a portare l'intersezione dei fili del cannocchiale a coincidere coll'intersezione dei fili dell'ago in equilibrio ¹. Questa coincidenza stabilita per ciascuno dei poli dell'ago, tanto nella posizione diretta, che rovesciato, si avevano così dalle letture di ciascun nonio quattro archi dei quali presa la media, e fattane la differenza coll'arco segnato dallo stesso nonio quando il cannocchiale era sulla mira meridiana si aveva in tal modo la declinazione. In tutte le osservazioni si trovarono sempre i due nonii perfettamente d'accordo. Quattro serie di osservazioni fatte in giorni diversi hanno dato

DECLINAZIONI.

1. ^a Serie	17°. 55'. 20". N. O.
2. ^a Id.	17. 51. 22.
3. ^a Id.	17. 57. 52.
4. ^a Id.	17. 59. 42.

MEDIA. 17°. 56'. 4". N. O.

Per avere l'inclinazione furono sperimentati diversi metodi. Col metodo chiamato indiretto fu portato il circolo di inclinazione in diverse posizioni facendogli percorrere di 50° in 50° tutto il circolo azimutale, e notata l'inclinazione in ciascuna di queste posizioni; poi rovesciato l'ago nel circolo e ripetute le stesse osservazioni. In seguito, prese le medie delle osservazioni fatte in una stessa posizione del circolo verticale furono combinate queste medie a due a

¹ A quest'oggetto il cannocchiale è munito di due obbiettivi di forza diversa.

due ad angolo retto in tutti i modi possibili, calcolando l'inclinazione colla nota formula

$$\text{Cot}^2 I = \text{Cot}^2 a + \text{Cot}^2 b$$

nella quale I è l'inclinazione cercata, a e b due inclinazioni lette in due piani perpendicolari.

Col metodo diretto, trovata la posizione del circolo di inclinazione in cui l'ago è verticale, e la graduazione volta al Nord, fu dato un movimento azimutale di 90° a dritta e a sinistra di questo punto, e lette le inclinazioni; poi volta la graduazione al Sud, e trovato il punto in cui l'ago è nuovamente verticale, fu fatto muovere il circolo in azimut di 90° dritta e sinistra, e lette le inclinazioni. La media di queste quattro letture era considerata come l'elemento cercato.

Sopra i risultati ottenuti con questo metodo poteva rimanere qualche dubbio, perchè, posta una deviazione fra l'asse magnetico dei nostri aghi, e l'asse di figura che serviva di indice, deviazione che quantunque assai piccola era indicata dalle osservazioni, ne veniva per conseguenza che tutte le inclinazioni erano osservate fuori del meridiano magnetico, e quindi maggiori della vera; quantunque, stante la picciolezza della deviazione suddetta, appena di alcuni minuti, la teoria indichi che l'errore era trascurabile rimpetto agli errori di osservazione. Ad ogni modo si volle far saggio di un altro metodo. Fu quindi provato a determinar prima sul circolo azimutale la posizione del meridiano magnetico, in questa fissare invariabilmente il circolo verticale, e letta un' inclinazione rovesciare poi l'ago nello strumento senza smovere il circolo dalla posizione primitiva, giacchè le indicazioni della punta inferiore dell'ago trovate in ogni caso sempre uguali con quelle della superiore, facevano giudicare essere il circolo verticale ben diviso. La posizione del meridiano magnetico fu determinata alcuna volta cercando sul circolo azimutale i due punti distanti di circa 180° nei quali l'ago si teneva verticale, poi dividendo in mezzo l'arco compreso fra questi punti; altra volta invece messo il piano dell'ago distante da 40° a 50° dal meridiano magnetico si leggeva l'inclinazione notando altresì la posizione dell'alidada sul circolo orizzontale, poi dato movimento in azimut minore di 180° passando pel meridiano magnetico si portava ad eguale inclinazione dall'altra parte del meridiano. Alla metà dell'arco orizzontale compreso fra questi punti era fissata l'alidada per

mettere il circolo verticale nella posizione voluta. Si trovò sempre che questo era il punto di minima inclinazione. In tutte queste osservazioni fu fatto uso successivamente di due aghi. Le medie di questi aghi ottenute coi diversi metodi sono le seguenti

INCLINAZIONE.

1. ^o Metodo	62. 13. 57.
2. ^o Id.	62. 13. 32.
3. ^o Id.	62. 3. 45.
4. ^o Id.	62. 6. 50.

MEDIA GENERALE	. . .	62. 10. 33.
----------------	-------	-------------

FINE DELLA PARTE PRIMA.

PARTE SECONDA

REGNO VEGETALE

Le ricchezze vegetali per cui il nostro suolo è ripetutamente cercato dai botanici d'oltremonti, già ci furono per la più parte additate dall'Allioni, dal Bertoloni e dal Viviani, le cui opere non periture io non istarò a inventariare, perchè notissime a tutti i cultori dell'amabile scienza. Per lo stesso riguardo vogliono essere ricordate la Flora Ticinese di Balbis e Nocca, che comprende porzione delle piante apennine, l'elenco delle stirpi chiavaresi del Turio, le tre centurie di piante della Liguria occidentale, le sole pubblicate, del Badarò, le dotte memorie del Balbis, del Bellardi, dell'Avé-Lallemant, sì che mi parrebbe di poter asserire, esserci conosciute le piante che abbelliscono il nostro territorio, quantunque non siano state riassunte in un quadro di uniforme disegno da raffrontarsi colle Flore dei paesi limitrofi.

Il carattere della vegetazione della Liguria si trova egregiamente ritratto nella dotta prefazione alla Flora Libica del chiarissimo Viviani (*Florae Lybicae Specimen. Genuae 1824*), nè alcuno io credo gli vorrà contestare, non essere la nostra Flora che la plaga settentrionale di quella vasta regione che lo stesso autore, sull'orme dell'immortale De Candolle, ha designato col nome di cratere medi-

terraneo, e che abbraccia l'ultimo lembo del continente Europeo, dell'Asia settentrionale occidentale, dell'Africa boreale, bagnato dalle acque del mare mediterraneo. E sebbene la Flora ligustica ne' suoi limiti settentrionali si connetta per insensibili sfumature alla transapennina, nel modo stesso che le piante del litorale Adriatico irradiano molto addentro nella vallata del Po, per cui incerto è il confine che separa la regione subalpina dalla mediterranea, non per questo m'arride l'opinione dello Schouw, il quale nel suo abbozzo di trattato di Geografia Botanica ¹, le accomuna, sotto il nome di regione delle *Cariofillée* e delle *Labiato*, in uno stesso riparto.

Ben è vero che la comparsa di alcune piante della Flora mediterranea in qualche punti del campo di vegetazione subalpino, quali sarebbero le rive dei laghi insubrici e del Benaco, i colli Veronesi e dell'alto Novarese, parrebbe appoggiare l'opinione del benemerito botanico Danese; ma nè le specie erratiche, nè gli ulivi, nè l'alloro, nè il cipresso, nè l'*Agave americana* che l'industria ha propagato nelle accennate località di eccezione, sono titolo plausibile a dichiarare uniforme il carattere di due contrade che differiscono per tant'altri rapporti. E dico località eccezionali le siffatte, perocchè in esse i momenti favorevoli allo sviluppo di piante di aliene regioni, nascono dal fortuito concorso di alcune peculiari condizioni, delle quali dove una fallisca, come ha già osservato il chiarissimo Barone Cesati, la natura riprende al tutto il suo abituale vestito. Perchè nei nostri giardini prosperano allo scoperto, ed anche in piena terra, moltissime specie originarie del Capo e dei tropici, si dirà forse che le spiagge del mediterraneo partecipano dell'indole degli accennati paesi? Io nol posso ammettere, e più presto ne torrei le ragioni o nell'arcana costituzione delle specie medesime, per cui possono tollerare le più basse temperature del nostro clima, o nelle condizioni di alcune località privilegiate nel lungo tratto che si estende dal Varo alla Nagra. Arrogio che delle specie che lo Schouw ha portate siccome caratteristiche dell'indicata sua regione delle *Labiato* e delle *Cariofillée*, ben poche ricorrono al di là d'Apennino, nè mai riescono ad usurpare ragguardevole spazio di paese; e di alcune si potrebbe sospettare esservi state introdotte unitamente agli ulivi, all'alloro, al cipresso, all'esperidée. Le ragioni pertanto del riparto adottato

¹ *Annales des Scienc. Naturell.* 2.^a Série, tom. III.

dal nostro Viviani, mi sembrano stabilite sopra solide basi, e il sudato Sig. Barone Cesati, divisando esplicitamente, nel suo saggio sulle Ombellate della Flora elvetico-germanica e dell'Italia boreale ¹ i confini che separano una Flora dall'altra, le ha appoggiate di nuova e più valida autorità.

I rapporti delle diverse provincie del cratere mediterraneo, l'uniforme sembianza del loro carattere, le vie onde le specie dalle parti australi dello stesso eratere, procedendo lughesso gli opposti litorali ne raggiungono l'estremo confine, mentre alcune dalla Sardegna e dalla Corsica tragittano ai nostri lidi, nè altrove appariscono; il fatto di specie che comuni ad amendue le spiagge, si spingono a un'altezza sensibilmente maggiore nel lato occidentale; di specie tuttavia ristrette nella cerchia delle isole, non isfuggirono punto alla perspicacia dell'illustre Viviani. Ma questi riscontri riflettono le specie veramente native del litorale mediterraneo, chè quanto alle arvensi, pei motivi che in altro mio scritto ho prodotti, e anzi tutto pel fatto, che le piante annuali si veggono quasi sempre compagne ai cereali, ed esulando con essi oltrepassano bene spesso i confini della Flora mediterranea e delle alpi, io sono d'avviso ei siano venute dalle sterminate pianure dell'Asia settentrionale, nella stessa maniera che dalle regioni del Caucaso, veggiamo ogni giorno approdare tra noi peregrine dapprima non viste. Però, il ripeto, lo stato primitivo della Flora di una data regione si dovrebbe dedurre dalla vegetazione dei terreni non ancor dissodati, e nel caso nostro dalle dune, dai pascoli, dalle selve che dal litorale conducono alle vette più elevate dell'Apennino e delle Alpi marittime. Se non che importando al presente di conoscere i prodotti naturali del nostro paese, omesse le induzioni comunque evidenti, mi terrò a rilevarne le masse come elle si trovano, non che gli elementi onde sono composte.

Già dalle nostre mura e dalle rupi che specchiansi in mare, inghirlandate dei cespugli della *Cineraria maritima*, del *Crithmum*, dell'*Euphorbia Characias* e *Pithyusa*, della *Matthiola incana*, del *Daucus gummifer*, degli enormi cesti dell'*Agave americana*: dai fitti tappeti dell'elegante *Lamarckia aurea*, dai dorati capolini dell'*Hysseris radiata* e del *Sonchus tenerrimus*, dall'*Arisarum vulgare*, dall'*Umbilicus pendulinus*, dal *Lepidium procumbens*, dall'impossibile

¹ Biblioteca Italiana, tomo. 82.

Alyssum maritimum, che si abbarbicano alle pareti delle case o ne ammantano i tetti, ci si appalesa il carattere della Flora ligustica, il cui aspetto generale, se io m'appongo, vedesi compendiato nelle circostanti alture, che quasi immensi scaglioni, in mille sensi interrotti, per mille braccia concatenati, disegnano il fondo dell'incantevole panorama che si svolge alle spalle della nostra città ¹.

¹ Basterebbero a dimostrare la dolcezza del nostro clima le estese coltivazioni delle Anranziere, e le belle specie esotiche che veggonsi in piena terra in alcuni de' nostri giardini, e perfino nel parterre dell' amenissima passeggiata dell' Acquasola, onde con molta verità asseriva non ha guari un nostro celeberrimo patrizio « che tutta quella « zona che si estende lungo il mare a molte miglia da una parte e dall' altra di Ge- « nova, è fatta continuo giardino » (Vedi *Rivista Ligure* vol. 2. 1745). Farò per altro osservare che nell' inverno dello scorso anno, essendo repentinamente disceso il termometro a — 4.°, perirono nell'Orto Botanico molte piante, che poste in piena terra negli anni precedenti, pel modo onde aveano prosperato, si sarebbe detto essersi pienamente assuefatte al nostro clima. Fra queste piacemi menzionare una *Bignonia jasmuinifolia*, che nella state precedente si era vestita di splendentissimi fiori, il *Solanum betuleum*, la *Royena lucida*, il *Pittosporum undulatum*, l' *Andropogon Schoenanthus*, e una *Draecena Draco*, che già da tre anni trovavasi in terra, e pareva promettere di raggiungere insolite dimensioni. Non ne riscotirono il *Laurus Camphora*, la *Bulbine frutescens*, il *Cereus cylindricus*, il *Solanum fragrans*, ecc., e ciò vien pur sempre in conferma dell'opinione, doverci cercare nella particolare condizione dei tessuti delle piante, le ragioni per cui di due o più specie, di una stessa zona, una resiste alle nostre più basse temperature, mentre le altre periscono inevitabilmente, se la temperatura cede anche di poco il minimo delle temperature del loro paese nativo. — Soggiungo una nota di alcune piante che si coltivano in piena terra nei giardini di Genova.

Acer oblongum.

Arcia eburnea.

Aloe, molte specie.

Bambusa arundinacea.

Cadia purpurea.

Calla aethiopica.

Cassia corymbosa.

hevigata.

Celastrus luxifolius.

Cereus cylindricus.

peruvianus.

Chrysocoma Coma aurea.

Crassula tetragona.

Dichondra argentea.

Davma ericoides.

Ficus coronata.

Grewia occidentalis.

Halleria laurida.

Kniphofia aloides.

Laurus Camphora.

foetens.

ladira.

Lycium Boerhaviaefolium.

Melaleuca armillaris.

Mesembryanthemum, molte specie.

Mynporum ellipticum.

Olea chrysophylla.

undulata.

Osteospermum moniliferum.

Paederia foetida.

Panax aculeatum.

Phylla ericoides.

Alla foce degli attigui torrenti, o nel breve passo dei colli che quinci e quindi dolcemente declina alla spiaggia, a cui fanno corona alcune poche specie marine (*Medicago litoralis*, *Arenaria marginata*, *Salsola Kali*, *Euphorbia Peplis* ecc.), nei siti non per anco guadagnati alle fertili ortaglie, al canneto, al vitigno, frequenta malaugurata famiglia di piante spinescenti ed infeste, lo *Scotymus maculatus*, la *Centaurea aspera*, *Pouzini*, *Calcitrapa*, il *Carduncellus lanatus*, l'*Inula viscosa* ecc., tra le quali serpeggiano talvolta grami tappeti di tenue verzura, in cui dominano il *Trifolium nigrescens* e il *fragiferum*, il *Lolium perenne*, la *Poa annua*, la *Bellis perennis*, o finalmente ne' siti depressi fecondati da qualche rigagnolo, il *Cyperus badius*, il *Ranunculus repens*, il *Sium nodiflorum*, la *Glyceria fluitans*, la *Veronica Anagallis*, l'*Juncus compressus* e il *glaucus* ecc.

Sui poggi che indi succedono si alternano con varia vicenda le selve, le macchie, i pascoli, i vigneti, gli ulivi. Gli ulivi lunghesso il litorale si adattano a tutte le esposizioni soleggiate, purchè lambite dalla brezza marina, epperò si veggono in ischiera quasi mai interrotta vestire le falde dei colli, seguirne le sinuosità, internarsi nelle profonde vallée ed elevarsi fin oltre i mille piedi d'altezza sulle balze che ne chiudono il fondo. Ma all' aprirsi dell' ampie vallate, sui versanti battuti dalle nordiche bufere, già prevalgono gli oscuri colori della Flora silvestre dell' interno Apennino, e veggiamo i castagneti, i querceti, le fitte macchie dell' *Ostrya* toccare ai confini delle esposizioni riserbate agli ulivi, e per poco inoltrarsi fin presso la spiaggia.

Coi cereali e i legumi che simultaneamente coltivansi, o tra i ben condotti filari delle viti, o all' ombra dei pallidi ulivi, i quali costituiscono uno de' rami di maggior importanza della Ligure agricoltura, nel tempo stesso che da sè soli caratterizzano fortemente il cratere mediterraneo, ne vennero ai nostri colli le specie che forse in origine non vi avevano stanza. Porterò per esempio, come quelle che oltre i confini del nostro territorio non trovano tutte le condi-

Polygala myrtifolia.
Sabal Adansonii.
Senecio Pelastus.
Solanum auriculatum.
Ionariense.

Tarhonanthus camphoratus.
Tournefortia foetida.
Westringia rosmariniformis.
 ecc. ecc.

zioni indispensabili alla lor diffusione, il *Lathyrus Ochrus*, la *Nigella damascena*, il *Dianthus velutinus*, la *Silene nocturna*, il *Ranunculus muricatus*, la *Stachys hirta*, l'*Hippocrepis ciliata*, tra le quali, soverchiato l'angusto orlo dei pensili camperelli (*fasse*) a cui sono ristrette, veggonsi le piante native, come se accennassero di volere riguadagnare il terreno d'onde furono escluse. Tali sono le specie che popolano tuttavia i pascoli apriei, la *Silene italica*, l'*Hyoseris radiata*, il *Brachypodium pinnatum*, l'*Astragalus monspessulanus*, la *Ruta chalepensis*, il *Poterium Sanguisorba*, il *Picridium vulgare* e simili.

Oltre i chiusi ci si presenta una scena le cui infinite variazioni dipendenti dall'inclinazione, dall'esposizione, dai mille accidenti del suolo, non è ovvio il ritrarre. Dalle balze franate e scoscese gremite dei cespugli dello *Spartium juuceum*, del *Cytisus spinosus*, del *Cistus salvifolius*, dell'*Erica arborea*, del Mirto, della *Coriaria*, del Lentisco, della *Lonicera implexa* ed *etrusca*; fra cui lussureggiano l'*Helianthemum Fumana*, l'*Ononis minutissima*, il *Thymus vulgaris*, l'*Helichrysum angustifolium*, gli *Andropogon hirtus*, *pubescens*, *distachyos*, l'*Asparagus acutifolius*, quasi sempre avvinchiato dagli spinosi sarmenti della *Smilace aspra*; o allo spianarsi d'un burrone, o al volgere di una china, sottentrano con subito passaggio la selva od il pascolo, o si confondono il pascolo, le macchie, le selve.

Nelle selve troviamo promiscuamente, o in gruppi separati, il *Quercus Ilex* e *pubescens*, l'*Acer campestre*, l'*Erica arborea*, l'*Arbutus Uedo*, l'*Ostrya vulgaris*, il *Fraxinus Ornus*, i quali presentansi molte volte sperperati per le brulle pendici, quasi a conferma della popolare credenza, essere state le circostanti giogaie rivestite una volta di densissima selva.

Ne' pascoli, e all'aprico in ispecie, riboccano l'*Anemone stellata*, la *Dautonia provincialis*, il *Trifolium montanum*, il *rubens*, l'*ochroleucum*, la *Catananche coerulea*, la *Polygala rosea*, la *Carex glauca* e *gynobasis* ec., le molte *Orehidée* dai fiori sfoggiati e bizzarri, la notissima *Ophrys Bertolonii*, l'*aranifera*, l'*Arachnites*, l'*Orchis Morio*, *pyramidalis*, *provincialis*, *brevicornu*, la *Serapias lingua* e la *neglecta*, laddove il *Linodorum abortivum*, l'*Anemone trifolia*, l'*Epipactis ovata* e *microphylla*, l'*Orchis bifolia*, la *Convallaria Polygonatum*, ec., riparansi al rezzo delle arbori frondose poco fa mentovate.

Benchè nelle nostre colline siano rare le fonti profuse di molte acque, nondimeno in margine dei rigagnoli, o ne' concavi piani che raccolgono le piogge, frequenti nelle miti invernate, non è raro il vedere lo *Schoenus nigricans*, lo *Scirpus Ilotoschoenus*, la *Phragmites communis*, la *Carex vulpina*, e l'*Juncus acutus*, che invano cercheremmo alla spiaggia a cui in altre località si direbbe obbligato.

Partitamente citerò, nelle nostre adiacenze, quai giardiui risplendenti per rare e venustissime specie, gli erbosi elivi soggetti alle mura del lato occidentale della città, che assortite in brev'area raccolgono l'*Iris juvea* e *Sisyrinchium*, la *Romulea Bulbocodium*, l'*Allium Chamaemoly*, e il *pendulum*, la *Tulipa Clusiana*, il *Narcissus intermedius*, l'*Iris tuberosa*, la *Scilla peruviana*; i colli di Marassi e Montaldo, questi per l'*Ophrys funerea*, la *Phalaris truncata*, l'*Aceras antropophora*, quelli per l'*Ophrys lutea* e l'*apifera* e la ritrosa e rarissima *Iris tritoba*.

Poggiando infine alle maggiori alture qua e là ci si affacciano le orme prime della Flora montana; l'*Antennaria dioica*, l'*Arnica*, l'*Alchemilla*, la *Centaurea montana*, le *Dentarie*, e seco loro la *Gentiana campestris* e l'*aecaulis*, il *Veratrum album*, l'*Iris graminea*, l'*Orchis globosa*, massime al declinare degli alti piani verso l'opposto pendio. Pel quale scendendo di balza in balza alle valli soggette, troviamo una scena di più svariati colori, sebbene le masse che ne disegnano il fondo, fuor gli ulivi e le specie che gli sono compagne, siano in monte le stesse che osservammo dianzi, ma in proporzioni sensibilmente maggiori. Qui il nitido musco e le umili eriche (*Erica vulgaris*) si contendono le sterili zolle; qui ci rallegra l'inattesa comparsa di alcune pianticelle, cui forse non avremmo domandate che alle selve più opache delle interne montagne. La *Pulmonaria officinalis* e l'*angustifolia*, l'*Erythronium Dens canis*, l'*Orobis variegatus*, la *Luzula nivea* ed *albida*, il *Petasites albus*, l'*Anemone nemorosa*, la *Rosa punila*, l'*Helleborus viridis*, il *Lithospermum purpureo-coeruleum*, che digradando alle falde dello stesso pendio, tuttavolta listate dai ridenti vigneti, si associano alle specie del litorale, le quali serpeggiando pel greto degli indomati torrenti, non solo si spargono per le vicine convalli, ma riescono eziandio a valicare le più alte giogate, e a raggiungere le pianure che dalle radici dell' Apennino si stendono alle rive del Po.

Più volte ho veduto, maravigliando, il *Crithmum maritimum*,

la *Campanula medium*, la *Catananche coerulea*, il *Convolvulus Cantabrica*, il *Linum strictum*, l'*Helichrysum angustifolium*, il *Tenacrium Patium*, spaziare allo sbocco delle valli nel vicino Monferato; e a due mila e più piedi dal livello del mare, su dirupi per poco inaccessi, la *Valerianella Auricula*, la *dentata*, l'*odorata*, la *Bifora radians*, lo *Scleranthus annuus*, il *Galium litigiosum*, il *Trifolium striatum*, l'*Arenaria serpyllifolia*, la *Veronica arvensis*, l'*Herniaria glabra*.

Cotesta è a un di presso l'assisa della flora de' nostri dintorni. Sui monti che ci stanno da tergo si riproduce talora, ma con tinte alquanto sbiadite, qualche tratto del quadro che prospetta la spiaggia, poichè i vigneti e le messi coltivansi frequentemente a ragguardevoli altezze: ma raggiunte le creste che si diramano dalla catena centrale, là d'onde si dominano a un tratto e l'instabile pianura del Mediterraneo e la vallata del Po, e la fuga delle Alpi eternamente nevose, troviamo il carattere della vegetazione totalmente cambiato. Floridi paseoli smaltati di peregrine stirpi montane: la *Gentiana lutea*, la *cruciata*, la *verna*, il *Ranunculus aconitifolius* e *Villarsii*, la *Potentilla Hatterii*, la *Viola heterophylla*, l'*Anthemis montana*, la *Pedicularis comosa*, l'*Adenostyles alpina*, la *Nigritella angustifolia*, ec., poi le macchie in cui primeggiano la *Lonicera alpegena*, il *Rhamnus alpinus*, il *Ribes alpinus*, la *Rosa alpina*, o i vetusti faggeti, le intere selve di cerro, di *Alnus incana* e *viridis*, od assortiti l'*Acer Pseudo platanus*, il *Cytisus alpinus*, il *Carpinus Betulus*, il *Pyrus Aria*, le tiglie.

Nelle due riviere le masse primarie ci presentano in genere le gradazioni or ora discorse, se non che, mano a mano che ci allarghiamo verso i loro confini, il carattere della flora mediterranea, o sia per il concorso di circostanze più favorevoli alla vegetazione, o per le migliori condizioni del suolo, o per le ragioni dal chiariss. Viviani divise, si spiega con più vivi colori.

Seguendo il litorale a ponente, a brev'ora dalla nostra città, veggiamo sulle spiagge arenose, tra i frammenti delle foglie e dei rizomi delle *Zostere*, e tra l'alga che il fiotto irato svelle dagli arenosi fondi, l'*Eryngium maritimum*, l'*Echinophora spinosa*, la *Silene nicaeensis*, il *Triticum farctum*, il *Convolvulus Solanella*, l'*Euphorbia Paralias*, la *Festuca uniglumis*, e più oltre la *Silene sericea*, il *Corynephorus articulatus*, il *Pancreatum maritimum*, il

Chenopodium maritimum, la *Statice Limonium*, la *Salicornia herbacea*, l'*Otanthus maritimus*, ec., la *Paronychia argentea*, di cui qualche cespo col *Trifolium Cherleri* e la *Molinia serotina*, già apparisce nelle esposizioni più apriche dei colli di Sestri.

Nei campi oleiferi e nei vigneti, molte sorta di *Medicago*, l'*Helix*, la *pentagela*, la *scutellata*, ec., l'*Andryala sinuata*, e superato il capo di Noli e nel lungo tratto da Finale al Varo, qua e là la *Silene fuscata* e *corymbifera*, il *Convolvulus evolvuloides*, il *pentapetaloides* e il *pseudotricolor*, l'*Astragalus pentaglottis*, il *Centranthus Calcitrapa*, la *Medicago circinnata*, l'*Ononis Cherleri*, il *Tordylium apulum* e cent'altre interessantissime specie. Nè minore varietà ci presentano i pascoli, le aride fratte, e le rupi scoscese che a brevi intervalli prorompono dal lido, quasi a modo di enormi baluardi torreggianti sul mare. A partire dalla località sopra citata, spesseggiano il *Pinus halepensis* e il *maritima*, il *Carrubo*, i *Cistus*, gli *Helianthemum*, tra cui copiosissimi il *glutinosum* e l'*alpestre*, la *Daphne Gnidium*, l'*Aphyllanthes monspeliensis*, l'*Anthyllis barba Jovis*, il *Teucrium flavum*, il *Polium*, la *Lavatera maritima*, l'*Anagyris foetida*, l'*Euphorbia dendroides*, la *Coris monspeliensis*, la *Statice pubescens*; mentre in riva alle fiumare e nelle nggiose vallée giganteggiano il *Dorycnium rectum*, il *Vitex Agnus castus*, ed oltre la Capra Zoppa il *Nerium Oleander*; dal colore sfoggiato degli innumerevoli suoi fiori, vuolsi sia derivato il nome di *Campo rosso* a un paesetto poco sopra S. Remo.

Distinguonsi nel medesimo litorale per rare e bellissime specie il promontorio e le adiacenze di Noli, in cui hanno sede il *Convolvulus sabatius*, l'*Helianthemum semiglabrum*, la *Campanula floribunda* e *sabatia*, la *Passerina hirsuta*, l'*Artemisia arborescens*; la Capra Zoppa pel *Teucrium fruticans* e l'*Isatis canescens*, l'isoletta di Gallinara per la *Ferula communis* e la *Scilla maritima*; la Bordighiera pe' suoi adottivi e maestosi palmizi (*Phoenix dactylifera*); Ventimiglia per la *Moricandia arvensis*; Mentone per la *Koeleria macilenta*; Villafranca, le balze rosse, i contorni di Nizza pel *Cneorum tricoccum*, la *Camphorosma monspeliaca*, il *Plagiurus virgatus*, il *Quercus coccifera*, la *Velezia*, la *Bafonia*, l'*Jasminum fruticans*, il *Chamaerops humilis*¹.

¹ In genere è appunto sui promontorii dove spiccano maggiormente le forme della

Meno doviziosa di forme è la Flora della riviera a levante, nè lo scarso numero di specie che le sono esclusive, l'*Euphorbia biumbellata*, l'*Ampelodesmos tenax*, la *Genista Lobelii*, la *Coronilla cretica*, l'*Hedysarum coronarium*, la *Daphne glandulosa*, il *Cistus eriocephalus* ec., basta a equilibrare le moltissime dell'opposta riviera, la *Coris*, l'*Aphyllanthes*, il *Teucrium fraticans*, la *Campanula sabatia* ec. ec. che qui non allignano.

Scarseggiano nel nostro territorio le paludi, cionnonostante la Flora ligustica può gareggiare colla subalpina, se non pel numero, per il pregio delle sue piante palustri. Infatti ne' luoghi inondati e negli stagni delle grandi spianate alle foci dell'Entella, della Magra, del Varo, dei dintorni d'Albenga, nei paduli montani, abbiamo eletta schiera di Ciperacee; lo *Scirpus pungens* e il *litoralis*, il *Cyperus olivaris*, il *Monti*, il *difformis*, la *Carex extensa*, *divisa*, *marima*, *provincialis*, il *Cladium germanicum*, i *Scirpus*, le *Heleocharis*, gli *Eriophorum*, l'*Juncus maritimus*, la *Nymphaea*, l'*Hydrocharis*, il *Butomus*, la *Menganthus* ec., i molti *Potamogeton* tra cui il *plantagineus*, l'*oblongus*, il *pectinatus* ¹.

Finalmente se dagli estremi confini delle due riviere, lasciate a tergo le spiagge ed i poggi oleiferi, quindi pei colli del contado di Nizza, famosi per l'*Iberis ciliata* e *linifolia*, per l'*Onobrychis saxatilis*, la *Ballota spinosa*, quinci pei monti della Spezia pel Gottero, il Montenero ed il Penice, raggiungiamo di nuovo le creste della catena centrale, per ricondurrei via via fino al punto d'onde siamo partiti, e sugli altissimi gioghi delle Alpi marittime, e per poco sugli Apennini confinanti allo Stato Parmense, ci eleviamo al livello delle nevi perpetue. La *Dryas octopetala*, l'*Astragalus aristatus*, il *Senecio parviflorus*, il *Salix reticulata*, il *serpyllifolia*, la *Gentiana nivalis*, la *Vitaliana primulaeflora*, la *Cherleria sedoides*, la *Petrocallis pyrenaica*, l'*Androsace carnea* e l'*obtusifolia*, il *Ranunculus alpestris*, *Seguierii*, *glacialis*, *pyrenaicus*, le molte Sassifraglie, abbondano nell'Alpi marittime: ma nello stesso tempo la *Potentilla valderia*, il *Lanium pedemontanum*, la *Saxifraga pe-*

Flora meridionale, perchè a parità di condizioni telluriche e di altezza si trovano in posizione più avvantaggiata di qualsiasi altro tratto del litorale.

¹ Ad ognuno è noto che la Flora palustre della Valle di Po si è arricchita di moltissime specie coll' introduzione del riso. La *Leersia*, la *Bidens cernua*, l'*Ammannia*, il *Cyperus difformis* sarebbero di questo numero.

demontana, l'*Iberis nana*, l'*Helianthemum lomatium*, la *Silene cordifolia* e *Campanula*, l'*Achillea herba rota*, l'*Avena fallax*, l'*Arenaria tetragyna* e *striata* ec. ec. forme tutte che particolarmente contrassegnano quest'ultimo tratto della catena delle Alpi fino al punto in cui si congiunge al minore Apennino. I Larici, gli Abeti, il *Pinus Cembra*, il *sylvestris*, l'*uncinata*, frequenti per l'alte convali completano il quadro.

L'Apennino esso pure assume le divise della vegetazione alpina, ma indecise ne sono le forme, e in qualche tratti accenna delle relazioni colla Flora delle vicine Alpi Apuane, come ne fanno fede la *Stellaria Saxifraga* e la *Daphne glandulosa*, il *Doronicum Columnae*, la *Robertia taraxacoides*, il *Senecio laciniatus*, il *Crocus medius*, la *Festuca apennina*, la *Cardamine Chelidonia*, l'*Astragalus syriacus*, che a mia notizia non furono ancora vedute nell'Alpi marittime.

Considerando nel suo insieme la gran tela che abbiamo sfiorato di volo in questa breve rassegna, si potrebbe ripartire in più zone secondo i limiti onde sembranmi circoscritte le masse che in essa prevalgono. Le spiagge o la regione riserbata alle piante marittime; la zona degli ulivi, dell'*Arbutus Unedo*, delle *Phillyrea*, del *Quercus Ilex*, della *Ceratonia*, che descrive una linea che nel suo andamento flessuoso or discende fino all'estremo margine del lido, ora s'eleva ben oltre i mille piedi d'altezza; la zona superiore agli oliveti occupata per lo più dai pascoli, dalle macchie, dai querceti, dai castagneti ec.; il campo della vegetazione montana dal limite inferiore dei Faggi fino alle creste dell'Apennino; infine nei più alti Apennini del lato orientale, e nelle Alpi marittime principalmente, oltre il limite dell'*Juniperus nana*, col *Pinus uncinata* e il *Cembra*, la *Petrocallis pyreutica*, la *Vitaliana*, le *Androsace*, le *Saxifrage* ec. tocchiamo al limite della regione alpina. Ma le esposizioni, la direzione delle correnti atmosferiche, le acque, il suolo, la temperatura ne modificano a ogni passo i caratteri, e molte ed ineccezionabili ne risultano le aberrazioni.

Nell'Apennino, per esempio, su cui le nevi fanno corta dimora, situati a una latitudine più australe delle Alpi, i Faggi che dovrebbero stanziare a un'elevazione maggiore, scendono non di rado ad un livello sensibilmente più basso che nelle Alpi, e già si veggono al nord delle nostre colline, alla condizione di tozzi cespugli, a un'altezza minore di quella a cui giungono gli ulivi sull'opposto pen-

dio ¹. Gli stessi Larici si addimesticano dirci quasi nelle nostre montagne, poichè perfino nei monti Bobbiesi, popolati per l'addietro da vastissime selve di conifere, benchè varissimi, mi ha assicurato il distinto agronomo Sig. Esuberanzo Buelli esserne pur oggi dispersi qua e là sui dirupi delle più opache e recoudite valli ². Egli è quindi a torto che il chiarissimo Schouw nel suo lodatissimo lavoro sulle Conifere d'Italia sostiene che il Larice non si riscontra nell'Apennino ³.

D'altra parte fa sorpresa il vedere come alcune delle piante erhacee, che diffuse per tutti i campi d'Europa, si accomodano a tutte le località, a tutte le esposizioni, a tutte le temperature, nel nostro territorio si trovino circoscritte in area limitatissima. Così il *Papaver Argemone*, il *Dianthus Armeria*, la *Malva Alcea*, l'*Holosteum umbellatum*, l'*Avena myriantha*, il *Delphinium Consolida*, il *Melampyrum arvense*, il *Thlaspi arvense*, il *Lepidium ruderale*, la *Cerithie minor*, l'*Agrostis spica venti*, la *Nigella arvensis*, la *Filago arvensis*, frequenti nelle interne vallate, rare volte si mostrano nei campi del litorale. L'*Erigeron canadense* è meno ritroso, ma al di qua de' monti in generale è surrogato dall'*Eschenbachia ambigua*. Ma forse fin qui non si può plausibilmente far ragione di coteste eccezioni, perocchè non si sono abbastanza studiate nelle loro abitudini le piante campestri, e principalmente in ciò che concerne i rapporti tra la durata delle fasi della loro evoluzione, e il

¹ Soggiungerò di passaggio che alle falde del lato settentrionale del Monte Rosso in Val Intrasca, a pochi metri di elevazione sul livello del lago, si trovano in gran copia il *Rhododendron ferrugineum*, l'*Arbutus Uva Ursi*, il *Vaccinium Vitis Idaea*, la *Primula glutinosa*, la *Saxifraga stellaris*, il *Lycopodium Selago*, mentre sui monti circostanti le stesse specie si tengono ad altezze molte volte maggiori. Riferisco quest'osservazione, stante l'analogia che sotto alcuni rapporti le rive del Lago Maggiore presentano col nostro litorale, e perchè dimostra che le condizioni necessarie allo sviluppo delle piante montane, possono talvolta trovarsi riunite in località che in generale presentano gli estremi opposti.

² Le travi d'abete ond'è contesta la soffitta dell'antica chiesa di S. Colombano di Bobbio provengono verosimilmente dai monti vicini, sebbene al presente non vi si trovino abeti. M'è stato assicurato che in più parti dell'Apennino si scavano anche oggi dei grossi tronchi di Conifere benissimo conservati, che debbono essere stati sepolti in qualche sconvolgimento avvenuto in epoca non ha guari lontana.

³ *Annales des Scienc. naturell. Ser. III. tom. III.* — Né solo ne' monti di Bobbio si trovano i Larici; i Sigg. Marchese Andrea Carrega, e Agostino Chiappucci ne riportarono esemplari dagli Apennini tra Genova e Savona.

modo o dirò meglio le gradazioni con cui si alternano le stagioni nelle singole loro località.

Più capricciose nelle loro abitudini mi sembrano l'*Astragalus Cicer*, il *Cynoglossum officinale*, l'*Eranthis hyemalis*, la *Centaurea alba*, il *Tribulus terrestris*, l'*Artemisia camphorata*, l'*Arabis albida* la quale migrando dalle rupi del lontanissimo Tauro s'è rifugiata nelle gole degli Apennini di Genova.

L'*Artemisia camphorata* dal Monferrato s'interna nell'Apennino fino a raggiungerne la sommità sopra Isola e Ronco, ma non riesce a sorpassarlo se non oltre Savona. La *Centaurea alba* che per lo più le è compagna s'è propagata in tutto il campo della flora subalpina, mentre l'altra dai colli del Veronese e del Bresciano, evitata la Lombardia, valica il Po procedendo obliquamente da levante a sud-ovest. L'*Eranthis hyemalis* che sformatamente infesta le campagne del Vogherese e del Monferrato segue a un di presso lo stesso andamento. L'*Amaranthus prostratus* che frequenta le stesse località del *Chenopodium murale* il quale è comunissimo appiè delle case in tutti i luoghi abitati d'Italia, non vedesi od è rarissimo in Lombardia. Lo *Smyrniolum Olusatrum*, il *Conium maculatum*, il *Chenopodium urbicum*, il *Lepidium ruderate*, ecc. ecc., sotto questo punto di vista, benchè vili e trivialissime specie, sono anch'esse meritevoli di molta attenzione ¹.

Sarebbe pur utile, non solo per la storia parziale di ogni specie, ma cziandio per avere nuovi dati a valutare le influenze che il suolo ed il clima possono esercitare sugli individui di una medesima specie, il raffrontare partitamente le piante della nostra flora a quelle dei paesi vicini. Vedremmo nell'Apennino il *Ranunculus lanuginosus*, che pel letto del Bisagno s'avanza fin presso le porte di Genova, spogliare la sua irsuzie e mentire una specie diversa; il *Villarsii* grandeggiare e accennare un passaggio al *Gouani*; la *Rosa alpina* pararsi dei colori della *rubrifolia*; la *Tamarix africana* allungare i suoi grappoli in modo da simulare la *gallica*; il *Brachypodium distachyum* intisichire nei pascoli erbosi, e trasformarsi per così dire nel *subtile*: il *Dianthus atrorubens* nel *Balbi-*

¹ Non pochi riscontri interessantissimi sulle stazioni di alcune specie nella vallata del Po, furono indicati dal chiarissimo Profess. Moretti in una delle adunanze della Sezione di Botanica alla seconda Riunione degli Scienziati Italiani, ma appena se n'è fatto cenno negli atti.

sii, l'*Arenaria rubra* nella *marginata*, il *Convolvulus sepium* nel *sylvestris*, l'*Orchis mascula* nella *brevicornu*, la *Scrapias longipetala* nella *neglecta*, e via dicendo. Le quali forme di transizione, intorno a cui mi diffonderei volentieri se il consentisse lo spazio di questi cenni, potrebbero per avventura presentare de' risultati di un qualche valore per la fito-geografia.

Nell'elenco che segue ho portato in corsivo le specie comuni alla Flora ligistica e all'insubrica, come dall'elenco del chiarissimo Barone Cesati inserito nelle notizie naturali e civili sulla Lombardia pubblicate in Milano in occasione della sesta Riunione degli Scienziati Italiani. Colle virgolette intendo distinguere le specie cui si può presumere essere state introdotte nel nostro territorio coi cereali e le merci tratte dalle provincie australi del cratere mediterraneo o dall'oriente. Finalmente in calce di ogni famiglia ho riferite le specie che ho trovato indicate dagli autori siccome native della Liguria, ma che mancano tuttavia nella mia raccolta, non che negli erbarii dei Sigg. Dottori Casaretto, Rosellini, Berti, Savignone, dei Sigg. Panizzi, e Rev. Padre De' Negri, dei Sigg. Chiappori e Carrega che io ho potuto consultare quantunque volte ho voluto.

FANEROGAME

CLASSE I. DICOTILEDONI

SOTTOCLASSE I. TALAMIFLORE

FAM. I. RANUNCULACEE.

Clematis erecta Ait.
 — β . *cordifolia* DNtrs.
Vitalba L.
Flammula L.
 — β . *maritima* Badnr.
Atragene alpina L.
Thalictrum aquilegifolium L.
flacum L.
angustifolium Koch.
minus L.
foetidum DC.
Anemone Hepatica L.
Pulsatilla L.
alpina L.
Pavonia α , β DC.
coronaria L.
hortensis L.
narcissiflora L.
nemorosa L.
ranunculoides L. +
trifolia L.
Adonis " *aestivalis*, α , β . Moris.
Ficaria ranunculoides Moench.
Ranunculus aquatilis, α , β , γ . DC.
glacialis L.
alpestris L.
Squicrii Vill.
aconitifolius L.
lucens Bell.
pyrenaeus α , β . DC.
gramineus L. (erb. Viv.).
Flammula L.

Parte II.

Ranunculus ophioglossifolius Vill.
auricomus L.
 — β . *laciniatus* Crs.
Villarsii DC.
 — β . *elaior* DNtrs.
Gouan Willd.
acris L.
lasugiosus apemoinus DNtrs.
velutius parviflorus DNtrs.
nemorosus DC.
 — β . *giganteus* DNtrs.
repens L.
bulbosus L.
 — β . *luxurians* DNtrs.
 — γ . *nambicus* DNtrs.
Philonotis Retz.
parviflorus L.
 " *muricatus* L.
 " *arcensis* L.
monspeliacus L. (erb. Viv.).
chaerophyllos, α , β . Moris.
Caltha palustris L.
Trollius europaeus L.
Eranthis hyemalis Salisb.
Helleborus niger L.
viridis L.
 — β . *domeitorum*.
foetidus L.
Nigella " *damascena* L.
 " *arcensis* L.
Aquilegia vulgaris L.
pyrenaica DC.
Delphinium " *Ajacia* L.
 " *Consolida* L.

2

Delphinium « *gratile* *Moris.*
Aconitum *Lycoctonum* *L.*
 intermedium *DC.*
 rostratum *Jacquiniatum* *Sr.*
 Napellus *β.* *Bertol.*
Paronia peregrina *Mill.*
Actaea spicata *L.*

Fumaria { *capreolata* *L.*
 { « *agraria* *Lag.*
 { *officinalis* *L.*
 { *asrata* *All.*
 { *parviflora albiflora* *Moris.*
 { *leucantha* *Viv.*

Ceratnerphalus falcatus (*Balb. Misc. alt.*).
Gariella Nigellastrum (*All. Fl. ped.*).
Delphinium peregrinum (*All. Fl. ped. et*
 Bertol. Fl. ital.).
Delphinium Staphysagria (*All. Fl. ped.*).

FAM. II. BERBERIDACE.

Berberis vulgaris *L.* (*erb. Chiapp.*).

Eguedium alpinum (*All. Fl. ped.*).

FAM. III. NINFEACE.

Nymphaea alba *L.*
Nuphar luteum *Sol.*

FAM. IIII. PAPAVERACE.

Papaver « *somniferum* *L.*
 « *Rhœas* *L.*
 « *dubium* *α.*, *β.* *Moris.*
 « *hybridum* *L.*
 « *Argemone* *L.*
Glaucium flavum *Crantz.*
Chelidonium majus *L.*
Hypericum procumbens *L.*

Papaver alpinum (*All. Fl. ped.*).
Glaucium phoeniceum (*All. Fl. ped.*).

FAM. V. FUMARIACE.

Corydalis tuberosa *DC.*
Fumaria « *major* *Badar.*

Corydalis fuharea (*Fl. tirin.*).
Corydalis lutea (*Reich. Fl. exens.*).
Corydalis capnoides (*All. Fl. ped.*).

FAM. VI. CRUCIFERE.

Matthiola incana *R. Br.*
 sinnata *R. Br.*
Cheiranthus Cheiri *L.*
Nasturtium officinale *R. Br.*
 sylvestre *R. Br.*
 pyrenaicum *R. Br.*
Barbarea vulgaris *R. Br.*
 « *arcuata* *Reichb.*
 præcox *R. Br.*
Turritis glabra *L.*
Arabis brassiciformis *Waltt.*
 alpina *L.*
 « *albida* *Steud.*
 sagittata *DC.*
 hirsuta *Scop.*
 maralis *Bertol.*
 Turrita *L.*
Cardamine asarifolia *L.*
 resedifolia *L.*
 impatiens *L.*
 hinayla *L.*
 amara *L.*
 pratensis *L.*
 thalictroides *All.*
 Chelidonia *L.*
Deutaria pinnata *Lamck.*
 digitata *Lamck.*
 bulbifera *L.*
Hesperis laciniata *All.*
Malcolmia « *africana* *R. Br.*
 « *parviflora* *DC.*
Sisymbrium officinale *Scop.*

Sisymbrium polygeratum L.

Iris L.

" *Columbae* γ. *villosissimum*
DC.

— δ. { *ligusticum* D.Ntrs.
 pannonicum Badar.

austriacum Jacqu.

Sophia L.

" *Thalianum* Gaud.

Hugueninia tanacetifolia Reichb.

Alliaria officinalis Andrz.

Erysimum " *perfoliatum* Crantz.

canescens Roth.

lanceolatum R. Br.

strictum Koch.

Brassica *Eruca* L.

balearica Badar.

Moricandia arvensis DC.

Sinapis " *alba* L.

" *dissecta* Lag.

nigra L.

" *arvensis* L.

" *ineana* DC.

Diplotaxis " *erucoides* DC.

tenuifolia DC.

muralis DC.

Bortheroa " *incana* α. DC.

Koniga maritima R. Br.

halimifolia Reichb.

Myssum Bertolonii Desv.

montanum L.

alpestre L.

" *calycinum* L.

" *campestre* L.

" *Viviani* D.Ntrs. (!)

Lunaria rediviva L.

Petrorallia pyrenaica R. Br.

Clypeola Jonthaspi L.

Draba *muralis* L.

verna L.

frigida Saut.

aizoides L.

Cochlearia saxatilis L.

Camellia " *nativa* α., β. DC.

Thlaspi perfoliatum L.

alpestre L.

Thlaspi arvense L.

rotundifolium Gaud.

Iberis umbellata L.

— β. *latifolia* D.Ntrs.

— γ. *Boselliniana* D.Ntrs.

linifolia α. DC.

ciliata All.

" *pinnata* DC.

Garrexiana All.

nana All.

Biscutella saxatilis Schlecht.

laevigata L.

— β. *coronopifolia* D.Ntrs.

Lepidium procumbens L.

petraeum L.

alpinum L.

" *salivum* L.

ruderales L.

graminifolium L.

campestre R. Br.

Draba L.

latifolium L.

Capsella Bursa pastoris Moench.

Seubertia Coronopus Poir.

" *didyma* Pers.

Isatis tinctoria L.

Neslia " *paniculata* Desv.

Calepina Corvini Desv.

Bunias " *Eruca* L.

Cakile maritima α., β. DC.

Rapistrum " *rugosum* All.

Raphanus Raphanistrum L.

— β. *longirostris* D.Ntrs.

Matthiola trienspidata (All. Fl. ped.).

Arabia verna (All. Fl. ped. — Bertol.
Luenbr.).

Arabia Allionii DC. (All. auct.).

Hesperis sylvestris (All. Fl. ped.).

Erysimum cheiranthoides (All. Fl. ped.).

Sisymbrium strictissimum (All. Fl. ped.).

Sisymbrium Loeselii (All. Fl. ped.).

Sisymbrium vimineum (All. Fl. ped.).

Lunaria elypesta (All. Fl. ped.).

Cochlearia officinalis (All. Fl. ped.).

Lepidium hirtum (All. Fl. ped.).
Iberis sempervirens (All. Fl. ped.).
Biscutella auriculata (All. Fl. ped.).
Crambe maritima (All. Fl. ped.).

FAM. VII. CAPPARIDEE.

Capparis spinosa x, ♀. Koch.

FAM. VIII. CISTINEE.

Cistus villosus x, ♀. DC.
 albidus L.
 sativifolius L.
 — ♀. *laurifolius* D.Ntr.
 monspeliensis L.
Helianthemum Fumana Mill.
 laevipes Willd.
 glutinosum x, ♀. Moris
 Tuberaria Mill.
 { *guttatum* Mill.
 { *Cistus acuminatus* Vir.
 { *origanifolium glabrescens* D.Ntr.
 { *Serrae* Vie. herb.
 luculentum DC.
 oelandicum x, ♀, γ, ♂. Koch.
 vulgare x, ♀, ♂. Bertol.
 roscum DC.
 { *pitosum* x, ♀. Benth.
 { *pulverulentum* DC.
 semiglabrum Badar.
 ulicifolium Pers.

Cistus crispus (All. Fl. ped.).
Cistus medius (All. Fl. ped.).
Helianthemum croceum (Reichb. Fl. ex-
 uer. Avé Lall. Dcs.).
Helianthemum ledifolium (All. Fl. ped.).

FAM. IX. VIOLARIEE.

Viola palustris L.
 hirta L.
 odorata L.
 canina L.

Viola sylvestris L.
 elatioe Fries.
 biflora L.
 tricolor x. L.
 heterophylla Bertol.
 calcarata L.
 cenisia ♀. Bertol.
 nummularifolia All.

FAM. X. RESERACEE.

Astrorarpus sesamoides DC. et Dub.
Reseda a *suffruticulosa* L.
 tutea L.
 Phyteuma L.
 tufcola L.

FAM. XI. DROSERACEE.

Drosera rotundifolia L.
Parusissia palustris L.

FAM. XII. POLYGALIEE.

Polygala { *rosea* Desf.
 { *nicaeensis* Riss.
 { *ramosa* Schk.
 { *vulgaris* L.
 { *amara* L.
 { *Chamaejasme* L.

Polygala monspeliaca (All. Fl. ped.).

FAM. XIII. FRANKENIACEE.

Frankenia a *pulverulenta* L.

FAM. XIV. SILENEE.

Vaccaria a *parviflora* Moench.
Gypsophila repens L.
Tanica Saxifraga Scop.
Dianthus Caryophyllus L.
 atrorubens All.
 Balbani Ser.

Dianthus Seguieri x. ♀, γ. Koch.

furcatus Loisel.

monospermatanus L.

« *Asmeria* L.

« *prolifer* L.

« *velutinus* Guis.

Saponaria officinalis L.

ocymoides L.

lutea L.

Cucubalus baccifer L.

Silene acaulis L.

inflata L.

Olites L.

Campanula Pers.

« *corymbifera* Bertol.

rupestris L.

quadrifida L.

« *cretica* L.

cordifolia All.

« *fuscata* Link.

« *Armeria* L.

sericea All.

« *hispida* Desf.

« *nocturna* L.

« *brachypetala* R. et T.

{ « *gallica* x. ♀. *Mores*.

{ *quinquevulnera* L.

Nieueensis All.

usana L.

italica Pers.

paradoxa L.

Salzmanni Oul.

« *cerastoides* L.

Lychnis Flos cuculi L.

dioica L.

Flos Jovis L.

« *Githago* Lamck.

Velexia rigida L.

Silene iasperia (All. Fl. ped.).

Lychnis Corbi rosa (All. Fl. ped.).

FAM. XV. ALSINEE.

Bifida tenuifolia L.

Sagina procumbens x. L.

apetala L.

maritima Don.

Spergula glabra Willd.

subulata Sw.

arvensis L.

Arenaria rubra L.

marginata DC.

tricuspidata L.

rostrata DC.

Villarii, Bertol.

cernua L.

recurva All.

— ♀. *puberula* D.Nits.

striata L.

tetraquetra All.

lauculata All.

ciliata L.

grandiflora multiflora Cav.

serpyllifolia L.

transeva L.

Cherleria arduidea L.

Moeblingia mucrona L.

sedifolia Ser.

Holostium umbellatum L.

Stellaria nemorum L.

media Vill.

Saxifraga Bertol.

Holostea L.

graminea L.

Laebrea aquatica S. H. L.

Moenchia erecta Fl. W. H.

mantica Bartl.

Malachium aquaticum Fries.

Cerastium latifolium L.

rugatum L.

{ *viscosum* Bertol.

{ *semidecandrum* L.

brachypetalum Desp.

Dianthus tener (Balb. Addit.).

Saponaria porrigena (Viv. Fragm.).

Silene conoidea (All. Fl. ped.).

Silene noctiflora (All. Fl. ped.).

Silene Sassiana (Bertol. Fl. ital.).

Silene bicolor Thor. (Né Lall. Di-s.).

Cerastium { *arvense* Koch.
 strictum, *linesre*,
 suffruticosum, *repens*, Auct.

Arenaria montana (All. Fl. ped.).

FAM. XVI. MALVACEE.

Malva moschata L.
 Alcea L.
 sylvestris L.
 " *mauritanica* L.
 rotundifolia L.
 parviflora L.
 nicaeensis Att.

Lavatera " *arborescens* L.
 maritima Gouan.
 Olbia L.
 " *cretica* L.
 " *punctata* Att.
 " *trimestris* L.

Aithya *officinalis* L.
 cannabinum L.
 " *hirsuta* L.

Aithya rosea (All. Fl. ped.).

FAM. XVII. LINEE.

Linum usitatissimum L.
 angustifolium Huds.
 alpinum DC.
 tenuifolium L.
 narbonne L.
 viscosum L.
 " *gallicum* L.
 " *corymbosum* Reichb.
 " *strictum* L.
 maritimum L.
 campanulatum L.
 catharticum L.
 Radiola linoides Gm.

FAM. XVIII. IPERURIEE.

Androsacmon officinale Att.
Hypocicum perforatum L.
 humifusum L.
 tetraplerum Fries.
 montanum L.
 Richerii Vill.
 ommularium L.
 hirsutum L.
 Coris L.

FAM. XIX. TIGLIACEE.

Tilia mollis vulgaris Spach.
 intermedia DC.
 microphylla Vent.

FAM. XX. ACERISKE.

Acer campestre L.
 Pseudoplatanus L.
 Opalus Vill.

FAM. XXI. AMPELIDEE.

Vitis vinifera L.

FAM. XXII. GERANIACEE.

Geranium rotundifolium L.
 molle L.
 lucidum L.
 pyrenaicum L.
 nodosum L.
 sylvaticum L.
 macrorrhizon L.
 anguineum L.
 dissectum L.
 columbinum L.
 " *tuberosum* L.
 Robertianum L.
Erodium " *Botrys* Berol.
 " *ciconium* Willd.
 malacoides Willd.
 moschatum Herit.

Erodium * *romaneum* Willd.
cicutarium Willd.

FAM. XXV. ZIGOFILLAE.

Tribulus terrestris L.

Erodium *litoreum* (Badr. Pl. lig. occid.)

FAM. XXVI. RUTACEAE.

Erodium *maritimum* (All. Fl. ped.)

Dictamnus *Fraziarella* Lamck.

Ruta *chalepensis* α; β. *Moris*.

FAM. XXIII. BALSAMINAE.

Impatiens *Noli tangere* L.

Peganum *Harmala* (All. Fl. ped.).

FAM. XXIV. ONSALIDEE.

FAM. XXVII. CORIARIEAE.

Oxalis *Acetosella* L.

Coriaria *myrtifolia* L.

corniculata L.

SOTTOCLASSE II. CALCIFLORE

FAM. XXVIII. CRUSTRINEAE.

FAM. XXXI. LEGUMINOSAE.

Eouymus *europaeus* L.

Anagyris *foetida* L.

latifolius Scop.

Flex *europaeus* L.

FAM. XXIX. RAMNOSIDEE

— β. *ligusticus* D.Ntrs.

Palinurus *aculeatus* Lamck.

Spartium *juncum* L.

Rhamnus *Alaternus* L.

Sarothamnus *scoparius* W. et G.

alpinus L.

Calycotome *spinosa* Link.

pumilus L.

Genista *caducua* L.

antharticus L.

radiata Scop.

— β. *lanceifolius* D.Ntrs.

Lobelia DC.

Frangula L.

hispanica L.

infectorius L.

germanica L.

cinerea DC.

serotiosa Viv.

ovata W. et K.

sagittalis L.

pilosa L.

Rhamnus *lycioidea* (All. Fl. ped.).

Argyrobolium *Linnaeanum* Wulp.

Zizyphus *vulgaris* (Badr. Pl. lig. occid.).

Cytisus *Laburnum* L.

FAM. XXX. TEBERINTACEAE.

alpinus Mill.

Pistacia *Terebinthus* L.

hirsutus L.

Lentiscus L.

triflorus Herit.

Rhus *Cotinus* L.

pumilus D.Ntrs. (?)

Coriaria L.

sensitifolius L.

Cucurum *tricoceum* L.

— β. fol. omni. petiolatis.

† C. *nigricans* Badr.

- Lupinus* = *angustifolius* L.
 = *albus* L.
- Ononis* *Natrix* Bous.
 striata Gouan.
 = *Cherleri* Desf.
Aircina Jacq.
 = *viscosa breviflora* Moris.
Columnae All.
minutissima L.
arvensis L.
- Anthyllis* *Vulneraria* L.
 = *tetraphylla* L.
montana L.
Barba Jovis L.
- Medicago* *Lupulina* L.
 = *circumdata* L.
 = *orbicularis* L.
 = *scutellata* All.
 = *sativa* L.
falcata L.
 = *glomerata* Balb.
 = *Helix* Willd.
 = *litoralis* α. Moris.
tribuloides α. Moris.
Gerardi W. et K.
marina L.
 = *tuberculata* Willd.
 { = *denticulata* β., γ. Moris.
 † = *pentacycla* DC.
 = *præcox* DC.
maculata Willd.
minima Willd.
- Trigonella* = *Foenum graecum* L.
 = *prostrata* DC.
monspeliaca L.
- Melilotus* *italica* Camer.
officinalis Willd.
neapolitana Ten.
leucantha Koch.
Petitpierreana Koch.
 = *sulesta* Moris.
 = β. *compacta* Moris.
 = *indica* All.
- Trifolium* *pratense* L.
medium L.
alpestre L.
- Trifolium* *rubens* L.
ochroleucum L.
pannonicum L.
 { *incarnatum* α., β. Ser.
 { *Molinerii* Balb.
stellatum L.
 = *angustifolium* L.
lappaceum L.
 = *Cherleri* L.
 = *hirtum* All.
 = *ligusticum* Balb.
arvense L.
scabrum L.
striatum L.
subterraneum L.
fragiferum L.
resupinatum L.
tomentosum L.
alpinum L.
 { *montanum* L.
 { *Balbisii* Ser.
glomeratum L.
Boreoi Sac.
suffocatum L.
repens L.
caespitosum Regu.
nigrescens Vie.
elegans Savi.
badium Schreb.
agrarium L.
procumbens L.
patens Schreb.
filiforme L.
- Isorhynchium* *suffruticosum* Vill.
herbaceum Vill.
- Boujeaula* *recta* Reichb.
hirsuta Reichb.
- Loma* *creticus* L.
eytioides All.
angustissimus L.
corniculatus L.
 — β. *tenuifolius* Ser.
 — γ. *litoreus* D.Ntre
neolithopodioides L.
edulis L.
- Tetragonolobus* *siliquosus* Roth.

Tetragonolobus purpureus Moench.

Psoralea bituminosa x., §. *Moris*

Galega officinalis L.

Colutea arborescens L.

Phaca alpina Jacq.

Oxytropis montana DC.

— *campestris* DC.

Astragalus glycyphyllos L.

Cicer L.

— §. *luxurians* D'Ntrs.

monspessulanus L.

Leontious Jacq.

purpureus Lamck.

— *pentaglottis* L.

— *Sesameus* L.

— *hamosus* L.

depressus L.

syriacus Ten.

aristatus Hérit.

Biserrula — *Polecinius* L.

Scorpiurus subvillosa L.

Scenigerica Coronilla DC.

Coronilla scorpioides Koch.

curia L.

— *cretica* L.

Emerus L.

— *minima* DC.

glauca L.

stipularis Lamck.

Ornithopus perpusillus L.

— *ebracteatus* L.

— *compressus* L.

Hippocrepis comosa L.

{ — *noisiliquosa* L.

{ — *biflora* Spr.

{ — *ciliata* Willd.

Hedysarum coronarium L.

— *capitatum* Desf.

Oxytrichus sativa Lamck.

saxatilis All.

Caput galli Lamck.

Vicia — *tetrasperma* Loisl.

— *gracilis* Loisl.

repens L.

castrubica L.

onobrychioides L.

Vicia — *atropurpurea* Desf.

— *Pseudoeracca* Bertol.

tenuifolia Roth.

Cruca L.

— §. { *villosa* Bud.

{ *Gerardi* DC.

bithynica L.

— *pannonica* Jacq.

narbonensis L.

— *sativa* L.

— γ. *argentalis* Ser.

— δ. *angustifolia* Ser.

— *peregrina* L.

— *lathyroides* L.

— *tutea* L.

— §. *hirta* Moris.

— *hybrida* L.

Ervum — *Lens* L.

— *hirsutum* L.

— §. *monstrosum* D'Ntrs.

— *parviflorum* Bertol.

Psium arvense L.

Lathyrus — *Aphaca* L.

inconspicuus L.

setifolius L.

— *Cicera* L.

— *sativus* L.

hirsutus L.

angulatus L.

— *annuus* L.

pratensis L.

tuberosus L.

ensifolius Badur.

latifolius L.

tenuifolius Desf.

— *Ochrus* DC.

Orobis canescens L. f.

vernus L.

variegatus Ten.

tuberosus x., §., γ. Bertol.

niger L.

tuteus L.

Cercis Siliquastrum L.

Cratonia Siliqua L.

Medicago ciliaris (Tur. Pl. clavar.).
Trigonella corniculata (All. Fl. ped.).
Trigonella polycerata (All. Fl. ped.).
Anthyllis lotoides (Poll. Fl. veron.).
Anthyllis Hermannoiae (All. Fl. ped.).
Ononis fruticosa (Balb. misc. alt.).
Lathyrus angulatus (Badar. Pl. lig. occid.)

FAM. XXXII. AMIGDALEE.

Prunus Mahaleb L.
Arenum L.
 " *domestica* L.
spinosa L.

Prunus insititia (Bertol. Fl. ital.).
Prunus Armeniaca (Rad. Pl. lig. occid.).

FAM. XXXIII. ROSACEE.

Spiraea salicifolia L.
Ulmaria decumbens Ser.
Aruncus L.
Filipendula L.
Dryas octopetala L.
Geum urbanum L.
 " *ricale* L.
 " *montanum* L.

Rubus increscens Bertol.
tomentosus L.
fruticosus L.
 — *β. latifolia* D.Ntrs.
Idaeus L.
corylifolius Sm.
glandulosus Bell.
caesius L.
saxatilis L.

Fragaria Vesca L.
collina Ehrh.

Potentilla micrantha Ram.
caulescens petiolulosa Ser.
Closina Murr.
Valderia All.
rupetris L.
grandiflora All.

Potentilla reptans L.

Tormentilla Nestl.
cerna L.
 — *β. hirsuta* Bertol.
 — *γ. compacta* D.Ntrs.
 — *δ. maxima* D.Ntrs.
aurea L.
alpestris Hall. f.
inclinata Vill.
argentea L.
 — *β. minor* D.Ntrs.
recta L.
hirta L.

Sibbaldia procumbens L.
Agrimonia Eupatoria L.
Arcmonia agrimonoides Neck.

Rosa arvensis Hudr.
villosa Loisel.
rubiginosa L.
canina L.
alpina L.
 — *β.* { *apennina* D.Ntrs.
 rubrifolia Fl. ticin.
pimpinellifolia L.
β. inermis Ser.
pumila DC.
sempervirens L.

FAM. XXXIV. SANGUISORBEAE.

Sanguisorba officinalis L.
 { *minor* Scop.
 Pot. glaucescens Reichb.
Alchemilla vulgaris L.
 — *β.* { *subsericea* Koch.
 montana W.
arvensis Scop.
alpina L.
pentaphylla L.

FAM. XXXV. POMACEE.

Crataegus pyracantha L.
Azorelus L.
Oxyacantha monostyla DC.
Cotoneaster vulgaris Link.

Amelanchier vulgaris Pers.

Pyrus communis L.

Malus L.

Aucuparia Gaertn.

Sorbus Gaertn.

terminalis L.

Aira Ehrh.

Chamaecyparissus DC.

Cydonia vulgaris Pers.

Mespilus germanica L.

Crataegus florentina (Bertol. Fl. ital.).

FAM. XXXVI. GRANATEAE.

Punica = *Granatum* L.

FAM. XXXVII. ONAGRARIAE.

Epilobium angustifolium L.

angustissimum Willd.

hirsutum L.

parviflorum Schreb.

montanum L.

— *β. lanceolatum* Moris.

palustre L.

virgatum Fries.

tetragonum L.

roseum Schreb.

origanifolium Lamck.

Oenothera biennis L.

Isardina palustris L.

Circaea lutetiana L.

alpina L.

FAM. XXXVIII. ALORAGEN.

Myriophyllum spicatum L.

verticillatum L.

FAM. XXXIX. CALLITRICHEAE.

Callitriche verna Bertol.

amblyanthus Bertol.

FAM. XL. LITRABACE.

Lithrum hyssopifolia L.

{ *Gracillari* Ten.

{ *thymifolia* All.

Salicaria L.

FAM. XLI. TAMARISCINAE.

Tamarix gallica L.

africana ligustica D'Nits.

Myricaria germanica Desv.

FAM. XLII. MISTACE.

Myrtus communis L.

FAM. XLIII. CUCURBITACE.

Echallium officinarum Rich.

Bryonia dioica L.

FAM. XLIV. PORTULACAE.

Portulaca oleracea L.

Montia rivularis Gm.

FAM. XLV. PARNONCHILE.

Corrigiola litoralis L. (erb. Viv.).

Herniaria glabra L.

hirsuta L.

Paronychia argentea DC.

arabica DC. (erb. O. B. Tur.).

= *echinata* Lamck.

nives DC.

serpyllifolia DC.

Polycarpon { *tetraphyllum* L.

{ *Labaya polycarpoides* Budur.

alsinifolium DC.

FAM. XLVI. SCLERANTHE.

Scleranthus = *annuus* L.

perennis L.

FAM. XLVII. CRASSULACEÆ.

- Tillaea muscosa* L.
Sedum latifolium Bertol.
 Anacampseros L.
 stellatum L.
 galioides All.
 alsinifolium All.
 monregalense Bulb.
 album L.
 dasyphyllum L.
 hirsutum All.
 saxatile All.
 atratum L.
 caespitosum DC.
 rubens DC.
 sexangulare L.
 acre L.
 albescens DC.
 reflexum L.
 { *nicaense* All.
 { *altissimum* Poir.
 anpetalum DC.
 Rhodiola DC.
Sempervivum tectorum L.
 montanum L.
 arachnoidicum L.
Umbilicus pendulinus DC.

Sedum hispanicum (Rad. Pl. lig. occ.).

FAM. XLVIII. CATTLEÆ.

Opuntia vulgaris Mill.

FAM. XLIX. FIGUIDEÆ.

Mesembryanthemum nodiflorum L.

FAM. L. RIBESACEÆ.

Ribes Grosvenaria L.
 alpinum L.
 rubrum L.

FAM. LI. SAXIFRAGACEÆ.

- Saxifraga ligulata* Bell.
 Aizoon Jacq.
 cochlearis Reichb.
 cacua L.
 oppositifolia L.
 refusa Gouan (erb. Viv.).
 aspera L.
 bryoides L.
 aizoides L.
 stellaris L.
 cuneifolia L.
 pedemontana All.
 moschata z. Bertol.
 androsarca L.
 tridactylites L.
 granulata L.
 bulbifera L.
 rotundifolia L.
Chrysosplenium alternifolium L.

Saxifraga florulenta (Morett.).

FAM. LII. UMBELLIFERÆ.

- Sanicula europaea* L.
Eryngium campestre L.
 maritimum L.
Hydrocotyle vulgaris L.
Coriandrum n. *sativum* L.
Bifora n. *radians* M. B.
 n. *testiculata* DC.
Smyrniolum Otosastrum L.
Echinophora spinosa L.
Cachrys laevigata Lamck.
Coum n. *maculatum* L.
Petroselinum n. *hortense* Hoffm.
 segetum Koch.
 — *§. luxurians* D. N. v.
Apium graveolens L.
Helosciadium nodiflorum Koch.
Sium angustifolium L.
Sium Anomum L.
Molupospermum cicutarium DC.

- Trochiscanthes nodiflorus Koch.*
Physospermum aquilegifolium Koch.
Aegopodium Podagraria L.
 — \S . depauperatum *D.Ntrs.*
Meum athamanticum Jacq.
Carum Carvi L.
Bunium Bulbocastanum Fl. it. ex part.
 flexuosum *Wtth.*
Pimpinella = *Anisum L.*
 Tragium Vill.
 Saxifraga L.
 magna L.
 = *peregrina L.*
Trinia vulgaris DC.
Ptychotis heterophylla DC.
Amni = *maius L.*
 — \S . glaucifolium *D.Ntrs.*
Isopleurum = *Gerardi Jacq.*
 = *tenuissimum L.*
 juncum L.
 graminifolium Vahl.
 neglectum Cea.
 ranunculoides = \S . *Dub.*
 = *aristatum Benth.*
 = *Odontites L.*
 = *protractum Link.*
 = *Savignoni D.Ntrs.* (?)
 rotundifolium L.
Ridolfia = *segetum Moriz.*
Astrantia major L.
 minor L.
Foeniculum officinale All.
 piperitum DC.
Crithium maritimum L.
Seseli coloratum Ehrh. (erb. Viv.).
 montanum L.
 tortuosum L.
Athamanta cretensis L.
Cnidium apioides Spr.
Aethusa Cynapium L.
Oenanthe pimpinelloides L.
 — \S . peucedanoides *D.Ntrs.*
 siliifolia M. B.
 Lachenalii Gm.
 globulosa L.
 Phellandrium L. (erb. Viv.).
Brignolia pastinacaeifolia Bertol.
Myrrhis odorata Scop.
Chaerophyllum temulum L.
 { *hirsutum L.*
 bulbosum Fl. ticin.
 Cicunaria Beichb.
 calabricum Guss.
 aureum L.
Anthriscus sylvestris Hoffm.
Scandix = *Pecten Veneris L.*
Tordylium = *maximian L.*
 = *apulum L.*
Kruebera = *leptophylla Hoffm.*
Ferula nodiflora \S . *Eertol.*
 Ferulago L.
Opoponax Chironium Koch.
Pastinaca sativa L.
 latifolia DC.
Herncleum Spkandylum L.
 Pinnaces L.
 flavescens Bess.
Prucedanum officinale L.
 Chabravi Koch.
 venetum Koch.
 Oreoselinum Guss.
 { *Cervaria Guss.*
 Athamant. latifolia Viv.
 imperatoroides Link.
 Osteuthium Koch.
 verticillare Koch.
Angelica sylvestris L.
 montana Schleich.
Laserpitium latifolium L.
 Siler L.
 gallicum L.
Daucus Carota L.
 = *parviflorus DC.*
 gummifer Lamck.
 Gingidium L.
 = *muricatus L.*
 = *pubescens Kuch.*
Orlaya = *grandiflora Hoffm.*
 = *phlytyrpos Koch*
 maritima Koch.
Caucalis = *dauricaides L.*
 = *leptophylla L.*

Turgenia = *latifolia* Hoffm.
Torilis nodosa Gaertn.
infesta Sm.
 — *β. heterophylla* Moris.

Lonicera Xylosteum L.
alpigena L.
nigra L.

FAM. LVII. STELLATE.

Thapsia villosa (All. Fl. ped.).
Bupleurum falcatum (Fl. tirin.).
Bupleurum fruticosum (All. Fl. ped.).
Bupleurum semicompositum (All. Fl. ped.).
Anethum graveolens (All. Fl. ped.).
Athamanta macedonica (All. Aut.).
Athamanta Matthioli (DC. Prodr.).
Sium falcaria (All. Fl. ped.).
Seseli glaucum (All. Fl. ped.).
Pimpinella alpina (Bertol. Fl. it.).
Scandix australis (All. Fl. ped.).
Cherophyllum nodosum (All. Fl. ped.
 et Bertol. Fl. ital.).

FAM. LVIII. ARALIACEE.

Hedera Helix L.

FAM. LIV. CORNIF.

Cornus sanguinea L.
mas L.

FAM. LV. LORANTACEE.

Viscum album L.

FAM. LVI. CAPRIFOLIACEE.

Adoxa Moschatellina L.
Sambucus nigra L.
racemosa L.
Ebulus L.
Viburnum Tinus L.
Lantana L.
Opulus L.
Lonicera Caprifolius L.
Periclymenum L. (erb. Viv.).
etrusca Sav.
implexa Ait.

Sherardia = *arvensis* L.
Asperula Cynanchica L.
hexaphylla All.
 = *arvensis* L.
odorata L.
taurina L.
laevigata L.
Crucianella { *monspeliaca* L.
 latifolia All.
angustifolia L.
Rubia tinctoria L.
peregrina L.
Vaillantia = *marialis* DC.
Callipeltis = *marialis* Moris.
Galium = *saccharatum* All.
 = *tricornis* Willd.
palustre L.
Aparine L.
cruciatum Scop.
vernum Scop.
rotundifolium β. DC.
verum L.
Mollugo L.
crectum Bertol.
sylvaticum L.
parisiense L.
anglicum Huds.
rubrum L.
purpureum L.
maritimum L. (erb. O. B. Tor.).
baldense Spr.

Galium uliginosum (All. Fl. ped.).
Galium boreale (All. Fl. ped.).
Galium pusillum β. Bertol. Fl. ital.
Galium saxatile (All. Fl. ped.).

FAM. LVIII. VALERIANEE.

- Centranthus ruber* DC.
Calcitrapa DuRoi.
Valeriana officinalis L.
Tripteris L.
tuberosa L.
Valerianella = *discoidea* Lust.
 " *hamata* Bast.
 — *§. microrarpa* DNtr.
olitoria Moench.
 " *Auricula* DC.
 — *§. dasyrarpa* Reiche.
 " *criocarpa* Desv.
 " *dentata mixta* Villen.
 " *echinata* DC.
Fedia = *Cornucopiar* L.

- Valeriana angustifolia* (All. Fl. ped.).
Valeriana saxatilis (All. Fl. ped.).
Valeriana celtica (Lob. Adv. All. Fl. ped.).

FAM. LIX. DIPSACEE.

- Dipsacus sylvestris* Mill.
Kanudia arvensis Bertol.
syriatica Bertol.
integrifolia Bertol.
Cephalaria leucantha Schrad.
alpina Schrad.
 " *transylvanica* Schrad.
 " *syriaca* = DC.
Scabiosa graminifolia L.
lucida Vill.
 " *ucranica* L.
maritima L.
 — *§. cornucopiar* Bertol.
pyrenaica All.
holosericea Bertol.
Columbaria Bertol.
Succisa L.
 " *mixta* DNtr. (4)

- Scabiosa stellata* (All. Fl. ped.).

FAM. LX. COMPOSITE.

- Eupatorium cannabinum* L.
Adenostyles leucophylla Reiche.
albifrons Koch.
alpina Bl. et. F.
Homogyne alpina Cass.
Tussilago Farfara L.
Petasites vulgaris Desf.
Liansyris vulgaris DC.
Aster salignus Willd.
Amellus L.
alpinus L.
Tripolium L.
Galatella panchata DC.
Bellidiasirum Micheli Cass.
Bellis annua L.
perennis L.
sylvestris Cyr.
Erigeron alpinum L.
acris L.
 " *canadense* L.
Solidago Virgaurea L.
 — *§. literalis* DC.
 — *γ. Bertiana* DNtr.
Idem = *bullata* L.
 " *tripartita* L.
Buphthalmum spinosum L.
aquaticum L.
salicifolium L.
Iula viscosa L.
Helenium L.
britannica DC.
montana L.
Airta L.
squarrosa Bertol.
 — *§. simplex* DNtr.
salicina L.
Vaillantii Vill.
bifrons L.
 " *graveolens* Desf.
crithmoides L.
Pulicaria vulgaris Gaertn.
dysenterica Gaertn.
odora Reiche.
Gnaphalium squarrosa L.

- Eschenbachia* = *ambigua* *Moriz.*
Phagnalon sordidum *DC.*
 rupestre *DC.*
 saxatile *Cass.*
Micropus = *bombicynus* *Lag.*
Evax pygmaea *Pers.*
Vilago = *arvensis* *L.*
 = *gallica* *L.*
 = *pyramidata* *L.*
 = *germanica* *L.*
 = *minima* *Fries.*
Gnaphalium luteolum *L.*
 sylvaticum *L.*
 uliginosum *L.*
Leontopodium alpinum *Cass.*
Antennaria dioica *Gaertn.*
Helichrysum Stoechas *DC.*
 angustifolium *DC.*
Artemisia arborescens *L.*
 Absinthium *L.*
 camphorata *Vill.*
 campestris *L.*
 vulgaris *L.*
Tanacetum vulgare *L.*
 = *annuum* *L.* (erb. O. B. Tur.).
Plagiis virgatus *DC.*
Diosis caudatissima *Desf.*
Santolina Chamaeeparissus *L.*
Achillea tomentosa *L.*
 Millefolium *L.*
 tanacetifolia *Koch.*
 ligustica *All.*
 nobilis *L.*
 Ageratum *L.*
 Herba rota *All.*
 macrophylla *L.*
Anthemis tinctoria *L.*
 altissima *DC.*
 Triumfetti *All.*
 montana *L.*
 = *arvensis* *L.*
 — β . *litoralis* *D.Nitz.*
 Cotula *L.*
 incrassata *Lois.* (erb. Viv.).
 mixta *L.*
 = *parthenioides* *Bernh.*
Anacyclus radiatus *Loisel.*
 valentinus *L.* (erb. O. B. Tur.).
 = *pedunculatus* *Pers.* (erb. Viv.).
Matricaria Chamomilla *L.*
 inodora *L.*
Chrysanthemum = *segetum* *L.*
 = { *coronarium* *L.*
 Anthemis incisa *Viv.*
Pyrethrum = *Tanacetum* *DC.*
 corymbosum *Willd.*
 Achilleae *DC.*
 alpinum *Willd.*
 — β . *pubescens* *Dub.*
 ceratophylloides *Willd.*
 Parthenium *Ser.*
 = *Myronia Moench.*
Leucanthemum vulgare *Lamck.*
 — β . *coronopifolium* *D.Nitz.*
 montanum *DC.*
Aronium Clusi *Koch.*
 scorpioides *Koch.*
Doronicum austriacum *Jacqu.*
 Cabanacae *Ten.*
 Parlatianches *L.*
Arnica montana *L.*
Senecio aurantiacus *DC.*
 campestris *DC.*
 brachychaetus *DC.*
 { *Balbisianus* *DC.*
 Cineraria longifolia *All.*
 Cineraria *DC.*
 Doronicum *L.*
 Fuchsii *Gm.*
 rupestris *H. et K.*
 crucifolius *Huds.*
 Jacobaea *L.*
 erraticus *Bertol.*
 = *gallicus* *Vill.*
 viscosus *L.*
 vulgaris *L.*
 Persoonii *D.Nitz.* (?)
 parviflorus *All.*
Calendula = *arvensis* *L.*
Echinops Ritro = α , β . *DC.*
 sphaerocephalus *L.*
Cirsium ferox *DC.*

- Cirsium echinatum* DC.
monspessulanum All.
spinossissimum L.
acule All.
 { *tricerphalodes* β. DC.
 rivulare All.
glutinosum Lamck.
palustre Scop.
arvense Scop.
lanceolatum Scop.
criophorum Scop.
 { *bulbosum* DC.
 medium All.
 tuberosum All.
Picnemon = *Acarna* Cass.
Silybum = *mariannum* Gaertn.
Cardus arctioides Willd.
 carlinaefolius Lamck.
 leucographus All.
 tenuiflorus DC.
 nulans L.
 Capdolfii Morett.
 defloratus DC.
Onopordon Acanthium L.
Galactites = *tomentosus* Gaertn.
Lappa tomentosa All.
 minor DC.
Carlina corymbosa L.
 { *vulgaris* L.
 longifolia Vito.
 lanata L.
 acanthifolia All.
 simplex W., et K.
 subcaulis DC.
Atractylla = *cancellata* L.
Stachelina dubia L.
Lesnea conferta DC.
Rhaponticum scariosum Lamck.
 — β *tyratum* DC.
Serratula undicaulis DC.
 tinctoria L.
Cardanellus lanatus Moris.
 monspeliensis All.
Centaurea = *Crupina* L.
 alba L.
 aplolepa Morett.
Centaurea paniculata L.
 Cineraria L.
 Scabiosa L.
 = *collina* L.
 = *Cyanus* L.
 montana L.
 procumbens Benth.
 Jacea caesecens D.Ntra.
 transalpina Schleich.
 nigrescens Willd.
 uniflora L.
 phrygia L.
 anara L.
 = *melitensis* L.
 solistitialis L.
 = *Calcitrapa* L.
 = *Pouzini* DC.
 = *aspera* L.
Xeranthemum { *radiatum* Lamck.
 = *anonum* All.
 = *cylindraceum* S. et Sm.
Sculymus { *hispanicus* L.
 = *maculatus* All.
Lampis communis L.
Rhagadiolus = *stellatus* DC.
Catanauche coerulescens L.
Cichorium Intybus L.
 — β. *divaricatum* DC.
Hysomeris radiata L.
 microcephala Cass.
Hedypasos = *erecta* Koch.
Tulpis altissima Pers.
 umbellata Bertol.
Thrinia hirta Leyss.
 tuberosa DC.
Leontodon Villarsii Loiz. (erb. Viv.).
 pyrenaicus Gouan.
 crispus Vill.
 hastilis L.
 autumnalis L.
Pieris hieracioides L.
 = *Sprengeriama* Lamck.
Helmiathla echinoides Gaertn.
Urospermum = *picroides* Desf.
 Dalechampii Desf.
Geropogon glaber L.

- Tragopogon crocifolius* L.
pratensis L.
porrifolius L.
Scorzonera { *tenuifolia* Schrad.
 austriaca Balb.
plantaginina Schlecht.
humilis L.
 — β . *austriaca* DC.
 { *hispanica* Koch.
 graminifolia All.
hirsuta L.
 " { *calceitrapifolia* Vaht.
 resedifolia Balb.
 " { *laevigata* muricata DC.
 muricata Balb.
 — γ . *ambulata* DC.
Seriola " *aethnensis* L.
Hypochaeris maculata L.
Helvetica Jacq.
radicata L.
glabra minor Dub.
Robertia taraxacoides Loisel.
Taraxacum officinale Koch.
Chondrilla juncea L.
rigens Reichb.
Plucnopus vimineus DC.
ramosissima Reichb.
Prenanthes purpurea L.
Lactuca virosa L.
Scariola L.
saligna L.
perennis L.
muralis DC.
 — β . *sessilifolia* D.Ntra.
Sonchus alpinus L.
maritimus L.
tenerrimus L.
fullax W'altr.
 — β . *decipiens* D.Ntra
ciliatus Lamck.
arvensis L.
Pteranthes nemusculensis Cass.
Picridium vulgare Desf.
Zincitha verrucosa Gaertn.
Barkhausia foetida DC.
setosa DC.
- Barkhausia leontodontoides* Reichb.
taraxacifolia DC.
scariosa Reichb. (erb. Viv.).
albida Cass.
bursifolia Spr.
Crepia polymorpha W'altr.
grandiflora Tausch.
" pulchra L.
lectorum L.
paludosa Moench.
blattarioides Vill.
Aetheorrhiza bulbosa Cass.
Andryala integrifolia L.
Hieracium Pilosella L.
bifurcum MB.
Auricula L.
Nestleri Vill.
pratense Tausch.
pilosellum Vill.
pratense Koch.
staficefolium Vill.
villosum L.
alpinum L.
bifidum Kit.
murorum L.
sylvestre Tausch.
sylvaticum Bertol.
sabaudum L.
amplexicaule L.
prenanthoides Vill.
tomentosum All.
 { *umbellatum* L.
 { *Lactaria* Bertol.
- Baphthalmum maritimum* (All. Fl. ped.).
Anthemis fuscata (DC. Prodr.).
Anthemis maritima (All. Fl. ped.).
Anthemis nobilis (All. Fl. ped.).
Anacyclus pubescens (All. Fl. ped.).
Santolina pinnata (Rehb. Fl. excurs.).
Carpesium cernuum (Tur. Pl. clav.).
Artemisia maritima (Balt. Misc. slt.).
Artemisia gallica (DC. Prodr.).
Artemisia fragrans (Balb. Misc. alt.).
Artemisia coerulescens (All. Fl. ped.).

Micropus supinus (All. Fl. ped.).
Senecio sylvaticus (All. Fl. ped. — Tur.
 Pl. clav.).
Senecio Doria (Tur. Pl. clav.).
Senecio squallidus (All. Auct.).
Cineraria alpina (All. Fl. ped.).
Cirsium canum (All. Fl. ped.).
Cirsium stellatum (All. Fl. ped.).
Cirsium montanum (Balh. Misc. alt.).
Cirsium helenioides (All. Fl. ped.).
Cirsium ochroleucum (All. Fl. ped.).
Cirsium olivaceum (All. Fl. ped.).
Carduus carlinoides (All. Fl. ped.).
Carduus acanthoides (All. Fl. ped.).
Carthamus tinctorius (All. Fl. ped.).
Centaurea sonchifolia (DC. Prodr.).
Catananche lutea (All. Fl. ped.).
Rhagadiolus taraxacoides (All. Fl. ped.).
Aposcis foetida (All. Fl. ped.).
Tolpis barbata (All. Fl. ped.).
Barkhausia ruhra (All. Fl. ped.).
Crepis praemorsa (All. Auct.).
Crepis nicaeensis (Balh. Misc. alt.).
Hieracium lutybaeum (All. Auct.).
Lactuca stricta (Bell. Stirp. DC. Prodr.).
Andryala sinuata (All. Fl. ped.).

FAM. LXI. AMBROSIAEAE.

Xanthium spinosum L.
Strumarium L.
 " *italicum* Morett.

Ambrosia maritima (All. Fl. ped.).

FAM. LXII. CAMPANULACEAE.

Jasione montana L.
Phyteuma Halleri All.
Michellii Bert.
orbicularis L.
scorzonerifolia Vill.
hemisphaerica L.
pauciflora L.
Trachelium " *coccineum* L.

Campanula macrorrhiza Gay.

rotundifolia L.
linifolia Lamck.
sabatia D.Ntr. (*)
persicifolia L.
patula L.
rhomboidalis L.
Rapunculus L.
rapunculoides L.
bononiensis L.
spicata L.
floribunda Viv.
glomerata L.
Trachelium L.
 " *Erinus* L.
 " *dichotoma* L.
barbata L.
Allionii Vill.
Medium L.

Specularia " *Speculum* DC. f.
 " *hybrida* DC. f.
 " *falcata* DC. f.

FAM. LXIII. VACCINIEAE.

Vaccinium Myrtillus L.
uliginosum L.
Vitis Idaea L.

FAM. LXIV. ERICINEAE.

Arbutus Uedo L.
Uva ursi L.
Rhododendron ferrugineum L.
Calluna vulgaris L.
Erica arborea L.
scoparia L.
cistrea L.
multiflora L. (eth. O. B. Tor.).
carnea L.

FAM. LXV. PIROLACEAE.

Pyrola secunda L.
minor L.
uniflora L.

SOTTOCLASSE III. COROLLIFLORE.

FAM. ERENACEE.

Silyba officinale (All. Fl. ped.).

FAM. LXVI. AGRIPOGONACEE.

Ilex Aquifolium L.

FAM. LXVII. OLEACEE.

Olea europaea L.

Phillyrea latifolia L.

medio L.

angustifolia L.

Ligustrum vulgare L.

Fraxinus Ornus L.

excelsior L.

FAM. LXVIII. GELSEMIACEE.

Jasminum n. officinale L.

fruticans L.

FAM. LXIX. ASCLEPIADEE.

Cynanchum Vincetoxicum Pers.

acutum L. (erb. O. B. Tor.).

nigrum Pers. (erb. O. B. Tor.).

Gomphocarpus n. fruticosus R. et S.

Periploca graeca (Bertol. Fl. ital.).

FAM. LXX. APOCINEE.

Nerium Oleander L.

Vinea major L.

acutiflora Bertol.

minor L.

FAM. LXXI. GENZIANEE.

Menyanthes trifoliata L.

Chlora perfoliata L.

Gentiana lutea L.

cruciata L.

asclepiadea L.

Pneumonanthe L.

campestris L.

acaulis L.

— *β. alpina* DNtra.

nivalis L.

verna L.

ciliata L.

Erythraea Centaurium Pers.

pulchella Fréér.

spicata Pers.

lutea R. et S.

FAM. LXXII. CONVULVOLACEE.

Convulvulus arvensis L.

sabatina Vic.

arpium L.

sylvestris Willd.

althaeoides L.

tenuissimus S. et Sm.

n. siculus L.

n. pseudo-tricolor Bertol.

n. evolvuloides Desf.

n. pentapetaloides L.

Cantabrica L.

doryenioides DNtra. (?)

Soldanella L.

Cressa n. cretica L. (erb. O. B. Tor.).

Cuscuta Epithymum L.

Convulvulus Cneorum (All. Fl. ped.).

Convulvulus lineatus (All. Fl. ped.).

FAM. LXXIII. BORRAGINÉE.

- Heliotropium europaeum* L.
 — " *β. delosum* D.Ntrs.
Asperugo procumbens L.
Echinospermum " *Lappula* Lehm.
Cynoglossum officinale L.
 pictum Willd.
Omphalodes verna Moench.
Borago officinalis L.
Anchusa italica Retz.
 officinalis L.
 leptophylla R. et S.
 undulata L.
 Barretieri Bellard.
Lycopsis arvensis L.
 variegata L. (erb. O. B. Tor.).
Symphytum officinale L.
 tuberosum L.
Oenothera " *montanum* Sibth.
 " *areolarium* W. et K.
Cerithæa " *aspera* Willd.
 minor L.
 — *β. colorata* D.Ntrs.
Echium vulgare L.
 " *plantagineum* L.
 " *italicum* L.
 " *calycellum* Vie.
Pulmonaria officinalis L.
 angustifolia *β. Bertol.*
Lithospermum " *arvense* L.
 " *tinctorium* L.
 " *apolon* Vahl.
 purpureo-coeruleum L.
 officinale L.
Myosotis palustris Sm.
 sylvatica Hoffm.
 " *Aspida* Koch.
Eritrichium nanum Schrad. (erb. O. B. Tor.).

Cynoglossum cheirifolium (All. Fl. ped.).

FAM. LXXIV. SOLANACEE.

- Lycium europaeum* L.
Solanum Dulcamara L.
 nigrum L.
 miniatum Bernh.
Physalis Alkekengi L.
Atropa Belladonna L.
Hyoscyamus niger L.
 albus L.
Datura Stramonium L.
 — *β. chalybea* Koch.

FAM. LXXV. VERBASCÉE.

- Verbascum Thapsus* L.
 phlomoides L.
 montanum Schrad.
 stoechasum Willd.
 bicolor Badar.
 Lychnitis L.
 nigrum L.
 Chalcii Vill.
 sinuatum L.
 Blattaria L.
Scrofularia { *Belbisi* Horn.
 betonicifolia All.
 auriculata All.
 squarrosa Ten.
 nodosa L.
 peregrina L.
 vernalis L.
 cunina L.
 ramosissima Loisel.

Scrofularia lucida (All. Fl. ped.).
Scorodonia (All. Fl. ped.).

FAM. LXXVI. ANTIRRHINEE.

- Gratiola officinalis* L.
Digitalis lutea L.
 grandiflora Koch.
Asarion bellidifolium Desf.
Erinus alpinus L.

- Antirrhinum majus* β . *Willd.*
latifolium *Mill.*
Orontium *L.*
- Lisaria* = *triphylla* *Mill.*
alpina *Mill.*
purpurea *Willd.*
Pelisseriana *Mill.*
- Linaria* *origanifolia* *DC.*
 = *chalepensis* *Mill.*
striata *DC.*
supina *Desf.*
 = *simplex* *DC.*
vulgaris *Mill.*
minor *Desf.*
 = *commulata* *Benth.*
 = *Elatine* *Desf.*
 = *spuria* *Mill.*
Cymbalaria *Mill.*
- Veronica* *urticaefolia* *L.*
Anagallis *L.*
 — β . *aomala* *D.Ntrs.*
Beccabunga *L.*
Allionii *Vill.*
aphylla *L.*
 = *triphylla* *L.*
aciniifolia *L.*
saxatilis *L.*
fruticulosa *L.*
spicata *L.*
latifolia *L.*
prostrata *L.*
serpyllifolia *L.*
Chamaedrys *L.*
austriaca *L.*
officinalis *L.*
montana *L.*
arvensis *L.*
 = *Buxbaumi* *Ten.*
didyma *Ten.*
hederifolia *L.*
Cymbalaria *L.*

Digitalis ferroginea (Fl. ticio.).

Antirrhinum hiponetatum (All. Fl. ped.).

FAM. LXXVII. OROBANCHACEE.

- Lathraea Squamaria* *L.*
Orobanchae cruenta *Bertol.*
superba *D.Ntrs.* (*)
gruinosa *Lap.*
Rapum *Thunb.*
Satyris *D.Ntrs.* (*)
caudata *D.Ntrs.* (12)
major *Dub.*
minor *Sutt.*
Hederae *Vauch.*
ramosa *L.*
 — β . *tenella* *D.Ntrs.*

FAM. LXXVIII. RINANTACEE.

- Melampyrum* = *arvense* *L.*
cristatum *L.*
pratense *L.*
nemorosum *L.*
 — β . *angustifolium* *D.Ntrs.*
- Pedicularis comosa* *L.*
tuberosa *L.*
foliosa *L.*
fasciculata *Bell.*
incarnata *Jacqu.*
- Rhinanthus major* *Ehrh.*
minor *Ehrh.*
- Bartsia purpurea* *Dub.*
viscosa *L.*
Trixago, versicolor *Ten.*
alpina *L.*
- Euphrasia viscosa* *L.*
lutea *L.*
serotina *Lamck.*
vena *Bell.*
officinalis *L.*

FAM. LXXIX. LABIATE.

- Lavrodula Stoechas* *L.*
Spica *DC.*
vera, ligustica *D.Ntrs.*
- Mentha* *Pulegium* *L.*
aquatica *Benth.*

- Mentha rotundifolia* L.
sylvestris L.
macrostachya Ten.
Lycopus europaeus L.
Rosmarinus officinalis L.
Salvia clandestina Benth.
pratensis L.
Salvia " *sylvestris* L.
" *viridis* L.
verticillata L.
glutinnosa L.
Sclarea L.
officinalis L.
Origanum vulgare L.
Thymus vulgaris L.
pannonicus All.
Serpyllum L.
— *β. montanus* Benth.
Satureja montana L.
hortensis L.
Hyssopus officinalis L.
Micromeria graeca Benth.
Piperella Benth.
thymoides D.Ntr. (11)
Melissa Acinos Benth.
alpina Benth.
Nepeta L.
Melissa grandiflora L.
Calamintha L.
officinalis L.
Clinopodium Benth.
Prunella hyssopifolia L.
vulgaris Benth.
— *β. laciniata* Benth.
grandiflora Moench.
Scutellaria alpina L.
galericulata L.
Columbae L.
Nepeta Glechoma Benth.
Nepetella Benth.
Cataria L.
Melittis Melissophyllum L.
Lamium amplexicaule L.
purpureum L.
maculatum L.
Lamium { *pedemontanum* Reichb.
{ *Orvala* All.
Galeobdolon Crantz.
Leonurus Cardiaea L.
Galeopsis " *Ladanum* L.
β. canescens Reichb.
versicolor Koch.
Tetralix L.
Sisachys annua L.
maritima L.
recta L.
ambigua Sm.
palustris L.
alpina L.
{ *hirta* L.
{ *divaricata* Viv.
arvensis L.
sylvestica L.
italica Mill.
germanica L.
Hernies All.
densiflora Benth. (erb. Viv.).
Betonica Benth.
Sideritis romana L.
scordinides L.
Marrubium vulgare L.
" *Alysson* L. (erb. Viv.).
Balluta spinosa Link.
nigra L.
Phlomis Lychnitis L. (erb. O. B. Tur.
Teucrium frolicans L.
flavum L.
Polium Benth.
Scorodonia L.
lucidum L.
Chamaedrys L.
scordioloides Schreb.
Botrys L.
montanum L.
Ajuga *Iva* Schreb.
" *chamaepithys* Schreb.
gencensis L.
pyramidalis L.
reptans L.

Salvia Aethiopis (All. Fl. ped.).
Salvia Horminum (All. Fl. ped. Tur. Pl. clav.).
Salvia hispanica (All. Fl. ped. Bertol. Fl. it.).
Satureja Juliana (All. Fl. ped.).
Satureja Thymbra (All. Fl. ped.).
Thymbra spicata (All. Fl. ped.).
Thymbra verticillata (All. Fl. ped.).
Sideritis incana (All. Fl. ped.).
Melissa erecta (All. Fl. ped.).

FAM. LXXX. VERBENACEAE.

Vitex Agnus castus L.
Verbena officinalis L.
Zsanza " *repens* Bertol.

FAM. LXXXI. LENTIBULARIÆ.

Pinguicula vulgaris L.
grandiflora L.
Utricularia vulgaris L.

FAM. LXXXII. PRIMULACEÆ.

Coris monspeliensis L.
Lysimachia nemorum L.
Nummularia L.
vulgaris L.
punctata L.
Linum stellatum L.
Asperula tenella L.
phoenicea All.
caerulea Schreb.
 — *β. verticillata*.
Centunculus minimus L.
Vitalba primulaeflora Bertol.
Androsace villosa Bertol.
carnea L.
obtusifolia All.
Primula elatior Jacq.
succroloens Bertol.
acaulis Jacq.
furcata L.
marginata Curt.

Primula Allionii Loisel.
villosa Jacq.
latifolia Lap.
Soldanella alpina L.
Cyclamen hederacifolium H'ild.
Samolus Valerandi L.

Glaux maritima (All. Fl. ped.).
Primula integrifolia (All. Fl. ped.).
Primula longiflora (All. Fl. ped.).

FAM. LXXXIII. GLOBULARIÆ.

Globularia vulgaris L.
 { *cordifolia* L.
 { *nana* DC.
nudicaulis L. (erb. O. B. Tor.).
Alypum L.

FAM. LXXXIV. PLUMBAGINÆ.

Plumbago europaea L.
Statice vulgaris Bertol.
 — *β. scorzonrifolia*.
denticulata Bertol.
Limonium L.
pubescens DC.
 { *Avei DNra.* (14)
 { *echinoides Avei Lall.* (excl.
 { *Sint. speciosa All.*)

FAM. LXXXV. PLANTAGINÆ.

Plantago Cynops L.
 " *Psyllium* L.
 " *arenaria W. et K.*
 { *Majur* L.
 { *minima* DC.
 " *media* L.
lanceolata L.
 — *β.* { *altissima* Koch.
 { *P. altissima* Jacq.
 " *Lagopus* L.
rectifolia Poir.
albicans L.

Plantago montana Lamck.
alpina L.
maritima L.
 " *Weldenii* Reickb.

Plantago " *Bellardi* All.
Coronopus L.
 — *β. spica ramosa*.

SOTTOCLASSE IV. MONOCLAMIDA.

FAM. LXXXVI. AMARANTACEE.

Amaranthos retroflexus L.
spicatus Lamck.
Blitum L.
prostratus Balb.
xylocstris Desf.
 " *albus* L.

Atriplex portulacoides L.
rosea L.
latifolia α., β. γ. Koch.
litoralis M. T.
 " *hortensis* L.
Theligonum Cyococrambe L.

FAM. LXXXVII. FITULACEE.

Phytolacca " *decandra* L.

FAM. LXXXIX. POLYGONEE.

FAM. LXXXVIII. CHENOPODEE.

Salsola Soda L.
 { *Tragus* L.
 { *Kali* L.
Suaeda fruticosa Forsk.
maritima M. T.
Salicornia herbacea L.
Polyeuenum " *arvense* L.
 — *β. roseum* D.Ntra.
Kochia " *Scoparia* Schrad.
Teloxys " *aristata* M. T. (erb. Viv.).
Cleopodium polyspermum L.
album L.
opulifolium Schrad.
arabicum L. (erb. Viv.).
murale L.
Vulgaria L.
glaucum L.
Ambrosia " *Botrys* M. T.
 " *ambrosioides* Spach.
Blitum Bonus henricus Mey.
Beta vulgaris β., δ. M. T.
Camphorosma monspeliaca L.
Atriplex Halimus L.

Polygonum lapathifolium L.
Persicaria L.
Hydropiper L.
amphibium L.
alpinum L.
Convolutus L.
dumetorum L.
maritimum L.
aviculare L.
 — *β. litoreum* D.Ntra.
Bellardi All.
crassinerivium Ces.
viviparum L.
Bistorta L.
Rumex montanus Desf.
 { *thyrsoides* R. et S.
 { *multifidus* All.
toberosus All.
scutellus L.
Pseudoacetosa Bertol.
Acetosella L.
Hydrolapathum Huds. (erb. Viv.).
obtusifolius L.
crispus L.
nemorosus Schrad.

Rumex conglomeratus Murr.
pulcher L.
alpinus L.
 " *Bucephalophorus* L.
Oxyria digyna Campd.

Rumex maritimus (All. Fl. ped.).
Rumex aquatilis (Tor. Pl. clav.).
Polygonum serrulatum (Fl. il.).

FAM. LXXXX. TIMELEE.

Passerina " *anana* Wickstr.
hirsuta L.
Daphne Mezereum L.
laureola L.
alpina L.
glandulosa Bertol.
Goidium L.
Caeorum L.

Thymaelaea Tarton raira (All. Fl. ped.).
Sasamooda (All. Fl. ped.).
dioica (All. Aoct.).

FAM. XCI. LAURINEE.

Laurus nobilis L.

FAM. XCII. SANTALACEE.

Oxyris alba L.
Thecium alpinum L.
divaricatum Jani.
linophyllum L.

FAM. XCIII. ELEAGNEE.

Hippophæ rhamnoides L.

FAM. XCIV. CITINAE.

Cytinus Hypocistis L.

FAM. XCV. ASAROIDEE.

Asarum europaeum L.
Aristolochia Clematitis L.
loaga L.
rotunda L.
pallida Koch.

FAM. XCVI. EUPHORBACEE.

Buxus sempervirens L.
Euphorbia " *Chamaesyce* a., §. *Dub.*
 " { *Prestii* Guss.
 trinervis Bertol.
Hetioscopia L.
platyphyllus L.
stricta L.
pilosa L.
hyberna L.
purpurata Thuill.
 { *flavicomis* DC.
 { *dulcis* Fl. ital.
spuosa L.
dendroides L.
Cyparissias L.
nicaensis L.
terraria L. (erb. Viv.).
Paralias L.
Pithyusa L.
serrata L.
hiumbellata Poir.
 " *segetalis* L.
 " *pinex* L.
 " *aleppica* L.
 { *exigua* L.
 { *retusa* Cae.
 { *falcata* L.
 { *obscura* Loisel.
Pepus L.
amygdaloides L.
Characias L.
 — §. *melapetala* D.Ntrs.
Mercurialis annua L.
 — §. *ambigua* Dub.
perennis L.
Crotophora " *tinctoria* A. Juss.

Euphorbia Esula (Bertol. Fl. it.).
Myrsinites (All. Fl. ped.).

FAM. XXVII. URTICACE.

Urtica urens L.
dioica L.
membranacea Poir.
Parietaria diffusa Koch.
officinalis L.
Humulus Lupulus L.
Ficus Carica L.
Morus = *nigra* L.
Celtis australis L.
Ulmus campestris L.

FAM. XXVIII. JUGLANDACE.

Juglans = *regia* L.

FAM. XXIX. CUPULIFERE.

Fagus sylvatica L.
Castanea Vesca L.
Quercus Suber L.
Ilex L.
Cerris L.
pubescens Willd.
sessiliflora Sm.
apeunina Lamck.
coccifera L. (erb. O. B. Tor.)
Corylus Avellana L.
Carpinus Betulus L.
Ostrya vulgaris Willd.

Quercus Pseudosuber (Bertol. Amoen.)

FAM. C. SALICINAE.

Salix alba L.
triandra L.
purpurea Koch.
incana Schrk.
nigricans Fries.
phylicifolia Fl. ticin.

Salix Caprea L.
reticulata L.
aurita L.
eiuera L.
hastata L.
serrulata Fl. ticin.
serpyllifolia Scop.
Populus tremula L.
alba L.
nigra Spach.
 — *β. pyramidalis*.

Salix cerasifolia (Fl. tiela.).

FAM. CI. BETULINAE.

Betula alba L.
 — *β. apeunina* D.Ntrs.
Alnus glutinosa Gaertn.
incana Willd.
viridis DC.

FAM. CH. CONIFERAE.

Ephedra distachya L. (erb. O. B. Tor.).
Taxus baccata L.
Juniperus communis L.
nana Willd.
macrocarpa Sibth.
Oxycedrus L.
 — *β. ericoides* D.Ntrs.
phoenicea Spach.
Sabina L.
Capressus = *sempervirens* L.
Pinus sylvestris Mill.
halepensis L.
maritima Lamck.
uncinata Ram.
Pumilio Schouw.
Pinea L.
Cembra L.
Abies excelsa DC.
pectinata DC.
Larix europaea DC.

CLASSE II. MONOCOTILEDONI.

FAM. CIII. IDROCARIDEE.

Hydrocharis Morsus ranæ L.
Vallisneria spiralis L.

FAM. CIV. ALISMACEE.

Alisma Plantago L.
ranunculoides L.
Sagittaria sagittifolia L.

FAM. CV. BUTOMEÆ.

Butomus umbellatus L.

FAM. CVI. JUNCAGINEÆ.

Triglochin palustre L.

Triglochin maritimum (All. Fl. ped.).

FAM. CVII. POTAMEÆ.

Potamogeton oblongus Viv.
natans Bertol.
plantaginicus Duer.
pusillus L.
pectinatus Sm.
densus L.
crispus L.
lucens L.

Zannichellia palustris Willd.

— *α. major.*
 — *β. minor.*

Potamogeton compressus (Tur. Pl. clav.).

Ruppia maritima (All. Fl. ped.).

FAM. CVIII. NATACEÆ.

Zostera marina L.
Posidonia oceanica Spr.

FAM. CIX. LEMNACEÆ.

Lemna trisulca L.
minor L.
gibba L.

FAM. CX. TIFACEÆ.

Typha latifolia L.
angustifolia L.
minima Funck.
Sparganium angustatum L.

FAM. CXI. AROIDEÆ.

Arum maculatum L.
italicum Mill.
Draconculis L.
Arisarum vulgare Rich.

FAM. CXII. PALMEÆ.

Chamaerops humilis L.
Phoenix n. dactylifera L.

FAM. CXIII. ORCHIDEEÆ.

Orchis longibracteata Bie.
laxiflora Lamck.
provincialis Buth.
Morio L.
muscula L.
brevicornis Viv.
 — *β. fallax* D.Nrs.
papilionacea L.
coriophora L.
ustulata L.

Orehis variegata All.
fusca Jacq.
sambucina L.
maculata L.
latifolia L.
Anacamptis pyramidalis Rich.
Nigritella angustifolia Rich.
globosa Rich.
Gymnadenia conopsea R. Br.
Peristylus viridis Lindl.
albidus Lindl.
Tioea { *cylindracea* Biv.
 { *Orehis secundiflora* Bertol.
Hermionis Monorchis R. Br.
Himantoglossum hircinum Spr.
Platanthera bifolia Rich.
Aceras antropophora R. Br.
Spiranthes aestivalis Rich.
autumnalis Rich.
Ophrys fusca Willd.
ciliata Biv.
lutea Cav.
distoma Biv. (R. De Negr.)
araneifera Willd.
Arachnites Willd.
apifera Huds.
Bertolonii Moret.
suavea Viv.
myoides Jacq.
Serapias cordigera L.
neglecta D.Ntrs. (12)
longipetala Poll.
Lingua L.
Isias triloba D.Ntrs.
Corallorrhiza ionata R. Br.
Limodorum abortivum Sw.
Cephalanthera rubra Rich.
ensifolia Rich.
pallens Rich.
Neottia Nidus avis Rich.
Epipactis palustris Crantz.
latifolia All.
microphylla Sw.
Listera ovata R. Br.

FAM. CXIV. IRIDEE.

Crocus medius Balb.
versicolor Ker.
biflorus Mill.
vernus Willd.
 — *β. β. minore* Bertol.
Romulea Bulbocodium S. et M.
Columnea S. et M.
Gladiolus « *segetum* Gussl.
 { *Boucheauss* Schlecht.
 { *triphyllus* Fl. it.
communis L.
Iris germanica L.
sambucina L.
Florentina L.
lotescens Lamck.
pumila L.
Pseudacorus L.
foetidissima L.
graminea L.
tuberosa Willd.
junccea Willd.
Sisyrinchium L.

FAM. CXV. AMARILLIDEE.

Sterubergia lutea R. et S.
Narcissus Tazzetta L.
niveus Loisl.
intermedius Loisl.
Pseudo-Narcissus L.
incomparabilis Willd.
poëticus L.
Leucojum aestivum L.
vernum L.
 { *hyemale* R. et S.
 { *autumnale* Balb.
Galantus nivalis L.
Pancreatum maritimum L.

Narcissus dubius (DC. Fl. fr.).
Narcissus polyanthus (Dub. Bot. gall.).

Orehis romana (Reichb. Fl. exsicc.).

FAM. CXVI. ASPARAGE.

- Asparagus officinalis* L.
tenuifolius Lamck.
ambiguus DNtrs. ⁽¹⁴⁾
acutifolius L.
Streptopus amplexifolius DC.
Paris quadrifolia L.
Convallaria majalis L.
Polygonatum L.
multiflora L.
verticillata L.
Maianthemum bifolium DC.
Smilax aspera L.
mauritanica Desf.
Ruscus aculeatus L.
Hypoglossum L.

FAM. CXVII. DIOSCOREE.

- Tamus communis* L.

FAM. CXVIII. GIGLIACEE.

- Tulipa sylvestris* L.
 { *praecox* Ten.
 { *Gesneriana* Bell.
Clusiana Vent.
Fritillaria { *Melagris* α, β. Bertol.
 { *Melagris* et *involuerata* All.
Lilium candidum L.
bulbiferum L.
Martagon L.
Pumponium L.
Erythraeum Dens canis L.
Asphodelus albus Vild.
 fistulosus L.
Paradisa hemeroanthericoides Mazz.
Athericum Liliago L.
serotinum L.
Ornithogalum arabicum L.
narbonense L.
pyrenaicum L.
umbellatum L.
refractum W. et K.
 { *mutabile* DNtrs. ⁽¹⁵⁾
 { *exscapum* Vie. herb. non Ten.

- Gagea lutea* R. et S.
arvensis R. et S.

- Scilla maritima* L.
hyacinthoides L.
peruviana L.
italica L.
bifolia L.
autumnalis L.

- Allium* *pallens* L.
oleraceum Fl. it.
montanum α. Fl. it.
intermedium DC.
ligusticum DNtrs. ⁽¹⁶⁾
roseum L.
album L.
proculium Ten.
triquetrum L.
subhirsutum L.
suaeuolens Jacqu.
Schuenoprasum L.
ursinum L.
nigrum L.
Chamaemoly L.
Sphaerocephalum L.
Cambasii DNtrs.
Ampeloprasum Fl. it.
acotiflorum Loist.
diversiflorum DNtrs.
Gherardi DNtrs. ⁽¹⁷⁾
vineale L.
Scorodoprasum L.
Hyacinthus α *orientalis* L.
romanus L.
Muscari comarum Mill.
racemosum Mill.
botryoides Mill.

- Hyacinthos serotinus* (All. Fl. ped.).
Allium sativum (Balt. Misc. alt.).
Allium multiflorum (Dub. Bot. gall.).

FAM. CIX. BRONELIACE.

- Agave* α *americana* L.

FAM. CXX. COLCHICACEÆ.

- Colchicum montanum* L.
alpinum DC.
autumnale L.
Veratrum nigrum L.
album L.
Toxicaria calyculata Wahlenb.

FAM. CXXI. APILLANTER.

- Aphyllantes monspeliensis* L.

FAM. CXXII. JUNCÆÆ.

- Juncus acutus* L.
conglomeratus L.
effusus L.
glaucus Willd.
bulbosus L.
maritimus Sal.
obtusiflorus Ehrh.
acutiflorus Ehrh.
lamprocarpus Ehrh.
supinus Moench.
capitatus Weig.
insularis Vir.
bufonius L.
trifidus L.
Luzula pediformis DC.
maxima Desv.
nivea Willd.
albida Willd.
tutea DC.
Forsteri DC.
campestris DC.
spadicea DC.

Juncus filiformis (Ait. Fl. ped. et Auct.).

FAM. CXXIII. CYPERACEÆ.

- Cyperus longus* L.
badius Desf.
Moulti L. f.

Cyperus n. Tenorii Presl.

- flavescens* L.
olivarius Targ.
fuscus L.
 " *difformis* L.
globosus All.
mucronatus Vahl.

Schoenus mucronatus L.

- nigricans* L.

Gladium Mariscus R. Br.*Rhynchospora alba* Vahl.*Helicoharis oligulmis* L.

- multicaulis* Spr.

palustris R. et S.*Scirpus Savii* S. et M.

- setaceus* L.
caespitosus L.
pungens Vahl.
littoralis Schrad.
Tabernaemontani Gm.
lacustris L.
syboticus L.
maritimus L.
Holoscchoenus 2., 5., 7. Bertol.
compressus Pers.

Fimbristylis dichotoma Vahl.*Eriophorum Scheuchzeri* Hoppe.

- angustifolium* Roth.

- latifolium* Hoppe.

Carex Davalliana Sm.

- gynomaec* Bertol.

- paniculata* L.

- divisa* Huds.

- vulpina* L.

- divulsa* Good.

- muricata* L.

- stellulata* Good.

- remota* L.

- Schreberi* Willd.

- leporina* L.

- caespitosa* L.

- *S. polichella* D.Ntrs.

- stricta* Good.

- montana* Koch.

- pauciflor* Jacq.

- Carex* { *toментosa* L.
 grisea Vis.
 humilis Leyss.
 gynobasis Vill.
 digitata L.
 pilosa Scop.
 nitida Host.
 panicea L.
 glauca Scop.
 maxima Scop.
 pallascens L.
 acutepervirens Vill.
 frigida All.
 ferruginea Scop.
 Oederi Ehrh.
 sylvatica Hbds.
 extensa Good.
 distans L.
 punctata Gaud.
 provincialis Degl.
 ampullacea Good.
 riparia Curt.
 hirta L.
-
- Eriophorum gracile* (Bertol. Fl. it.).
- FAM. CXXIV. GRAMINACEE.
- Andropogon hirtus* L.
 pubescens Vis.
 angustifolius S. et Sm.
 distachyos L.
- Heteropogon Allionii* R. et S.
Chrysopogon Gryllus Trin.
Sorghum halepense Pers.
Lappago racemosa Willd.
Digitaria sanguinalis Scop.
 glabra R. et S.
- Echinochloa Crus galli* R. et S.
Panicum capillare L.
Setaria verticillata P. B.
 glauca P. B.
 viridis P. B.
- Imperata arundinacea* Cyr.
Anthoxanthum odoratum L.
- Phalaris* = *canariensis* L.
 = *nitida* Presl.
 = *truncata* Guas.
 nodosa L.
 minor Retz.
 = { *coerulescens* Desf.
 aquatica Bertol.
 = *paradoxa* L.
- Alopecurus agrestis* L.
 — *β. muticus* Bertol.
 bulbosus L. (erb. O. B. Tor.)
 utriculatus L.
- Cynopsis alopecuroides* Schrad.
 schoenoides Lamck.
 aculeata Schrad.
- Phleum Gerardii* All.
 alpinum L.
 pratense L.
 Michellii All.
 asperum Jacq.
 arenarium L.
- Mibora verna* P. B. (erb. O. B. Tor.).
Cynodon Dactylon Pers.
Leersia = *oryzoides* Willd.
Polypogon monspeliensis Desf.
 maritimus Willd.
- Agrostis vulgaris* Bertol. Fl. it.
 rupestris All.
 canina L.
 verticillata Vill.
 = *Spica venti* L.
 = — *β. minor*
 pungens Schreb.
- Lagurus* = *ovatus* L.
Calamagrostis Epigeios Roth.
 litorea DC.
 tenella Kunth.
- Doyenxia varia* Kunth.
 sylvatica Kunth.
- Ammophila arenaria* Link.
Gastridium tendigerum Gaud.
Milium effusum L.
- Piptatherum coerulescens* P. B.
 multiflorum P. B.
- Stipa* = *tortilis* Desf.
 = *Lagasco* R. et S.

- Stipa pennata* L.
Aristella bromoides Bertol.
Lasiagrostis Ladamagrostis Link.
Phragmites communis Trin.
Arundo Donax L.
Ampelodesmos tenax Link.
Echinaria « capitata Desf. (erb. cas Ardoino).
Sesleria coerulca L.
 disticha Pers. (erb. O. B. Tor.).
Koeleria grandiflora Bertol.
 — §, { minor.
 { setacea DC.
 { villosa Pers.
 { « phleoides Pers.
 { cristata Pers.
Lamarckia aurea Moench.
Deschampsia cespitosa P. B.
Nira flexuosa L.
 Caryophyllca L.
 Copanina Guss.
 ambigua DNtrs.
Corynephorus articulatus P. B.
Holcus mollis L.
 lanatus L.
 — §, setiger DNtrs. (1°)
Arrhenatherum acenacum P. B.
Avena « fusa L.
 « sterilis L.
 pubescens apennina Ces.
 pratensis L.
Avena bromoides L.
 versicolor Vill.
 fallax R. et S.
 setacea Vill.
 flavescens L.
 « neglecta Savi.
 myriantha Bertol.
Danthonin provincialis DC.
Triodia decumbens P. B.
Melica ciliata L.
 Boohii All.
 pyramidalis Bertol.
 minuta L.
 nutans L.
 uniflora Retz.
 Purte H.
Briza maxima L.
 media L.
 minor L.
Eragrostis « pilosa P. B.
 poaeoides P. B.
 myriandryha Link.
Poa nemoralis L.
 compressa L.
 hathosa z., §, L.
 annua L.
 alpina L.
 pratensis L.
 trivialis L.
Glyceria spectabilis M. et K.
 fluitans R. Be.
Molinia coerulca Moench.
 acrotina M. et K.
Dactylis glomerata z., §, Koch.
Cynosurus cristatus L.
 echinatus L.
Festuca radicea L.
 elatior Fr. it.
 apennina DNtrs. (1°)
 poaeformis Host.
 flavescens Bell.
 heterophylla Lamck.
 duriuscula Dub.
 — §, cinerea Dub.
 inopa DNtrs. (1°)
 Halleri Vill.
 ovina L.
Avelinia Michellii Parlaf.
Vulpia uniglumis Reichb.
 « sciuroides Guss.
 « myurus Guss.
 « ciliata Link.
 graculata Link.
 ligustica Link.
Sclerochloa rigida Link.
 maritima Link.
Brachypodium sylvaticum R. et S.
 { *pinnatum* Koch.
 { *Trit. geauense* DC.
 Halleri Link.
 « distachyon R. et S.
 subtile DNtrs.

- Brachypodium* = *hispanicum* *Reichb.*
 holiaceum *R. et S.*
 ramosum *R. et S.*
Bromus = *Gussoni* *Parlat.*
 = *jabatus* *Ten.*
 = *madritensis* *L.*
 = *rubens* *L.*
 = *tectorum* *L.*
 erectus *L.*
Sorrahaleus = *mollis* *Parlat.*
 = *arvensis*,
 = — *§. procerus* *D.Ntrs.*
 = *patulus*,
 = *squarrosus*,
 = *secalinus*,
 = *commutatus*,
 = *divaricatus*,
Gaudium = *fragilis* *P. B.*
Agropyrum *Savignoni* *D.Ntrs.* ⁽¹¹⁾
 caninum *P. B.*
 repens *P. B.*
 juncum *R. et S.*
Secale = *cereale* *L.*
 = *villosum* *L.*
Hordeum *muricatum* *L.*
 bulbosum *L.*
 nudosum *L.*
 pratense *Fl. et.*
 secalinum *All.*
- Lolium* = *maximum* *Hill.*
 = *temulentum* *L.*
 multiflorum *Lamck.*
 — *§. luxurians* *D.Ntrs.*
 pervane *L.*
Egyplops *ocula* *L.*
 = *truncialis* *L.*
 = *cylindrica* *Host.*
Lepturus *incurvatus* *Trin.*
 filiformis *Trin.*
 cylindricus *Trin.*
Psilurus *nardoides* *Trin.*
Nardus *stricta* *L.*
-
- Coix* *Lacryma* (*All. Fl. ped.*),
Panicum *repens* (*Bertol. Fl. it.*),
Agrostis *alpina* (*Bertol. Fl. it.*),
Stipa *juncus* (*Bertol. Fl. it.*),
Poa *divaricata* (*Balb. Mjse. alt.*),
Bromus *racemosus*, (*Bertol. Fl. it.*),
Bromus *asper* (*Bertol. Fl. it.*),
Bromus *inermis* (*All. Fl. ped.*),
Triticum *unilaterale* (*Bertol. Fl. it.*),
Elymus *arcuarius* (*All. Fl. ped.*),
Hordeum *maritimum* (*Bertol. Fl. it.*),
Aegylops *neglecta* (*Bertol. Fl. it.*),

DIAGNOSI DELLE SPECIE MENO NOTE

- (¹) *ALYSSUM VIVIANI* — annuum, a basi ramosum, pilis stellatis in-
canum; foliis a basi attenuata, ovali-lanceolatis, obtusiusculis,
subspathulatis; calyce deciduo; *staminibus filamentis breviorum*
squamula linear-emucata ad apicem emarginato-bidentata, latere
interno instructis; siliculis racemosis, *pedicello patente breviori-*
bns, ovato-suborbicularibus, centro elevatis, vix emarginatis, gla-
bris, stylo persistente siliculam dimidiam aequante mucronatis,
loculis dispermis. — Nel letto del Bisagno presso la Foce, se-
condo un esemplare dell'erbario di Viviani. — Somiglia per l'a-
spetto all'*A. minimum*.
- (²) *CYTISUS PEMILUS* — humilis; caule a basi ramosissimo, *ramis*
erectiusculis, prostratisve, patenter hirtellis, foliolis parvis, obo-
vatis, oblongo-ovatis, dense adpresse pilosis; *flocibus axilla-*
ribus solitariis, lateralibus, breve pedunculatis, ebracteolatis;
calycibus tubulosis bilabiatis, labio superiore obtuse bidentato,
subadpresse pilosis. — Nelle Alpi marittime. — Ha tutto il porta-
mento del *Cytisus ratisbonensis* (Koch Syn. ed. 2. p. 171), ma ne
differisce per la peluria dei rami orizzontale. Forse il *Cytisus su-*
pinus delle Alpi marittime, di cui è cenno in DC. (Prod. 2. p. 156)
e nella succennata *Synopsis* di Koch, appartiene a questa specie.
- (³) *BIFLORUM SAVIGNONII* — annuum; foliis perfoliatis, *subrotun-*
dis, coriaceis, cartilagineo-marginatis, apice mucronulatis, tenui-
ter 15-20-nerviis, superiora versus sensim sensimque minoribus;
umbellis terminalibus, 5-6-radiatis, exinvolutis, involucelli 5-
phylli foliolis exterioribus *tervis obovato-acuminatis, mucronatis-*
que, coriaceis, umbellula fructifera longioribus, *lateralibus contigu-*
a basi ad apicem usque juncim conatis, interioribus anguste
lanceolato-acuminatis, distinctis, 1-nerviis, pedicellos vix aequanti-

bus; *mericarpiis elevato-vaginis*; *carpophori ramis liberis filiformibus*. — Nel letto del torrente *Sarla* presso Genova, dottor Savignone.

- (³) *SCABIOSA MIXTA* — annua, dichotome ramosa, pilis sparsis, fasciculatis, surrectisque, hispidula; foliis obverse lanceolatis, integris, vel superioribus utrinque lobulo lineari, angustave obverse lanceolato, auriculatis, adpresse pilosis; involucri foliolis exterioribus lanceolatis, obtusis, capitulum florens subrotundum subsuperantibus, demum reflexis; involucllo ovato, foveolas infra ovato-truncatas, profundeque exsculptas, dense hirsuto, coronam 50-neriviam acute denticulatam, denum explanatam aequante; calycis stipitati aristis basi incrassatis scabris corona longioribus. — Nel letto della *Polcevera* sopra *Rivarolo*, rarissima.
- (⁴) *SENECIO PERSOONII* — perenne, cauo-tomentosum; foliis pinnatifidis, *seguentibus confertis subimbricatis palmato 3-5-fidis*, laciniis obtusis; involucri squamis apice haud sphacelatis; pappo corollae tubo aequali; acheniis puberulis. — Comune nei monti di *Nava* secondo esemplari avuti dal dott. Berti. — Medio tra l'*iucanus* e il *leucophyllus* e verosimilmente il *Senecio iucanus italicus* di Persoon (Pers. Syn. 2. p. 435. DC. Prod. 6. p. 356).
- (⁵) *CAMPANELA SABATIA* — perennis; radice crassa multicauli, ramis adscendentibus inferne foliosis, superne racemoso-corymbosis nudiusculis; foliis radicalibus caulinisque inferioribus breviter petiolatis, parvis, subcordato-ovatis, ovato-lanceolatis, lanceolatisve, grosse paucidentatis, *mediis elongato-linearibus, utrinque attenuatis, apice obtusiusculis, integris, patentissimis, arcuato-deflexis, ascendentibusque*, supremis floralibusque subulatis; pedunculis fructiferis recurvis; calycis turbinati, tubo minute papuloso, dentibus subulato-incurvis alabastro multo longioribus, corolla turbinato-campanulata ampla brevioribus; stylo exserto glanduloso. — Sulle rupi lunghesso la strada regia tra *Noti* e *Vado*, riviera di ponente.
- (⁷) *CONVOLVULIS DORYCNIODES* — basi suffrutescens; caule diffuso, ramisque adpresse argenteo-sericeis; foliis inferioribus obverse oblongo-lanceolatis, *vix lineatis*, adpresse sparse pilosis, caeteris linearibus obtusis plerumque complicatis, dorso praesertim sericeis; floribus terminalibus solitariis, geminatisve; *pedunculis calycem vix aequantibus; calycis ovati segmentis dorso subsericeis, exterioribus lanceolatis, intimis coriaceis, valde concavis, late ovato-acutis, corolla vix tripla brevioribus*. — Isola Palmaria.

(⁸) *ORORANCHE SUPERRA* — foetidissima, subcaespitosa, superne praesertim villo glandulifero plus minusve copioso vestita; caule basi squamis imbricatis tecto subbulbiformi; bracteis calycem aequantibus, superantibusve ovato-acuminatis, supremis comantibus; sepalis pluri-nerviis late-ovato-bifidis, laciniisque longe subulatis corollam aequantibus superantibusve; corolla ventricoso-campanulata laeviter curvata, venosa, intus glabra; labio superiore porrecto obtuse bilobo, lobis rotundatis, inferiore brevioris trilobo, pone lobos buplicato, lobis amplis subreniformibus dentato-limbriatis, undulatisque, medioque apiculato e basi constricto-canaliculata recurvatis; filamentis basi corollae insertis, superne sparse glanduligeris; ovario acuminato, styloque revoluta exserto, glandulifero, stigmatibus magno, bilobo. — Nei prati sopra Riva presso Genova. — Non so indicare la pianta su cui vive parassitica; mi sovviene per altro di non aver veduto nella località succennata nessuna delle leguminose suffrutescenti sulle quali si suole trovare l'*O. cruenta*. Da questa già si distingue per l'odore spermatico nauseoso fortissimo che tramanda, e se l'*O. gracilis* dello Smith non è che una varietà delle *cruenta*, come opinano i chiarissimi Bertoloni e Koch, questa mia è sicuramente diversa e dall'una e dall'altra. Forse più si avvicina alla *O. condensata* del chiariss. prof. cav. Moris.

(⁹) *ORORANCHE SATYRUS* — superne villo longo, crispulo, cinerascente, glandulifero dense hirsuta; bracteis ovato-lance-acuminatis corolla fere duplo longioribus, supremis comantibus; sepalis bifidis, segmentis subulatis, corollam subaequantibus; corollae intus glabrae tubo ventricoso-campanulato, subglabro, limbi hirsutissimi labio superiore curvato breviter bilobo, denticulato, inferiore trilobo subadpresso superiorem longitudine aequante, lobis laterali-bus ovato-acutis, utrinque dente auctis, subcomplicatis, undulatisque, medio majore, basi constricto, complicatoque, undulato, ovato-acuto; staminum filamentis basi corollae insertis, inferne glabris, antice sulco exaratis, superne, ovario, basi glandula 3-strumosa vitellina cincto, styloque arcuato glanduloso-pubescentibus; stigmatibus bilobo, luteo, lobis hemisphaericis divaricatis, subexserto; antheris vix apice glanduliferis. — Ne' monti selvosi della valle di Polcevera.

(¹⁰) *ORORANCHE CAUDATA* — sub lente sparsim, superne praesertim, villosula; bracteis ovato-attenuatis, obtusiusculis, plerumque re-

carris, corollae labium inferius aequantibus, superantibusve; calyce *trisepto*, lateralibus profunde bifidis, segmentis inaequalibus subparallelis, antico maiore corollam dimidium aequante, *septo dorsali* (in axilla axis florigeri et corollae) *lineari*, *indiviso corollae tubo breviori vel aequali*; corollae extus villosa-glanduliferae, tubuloso-campanulatae, *tubo supra basin abrupte curvato*, limbo *porrecto*, labio superiore late bilobo, *inferioris trilobi lobis subtriangularibus divergentibus*, patentibus, deflexisve, undulato-sulcatis, denticulatis, basi constricta canaliculatis; filamentis corollae basi insertis, superne glabris; ovario superne, styloque sparse piloso-glanduligeris; *stigmatibus vitellini bilobi lobis vix divaricatis subbreuiformibus*. — Sul *Peucedanum Cervaria* nei colli di Sestri a ponte.

- (¹¹) MICROMERUM THYROIDES — caespitosa, suffrutescens; ramis filiformibus surrectis, sub lente, *pilis deflexis pubescentibus*; foliis margine revolutis, dorso vix nervosis ad costum hirtellis, inferioribus ovatis, caeteris linearibus, basi angustata sessilibus, obtusiusculis, facie adpresse pubescentibus; *cymis axillaribus pedunculatis nudis*, *inferioribus 1-2-floris*, *remotis*, *supremis confertissimis*, *subsecundis*, *3-4-floris*, *folia aequantibus*; pedicellis bracteola lineari aequalibus, calyce triplo brevioribus; *calycis ovati subcentricosi 15-nervi*, *fauce intus vix villosa*, *nervis*, *dentibus superioribus triangularibus patentibus recurvis*, *inferioribusque patentibus hispidatis*. — Venne raccolta dal dott. Berti nel letto di un torrente presso *Oleggia*. — Propongo con molti dubbii questa specie comechè vicinissima alla *microphylla*.

- (¹²) STATICE AVEI — annua; foliis spatulato-obovatis *submembranaceis trinerviis ex apice rotundato mucronatis*, *vix facie sparsim muriculatis*, subtus livide sanguineis; scapo ramisque divaricatis regulariter alternatim ramosis, *laeviusculis*, squamis triangulo-acutis; floribus secundis, incurvis, remotis, bracteis exterioribus binis, amplexantibus, obtusissimis, margine scariosis, interna convoluta, coriacea, muricataque triplo brevioribus; calycis tubo ad sulcos pilosello, limbo 3-partito, *segmentis subspatulatis*, membranaceis, *nervo valido apicem versus evanescente exaratis*; corollae limbo calycem longitudine subaequante. — Ventimiglia, Panizzi. — La *Statice speciosa* dell'erbario di Allioni, proveniente non si sa donde, è totalmente diversa dall'*echinites*, e

forse per una svista è stata indicata nell' *Auctarium* (All. Auct. p. 29.) come nativa di Ventimiglia. Questa nostra, benchè somigliante all' *echioides*, ne differisce per un fare più grandioso, per essere quasi del tutto liscia, per le foglie mucronate, per la nervatura dei segmenti del calice non prolungata a modo di resta, i rami fioriferi non ricurvi, i fiori tutti secondari; per le quali cose, credo di doverla distinguere se non come specie, per lo meno qual forma rimarchevole della vera *Echioides*.

- (13) *SEAPIAS NEGLECTA* — foliis inferioribus arcuato-reflexis; bracteis lanceolatis acuminatis flore brevioribus; labello amplo e basi angustata bicallosa porrecto, trilobo, lobis lateralibus exsertis, ovato-rotundatis, subangulatis, crosissve, incurvis, medioque ovato-lanceolato, attenuatoque, obtusiusculo, vel plus minusve acuminato, disco villosa, pendula, eximie venosis concoloribusque; perigonii foliolis exterioribus apice liberis, interioribus adglutinis columnam aequantibus. — Colline dei dintorni di Genova.
- (14) *ASPARAGUS AMBIGUUS* — caule suffrutescente, ramisque patulis striato-scabris; stipulis rigidis, obtusis, acutisve reflexis; foliis 9-11, glabris setaceis mucronatis, pedunculis medio articulatis longioribus. — Porto Maurizio. — Trovate le forme di transizione, non sarebbe che una varietà dell' *A. acutifolius*.
- (15) *ORNITHOGALUM MUTABILE* — bulbo simplici; foliis sulco exaratis linearibus; floribus corymbosis, pedunculis demum patentissimis, refractisve; bracteis membranaceis, tenuissimis, lanceolato-acuminatis; perigonii foliolis exterioribus ex apice obtuso apiculato-mucronatis, reliquis obtusis muticis; staminibus e basi lineari subulatis; capsula ad angulos superiori parte alata; seminibus reticulatis. — Nei pascoli fuori la porta degli Angeli. — Variabilissimo, si trova a uno, due, o più fiori, e a prim' aspetto può essere scambiato coll' *O. exscapum*, ma più che a questo è vicino al *refractum*.
- (16) *ALLIUM (Codonoprasum) LIGUSTICUM* — bulbo ovato, inodoro, tunicis numerosissimis demum in fila dilabentibus fusciscentibusque tecto; scapo ad medium foliato; foliis linearibus striatis; spatula bivalvi, valvis lanceolato-longe-acuminatis inaequalibus, umbellam capsuliferam paucifloram duplo, triplo superantibus; perigonii albi foliolis tenuissimis oborato-obtusissimis, emerginatissve, exterioribus brevioribus; staminibus perigonio demum duplo longioribus; capsula globosa trilobata, obtusa, exserta. —

Colline dei dintorni di Genova. — Non so a quale delle specie già conosciute della sezione *Codonoprasum* si possa riferire.

- (¹⁷) *ALLIUM* (*Porrum*) *gherardi* — bulbo sobolifero, bulbillis longe pedicellatis, ovato-acutis, inclusis; scapo ad medium usque vaginis foliorum vestito; foliis teretibus fistulosis; spatha univalvi ampla ovato-cuspidata, umbellam capsuliferam aequante; *perigonii segmentis albidis exterioribus oblongo-ellipticis, interioribus ovatis apice rotundatis, staminibus exsertis, alternis tricuspidatis, cuspidate antherifera, filamentum subaequante, lateralibus vix longiore*. — Nella provincia d'Albenga, secondo un esemplare favoriti dal chiariss. prof. Gherardi.
- (¹⁸) *HOLCUS LANATUS SETIGER* — glumis undique sparse pilosis, ciliatisque; *valvulae superioris nervo in setam tenuem glumam aequantem producto, interiore breviter setigera*. — Ne' pascoli presso Sestri a ponente.
- (¹⁹) *FESTUCA* (*Schaedonorus*) *apennina* — *culmo laxo vaginato, vaginis fortiter striatis, laevissimis, suprema, sub athesi, paniculam racemosam nutantem amplectente; foliis planis, lato-linearibus, margine et nervis utrinque scabridis, ligula brevissima, truncatolacera, obliqua; axi, paniculaeque ramis angulato-scabris, ramis plerumque alternatim solitariis, geminatisque, brevioribus unifloris, longiore racemose 2-3-locustifero, supremis simplicibus; locustis 3-floris, flosculis demum laxis, remotis, ovatis, axi tenuiter puberulo; glumae valvula inferiore anguste lanceolato-aeminata 1-nervi, altera oblonga, obtusiuscula, vel vix acutiuscula 3-nervi, margine membranacea; glumellae paleis minutissime, sub lente, punctulatis longitudine aequalibus, inferiore oblonga, acutata, 3-nervi, margine scariosa, superne scabrida, ex apice bidentata breviter setigera, inferiore lanceolata, binervi, ad flexuras ciliolata, apice minute bidentata, membranacea; ovario truncate, glabro*. — Ne' pascoli tra S. Stefano d'Aveto e il Gottro.
- (²⁰) *FESTUCA INOPS* — compaete caespitosa; foliis duriusculis complicato-compressis, dorso scabriusculis, inferiorum vaginis chartaceis, culmeorum biauriculatis, auriculis productis, obtusis, membranaceis, inaequalibus, inferiore oblonga, anteriore ovata subduplo longiore; culmo striato, laevi; panicula racemiformi coarctata; locustis ovatis, sexfloris, pruinosis; glumae valvulis subaequalibus, anteriore obsolete trinervi margine membranacea, sub apice sca-

brida; glumellae pakea anteriore elliptico-lanceolata, obsolete 3-nervi, *seta brevissima mucronata, anteriore bidentata superne ad nervos scabrida*. — Monte del Gazzo sopra Sestri a ponente.

(²¹) *AGROPYRUM SAVIGNONI* — *vaginis ciliatis*, foliis facie et margine scabris, demum involutis, culmo laevi, vaginis tecto, vel breviter exserto; spica brevi, rachide strigulosa, articulis locustis 5-floris adpressis brevioribus; glumae valvis oblongis, subaequalibus 5-nerviis, obtusis, *dorso, paleisque exterioribus ad latera apiceque hirsutis*, flosculorum inferiorum muticis vel nervo breviter mucronatis, superiorum acuminato-mucronatis, palea interna apice truncata, dorso sub lente minute puberula. — Debbo anche questa specie all' indefesso dott. Savignone che la raccoglieva ne' pascoli presso Pegli.

RIASSUNTO delle Fanerogame della Flora Ligustica, pel confronto colle tabelle pubblicate dal sig. barone Cenci nelle Notizie naturali e civili sulla Lombardia.

Famiglia	Specie	Varietà	Famiglia	Specie	Varietà
Ranunculacee	63.	14	Riporto	356.	37
Berberidee	1.	—	Geraniacee	18.	—
Ninfacee	2.	—	Balsaminee	1.	—
Papaveracee	8.	1	Ossalidee	2.	—
Fumariacee	5.	—	Zigofillee	1.	—
Crucifere	104.	5	Rutacee	2.	1
Capparidee	1.	1	Coriariacee	1.	—
Cistinee	17.	7	Celastrinee	2.	—
Violariacee	12.	—	Ranunculoides	6.	1
Rosacee	5.	—	Terebinthacee	5.	—
Droseracee	2.	—	Leguminose	189.	19
Poligalee	5.	—	Amigdalee	4.	—
Franchetiacee	1.	—	Rosacee	44.	6
Silenee	44.	3	Sanguisorbee	6.	1
Alsinee	39.	6	Pomacee	14.	—
Malvacee	16.	—	Granate	1.	—
Linée	13.	—	Onagrariee	14.	1
Ipericinee	9.	—	Aloraghe	2.	—
Tiglidacee	5.	—	Callitrichinee	2.	—
Acerinee	5.	—	Litraricee	5.	—
Ampelidee	1.	—	Tamariscinee	5.	—
	356.	37		676.	66

<i>Famiglie</i>	<i>Specie</i>	<i>Varietà</i>	<i>Famiglie</i>	<i>Specie</i>	<i>Varietà</i>
<i>Riporto</i>	676.	66	<i>Riporto</i>	1570.	103
Mirtacee	1.	—	Plumbaginacee	6.	1
Cucurbitacee	2.	—	Plantaginacee	15.	2
Portulacacee	2.	—	Amarantacee	3.	—
Paroniettiacee	11.	1	Fitolaccacee	1.	—
Sclerantee	2.	—	Chenopodee	27.	4
Crassulacee	24.	—	Polygonacee	28.	1
Cattée	1.	—	Timelee	8.	—
Ficoidee	1.	—	Laurinee	1.	—
Ribesiacce	3.	—	Santalacee	4.	—
Saxifragacee	19.	—	Elagnacee	1.	—
Ombellifere	109.	7	Citinee	1.	—
Araliacee	1.	—	Asaroides	3.	—
Cornée	2.	—	Euforbiacee	50.	5
Lorantacee	1.	—	Orticee	10.	—
Caprifogliacee	14.	—	Juglandee	1.	—
Stellate	50.	—	Cupulifere	12.	—
Valerianee	15.	2	Salicinee	14.	1
Dipsacee	17.	1	Betulinee	4.	1
Composte	282.	14	Conifere	18.	1
Ambrosiacee	3.	—	Idrocaridee	2.	—
Campanulacee	50.	—	Alismacee	3.	—
Vacciniacee	3.	—	Butomee	1.	—
Eriacee	9.	—	Juncaginee	1.	—
Pirolacee	3.	—	Potamee	9.	1
Agrifogliacee	1.	—	Lemnacee	3.	—
Oleacee	7.	—	Najadee	2.	—
Geliconiacee	2.	—	Tifacee	4.	—
Asclepiadee	4.	—	Aroides	4.	—
Aporinee	4.	—	Palme	2.	—
Genziane	16.	1	Orehidee	52.	1
Convolvulacee	15.	—	Iridee	19.	1
Borraginee	36.	2	Anarallidee	12.	—
Solanacee	9.	1	Asparagee	15.	—
Verbasce	16.	1	Dioscoree	1.	—
Antirrinee	45.	1	Gigliacee	55.	1
Orobanchee	11.	1	Bromeliacee	1.	—
Rinantee	21.	1	Colchicacee	6.	—
Labiata	89.	3	Afillantee	1.	—
Verbenacee	5.	—	Juncce	22.	—
Leutibulariee	3.	—	Ciperacee	60.	3
Primulacee	25.	1	Graminacee	183.	5
Globulariee	4.	—			
	1570.	105		2251.	151

CRITTOGAME

Se bastava di coordinare i materiali, disposti dagli illustri autori, allegati in principio di questo lavoro, per comporre un prospetto della vegetazione della nostra Liguria, altrettanto insignificanti e scarsi mi sembrano i dati, che gli stessi ci hanno lasciato intorno alle piante crittogame; imperciocchè se si eccettuano le poche alghe della Spezia maestrevolmente descritte dal chiariss. professore Bertoloni, e le interrotte illustrazioni di alcuni Imenomiceti forniteci dal Viviani, a mala pena potremmo raggranellare una decina di rappresentanti per ciascuna famiglia. Eppure la Flora crittogamica della Liguria oltrechè interessantissima per la varietà, il pregio, la bellezza delle alghe del suo mare, potrebbe gareggiare con qualsiasi altra del continente europeo pel numero delle forme, di cui alcune basterebbero da loro sole a definirne il carattere. Infatti e nelle Felci e nelle Epatiche e nei Lieheni e nei Funghi possiamo noverare la più parte delle specie che particolarmente distinguono la Flora del cratere mediterraneo; e negli stessi Micomiceti, che costituiscono un mondo quasi ignoto agli occhi grossolani del volgo, vantiamo degli esseri che invano domanderemmo alla vallata del Po, sebbene parassiti di vegetali comuni ad entrambi i paesi. Mi basti addurre la *Stictis oleae* e *Panizzei*, la *Cytispora oleae*, il *Myriocephalum hederacolum*, la *Pyrenochaeta nobilis*, la *Discoisia smitacina* e la *vagans*, il *Leptothyrium smitacis*, le quali non si riscontrano sugli olivi, sull'edera, sulla smilace, sull'alloro, nè sulle rive del Lario e del Benaco, nè sui colli di Brescia, campo alle diligenti ed utili ricerche del chiariss. barone Cesati. Coteste parzialità de' micomiceti e delle cellulari in genere, hanno a parer mio un significato di non lieve importanza, e forse potrebbero fornire gli estremi per la spiegazione di alcuni de' più intralciati problemi di fisica vegetale.

Già imponente è la suppellettile che io ho riunito per la Flora crittogamica della nostra provincia; ma non avendo potuto dilatare le mie ricerche a tutte le località le quali mi sembrano promettere larga messe di specie, rimangono tuttavia di molte lacune nella serie delle Epatiche, dei Licheni e dei Funghi; lacune che non dubito di poter ricolmare, se a torto non presumo, doversi l'esistenza di tale e tal specie constatare eziandio nel nostro territorio, perciocchè obbligate ad analoghe località nelle regioni confinanti. Fin qui, per esempio, non mi è riuscito di riscontrare la *Parmelia chrysophthalma* e *Borreri*, l'*Evernia villosa*, la *Ramalina scopulorum*, la *Dirina repanda*, la *Lecanactis grumulosa*, l'*Oxymitra pyramidata*, la *Riccia lamellosa*, l'*Hypnum aureum*, ecc., comuni a molte località del litorale mediterraneo, e in parte nelle stesse adiacenze del Benaco e del Lario. Non ho potuto raccogliere che due specie di Tuberacee, nessuna delle Licoperdinee sotterranee, benchè nello scorso anno mi sia ripetutamente occupato della loro ricerca. Però anzichè produrre dei frammenti sconnessi di ciascuna famiglia, mi limito a presentarne i lineamenti in iscorcio.

CRITTOGAME VASCOLARI — Fuori l'*Asplenium marinum*, l'*Ophioglossum lusitanicum*, la *Woodwardia radicans*, lo *Scolopendrium Hemionitis*, la *Notochlaena vellea*, la *Struthiopteris germanica*, l'*Aspidium Oreopteris* e *Thelypteris*, e altre poche, non so se varietà o specie, particolari alle isole e alle provincie più meridionali d'Italia e alle uggiose pianure d'Isubria, contiamo nei limiti della nostra Flora quasi tutte le felci europee. La *Grammitis leptophylla*, la *Notochlaena Maranthae*, la *Pteris cretica*, l'*Aspidium lobatum*, l'*Asplenium Virgilii* e il *Petrarchae*, la *Cheilanthes odora*, si trovano più o meno frequenti nella regione degli olivi. L'Alpi marittime e l'Apennino ci forniscono l'*Aspidium Lonchitis*, l'*alpinum*, l'*Asplenium alternifolium*, il *viride*, la *Pteris crispa*, il *Lycopodium clavatum*, il *complanatum* e il *Setago*. Il *Lycopodium denticulatum* supplisce tra noi all'*helveticum*; l'*Isotetes Duriaei*, che non mi venne veduta che nelle pozzanghere di capo Paneggi presso Arenzano, a cui si direbbe essere approdata dalle lontane coste dell'Africa, ove prima scoprìala il chiariss. Durieu ¹, ci compensa la

¹ Bory et Durieu, Compt. rend. Juin 1844.

manca di Rizosperme, di cui forse qualche specie del genere *Pitularia* e *Marsilea*, e fors'anco la stessa *Marsilea pubescens* esiste nelle paludi di Albenga e di Spezia. L'*Acropteris septentrionalis* abbonda nelle fenditure delle rupi di tutt'Appennino, locchè per avventura contraddice all'opinione emessa dal chiariss. cav. Alberto Parolini, essere questa specie limitata a' soli terreni primigeni¹. Credo appena meritevoli di attenzione le Equisetacee le quali si presentano eternamente colle medesime forme in tutta Europa.

CRITTOGAME CELLULARI — MUSCHI ed EPATICHE — A più doppiu doviziosa è la famiglia dei Muschi. Caratteristiche della regione oleifera citerò, *Hypnum Illecebrum, confertum, Teesdalii, Leptodon Smithii, Daltonia heteromalla, Fabronia pusilla, Tortula laevipila, inermis, canescens, cuneifolia, Trichostomum crispulum, Zygodon viridissimus, Weissia Starkeana*, e in primo rango la *Bartramia stricta*, il *Bryum tectorum*, il *platyloia*, il *torquescens*, il *Physcomitrium curvisetum*, specie tutte che nei nostri dintorni, che io credo essere il limite settentrionale del *Physcomitrium curvisetum*, della *Bartramia stricta*, del *Bryum platyloia* ritraggonsi dal litorale per istanzare alle falde delle più interne colline. Però veggonsi affratellarsi colla *Grimmia apocarpa*, l'*Orthotrichum anomalum*, e il *cupulatum*, coll' *Hypnum rugosum, Molluscum, cupressiforme, striatum, purum, brevirostre*, colla *Weissia recurvata*, la *Grimmia leucophaea*, la *Tortula subulata*, il *Dicranum varium e scoparium*, il *Phascum subulatum*, ecc., copiosissimi nei folti castagneti. Il *Cinctidotus fontinaloides*, l'*Hedwigia aquatica*, la *Fontinalis antipyretica*, il *Conomitrium Julianum*, l'*Hypnum filicinum*, e il rusciforme rallegrano le acque dei nostri ruscelli. Dei *Polytrichum*, giganti di questa famiglia, il *formosum*, l'*juniperinum*, il *piliferum* si celano nelle selve montane.

Di tutte le specie fin qui osservate la più interessante è il *Bryum tectorum* che direi una forma intermedia tra l'*atropurpureum* e il *coronatum*, da' quali immediatamente si distingue per la tenuità e la trasparenza delle pareti della sua capsula. Se mi fosse permesso dai pochi esemplari raccolti nelle Alpi marittime e nei più alti Appennini inferire il carattere dei Muschi che ivi predominano, non esi-

¹ Atti della 2.^a riunione degli Scienziati Italiani, p. 190.

terci a dichiarare che nella nostra Flora decisamente scarseggiano le forme alpine. Sulle vette del colle di Tenda il *Bryum nutans*, l'*Hypnum alpecurum* il *collinum*, l'*Anomodon striatus*!!

Breve è la serie delle Epatiche diffuse nei nostri dintorni, perchè la costante siccità dell'atmosfera e del suolo, generalmente, non sono le condizioni che meglio si adattano al loro sviluppo. Tra le fogliose frequentissima la *Fossombronia pusilla*, la *Scapania compacta* e *nemorosa*, il *Sarcoscyphus emarginatus* e *Funkii*, la *Plagiochila asplenoides*, la *Calyptogeja Trichomanes*, la *Madotheca Porella*, *laevigata*, *platyphyloidea*, e *platyphylla*, la *Lejeunia serpyllifolia*, la *Frullania major* e *minor*, l'*Jugermannia albicans*, *coregraeca* ecc. Tra le frondose la *Metzgeria glabra*, e la *Pellia epiphylla*, la *Marchantia paleacea* e *polymorpha*, la *Preissia commutata*, la *Reboulia hemisphaerica*, la *Fegatella nemorosa*, la *Grimaldia dichotoma*, che ci richiama nella celebre signora Clelia de' marchesi Grimaldi una delle glorie ligustiche, la *Targionia hypophylla*, la *Corsinia marchantioides*. Barissima la *Radula complanata* e lo *Sphaerocarpos terrestris*, fin qui nessuna specie ben constatata d'*Anthoceros*. M'è tuttavia ignoto l'*Antrocephalus italicus* descritto dal chiarissimo professore Sassi negli atti della prima riunione degli Scienziati Italiani.

LICHENI — La *Parmelia aquila*, *plumbea Acetabulum*, *Smithii*, la *Biotora Rousselii*, la *Dirina rupestris*, la *ceratoniae* che si trova bene spesso sul tronco degli annosi castagni, l'*Abrothallus Bertianus*, la *Pertusaria Wulfenii*, la *Peltigera laevigata*, la *Ramatina Panizzii*, l'*Opegrapha oleae*, la *Verrucaria actinostoma*, il *Collema Dufourei*, la *Rocella phycopsis*, sono per ora le specie ligustiche che non iscorgo accennate nell'elenco dei Licheni insubrici del chiar. Garovaglio che fa parte delle già citate notizie sulla Lombardia. Non serve il dire che qui pure si trovano a profluvio quelle tutte trivialissime specie che poco schilfitose si accomodano a ogni maniera di matrici, e vestono i tetti e le pareti delle case, il tronco degli alberi, e popolano i pascoli più duri ed ingrati: che anzi nella nostra Liguria sbizzarriscono non di rado con tratti e colori più che altrove eleganti e pronunciatissimi. Ma oggimai questa famiglia di piante, forse la più nobile di tutte le cellulari, per i molteplici usi a cui sono convertiti alcuni de' suoi rappresentanti, è avvolta di tante dif-

ficoltà e dubbiezze che ancor non oso citare partitamente le specie di cui ho fatto tesoro, e tanto più che le mie particolari osservazioni avendomi condotto a principii grandemente diversi da quelli che si sono adottati dai moderni Lichenologi, difficilmente potrei essere compreso, se qui mi presentassi con un gretto apparato di nomi. Nè la convinzione che ho acquistata essere immaginarie le pretese trasformazioni dei Licheni, vagheggiate da alcuni autori, mi permette di indietreggiare indicando con nomi collettivi i miscugli cui si volle dar forma di specie.

Nelle selve e nei posti elevati, formicolano le molte varietà di *Usnea*, l'*Evernia jubata*, la *vulpina*, la *prunastri*, la *Cetraria tristis*, l'*islandica*, la *saepincola*, la *Solorina saccata*, l'*Unbilicaria cylindrica*, la *Sticta pulmonacea*, *sylvatica* e *scrobiculata*, la *Ramalina pollinaria* e *fraxinea*, la *Cladonia vermicularis* ecc. Quanto ai Licheni crostacei sassicoli, primeggiano le specie delle formazioni calcaree. La *Parmelia ferruginea* e *Lallarei*, la *sordida*, la *sulphurea*, la *cervina*, la *callopisma*, la *crassa*, la *circinnata*, la *candicans*, la *serposa*, la *cinerea*, la *Biatore testacea*, la *Gyalactea exanthematica*, la *Verrucaria rupestris*, la *Lecidea contigua*, *immersa*, *albocerulea* ecc. ecc., pure sui filoni quarzosi e sulle rupi arenarie veggonsi talvolta le specie delle rocce primitive quali la *Lecidea variegata* e perfino la *geografica*, splendidissima così sulle spiagge, che sulle rocce delle più alte montagne.

Fium — Il Viviani negli ultimi anni della sua luminosa carriera, assistito dai larghissimi mezzi che il munificentissimo Signor nostro, il Re CARLO ALBERTO promotore di tutte le utili e nobili imprese, si era degnato allogargli, diè mano all'illustrazione dei funghi mangerecci e nocivi d'Italia, con un'opera di colossali dimensioni, che per la nitidezza e l'eleganza delle tavole ond'è corredata starebbe a pari colle celebratissime del Bulliard, del Sowerby, del Greville, del Krombholz, del Vittadini, se pei gravi malori, onde appunto negli ultimi anni di sua vita fu travagliato l'autore, non fosse rimasta a mezzo cammino. Avremmo avuto per tal mezzo l'illustrazione delle principali specie de' nostri inenomiceti mangerecci e nocivi, primo passo alla storia completa di questa famiglia, di cui pur troppo non conosciamo che una minima parte.

I funghi mangerecci che più frequentemente dalle interne vallate

si recano sui nostri mercati sono l'*Agaricus caesareus*, il *Boletus edulis*, l'*Agaricus campestris*, e il rinomatissimo *Spinarolo*, *Agaricus Mouceron* di Bulliard (*A. prunellus* Viv.); ma nel contado se ne consumano molt'altre egualmente innocenti e squisite, come l'*Agaricus procerns* e il *sanguineus*, il *Boletus scaber*, l'*Helvella crispa* la *Peziza Acetabulum*, la *Clavaria Botrytis*, il *Cantharellus cibarius*, l'*Hydnum repandum*, l'*Agaricus Sementino* Viv., l'*alutaceus*, il *mel-leus* ecc.

Per bellezza di forme e per la loro frequenza accennerò, l'*Agaricus olearius*, lo *stipticus*, il *Polyporus laccatus*, lo *squamosus*, il *pomaceus*, il *versicolor*, l'*Hydnum zonatum*, il *Boletus subtomentosus*, la *Telephora coerulescens*, l'*hirsuta*, la *tabacina*, lo *Schizophyllum commune*, il *Marasmius androsaceus*, la *Peziza sentellata*, *cupularis*, *lycoperdoides*, *varia*, l'*Helotium aureum*, la *Patellaria atrata* e *culmigena*, la *Stictis versicolor*, la *Schizoxylon commune*, l'*Excipula ornata*, il *Chaetomium elatum*, l'*Hysterium fraxini*, ed *hederac*, l'*Ostropa barbara*, la *Sphaeria stigma*, *radicalis*, *cohaerens*, *Hypoxyylon* ecc. Ne' gasteromiceti lo *Scleroderma vulgare* e *Geaster*, il *Polysaccum acule*, il *Geaster hygrometricus*, il *Tulostoma brumale*, il *Lycoperdon marginatum*, l'*hyemale perlatum*, il *Clathrus cancellatus*, il *Taber aestivum* e il *mixtum*.

Potrei schierare un bel corredo di specie se mi fosse concesso di trattare in dettaglio le minori famiglie; ma i Discomiceti, i Pirenomiceti, gli Homiceti, i Coniomiceti, non possono interessare da vicino se non se coloro che parzialmente si occupano degli studii micologici.

ALGHE. — Se guardasi al mezzo in cui vivono le cellulari marine, si direbbe doversi ripetere le medesime forme su tutti i punti del litorale mediterraneo: all'incontro o per il variare delle condizioni dei fondi, o per la natura delle rocce onde i fondi medesimi sono costituiti, già svariatisime ci si presentano coteste figlie del mare, nel lunghissimo tratto che corre dal Varo alla Spezia. E alcune preferiscono le rupi accarezzate dall'onde, altre i fondi arenosi e le rade tranquille, quali l'acque temperate dall'affluenza dei fiumi, quali le pozze salmastre frequenti lunghe le spiagge, quali infine emergono dall'onde per inghirlandare gli scogli che si sollevano sullo specchio del mare, altre si celano negli abissi più cupi e pro-

fondi. Gli è per ciò che seguendo la spiaggia, via via ci si affacciano delle specie che sembrano obbligate a definite località. La *Caulerpa prolifera*, per esempio, non trovasi che alla Spezia, la *Saccorrhiza mediterranea*, e la *Polysiphonia delphina* nel golfo di Portofino, la *Bangia lutea* sui maeigni del molo all'ingresso del nostro porto, la *Polysiphonia Montagnei* e la *Wrangelia* solo nel mare di Nizza, le *Ulve*, la *Grateloupia verruculosa*, il *Gelidium corneum* e le sue innumerabili varietà, la *Rhodomela pinastroides*, la *Polysiphonia fruticulosa*, le *Cystosira*, il *Ceramium rubrum*, *ciliatum*, *dianthum*, la *Peyssonellia*, in ogni punto della spiaggia.

Altre specie come le *Liagora*, il *Codium Bursa*, lo *Sphaerococcus coronopifolius*, la *Digenea*, la *Laurencia pinnatifida*, la *Phyllophora nervosa*, rare volte si accostano al lido, e quasi sempre raccolgonsi in secco rigettate dai flutti. V'ha finalmente alcune specie che si potrebbe credere esserci state importate colle navi che dall'Oceano approdano ai nostri lidi, come appunto l'*Ectocarpus litoralis*, la *Saccorrhiza bulbosa* ecc., alle quali non ho dubitato concedere il diritto di cittadinanza, dacchè si sono pienamente accomodate alle nuove condizioni locali in cui il caso le ha poste.

La vegetazione delle Alghe del nostro mare rimane pressochè stazionaria durante l'inverno, poichè il ripetuto martellare delle onde contro la spiaggia, onde le stesse *Cystosire*, i robustissimi *Sargassi*, e la *Rodomela* ne sono malconee, si oppone allo sviluppo delle specie più delicate e sottili; nondimeno ve n'ha alcune, la *Laminaria debilis*, l'*Asperococcus compressus* e *sinuosus*, la *Chorda Lomentaria*, la *Cutleria pardalis*, che non trovansi in perfetto sviluppo che all'uscire dell'inverno, oltre il quale, in breve spazio di tempo, le vedi deteriorare, spappolarsi, sparire.

Inesauribile è la Flora delle acque, e son per dire che basta tuffare una mano nel mare per trarne qualche specie per l'addietra non vista. Nella presente occasione avrei desiderato fornire l'elenco delle Alghe nostrali sì marine che fluviali raccolte negli anni scorsi; ma non essendomi riescito, a tutt'oggi, di procurarmi le opere algologiche più importanti testè venute alla luce, mi è d'uopo restringermi alla sola indicazione delle specie trovate posteriormente alla pubblicazione del mio *Specimen Algologiae Ligusticae*, intorno alle quali non mi rimane alcun dubbio.

NOVITÀ ALGOLOGICHE

FUCEE.

Cystosira granulata Turneri *Montagn.*

LAMINARIE.

Saccorbiza bulbosa mediterranea *D.Ntrs.* ⁽¹⁾

Laminaria debilis laciniata *D.Ntrs.*

SIPHONACEE.

Desmarestia filiformis *J. Agardh.* ⁽²⁾

DIETETICE.

Punctaria latifolia *Grev.*

Asperotrema bulbosus *Lamour.*

Spatoglossum Spanneri *Menegh.*

Cutleria multifida *Grev.*

Dictyota repens *J. Agardh.*

linearis *J. Agardh.*

CORDAISE.

Mesogloia Leveillei *Menegh.*

mediterranea *J. Agardh.*

Asterotrichia ulvicola *Zanard.*

SPACULARIE.

Sphaerularia tribuloides *Menegh.*

tribuloides radicata *D.Ntrs.* ⁽³⁾

ECTOCARPEE.

Ectocarpus Notarisii *Menegh.*

geminatus *Menegh.*

racemifera *Menegh.*

elegans *Menegh.*

alveus *D.Ntrs.*

flagelliformis *Kütz.*

verrucelliferus *D.Ntrs.* ⁽⁴⁾

lactus *Agardh.*

litoralis *Agardh.*

CERAMIE.

Moosporus pedicellatus *Solier.*

Callithamaina botryticum *D.Ntrs.*

subtilissimum *D.Ntrs.*

Cabellae *D.Ntrs.* ⁽⁵⁾

vermicularae *D.Ntrs.* ⁽⁶⁾

Giraudyi *Solier.*

flagelliferum *D.Ntrs.* ⁽⁷⁾

calcaratum *D.Ntrs.*

Crouania Solieri *D.Ntrs.* ⁽⁸⁾

C. implexa et intricata *Sol. pl. nicc.*

Griffithsia pumila *D.Ntrs.* ⁽⁹⁾

phyllamphora *J. Agardh.*

opuntoides *J. Agardh.*

Ceramium Digneae *D.Ntrs.*

Spyridia clavulata *J. Agardh.*

CORALLINEE.

Jania corniculata *Lamour.*

Amphura amethystina *Zanard.*

Melobesia pustulata Lamour.
Lithophyllum cristatum Menegh.
incrustans Philip.

RODOMELES.

Dasya simpliciuscula Agardh.
Polysiphonia tennesiana D.Ntrs.
 { *Notarisii* Menegh.
 tenella Sp. alg. lig.
 Jacobi D.Ntrs.
 subtilis J. Agardh. non D.Ntrs.
 Ceramium Morisianum Bertol.
 decipiens D.Ntrs.
 capillata D.Ntrs.
 inconspua D.Ntrs.
 forcipata J. Agardh.
 funebria D.Ntrs.
 bellula D.Ntrs.
 pulehella D.Ntrs.
 variegata Zanard.
 tinctoria D.Ntrs. ⁽¹⁰⁾
 delphinia D.Ntrs. ⁽¹¹⁾
 stenocarpa Kutz.
 rigens Zanard.
 aculeata Montagn. D.Ntrs. Sp.
 Alg. Lig.
 barbatula Kutz.
 tripianota Agardh.
 spora Sp. alg. lig.
 Meneghiniana D.Ntrs. ⁽¹²⁾
 spinella J. Agardh.
 parasitica Endl.
 Corinallii Menegh.
Absidium corallinum Agardh.

CONDRIE.

Laurencia dasyphylla Grec.
 { *obtusa* Lamour.
 hybrida Sp. alg. lig.
 pinnatifida Osmondia Montagn.
Lomentaria tasachemis D.Ntrs.
Chondrothamnion confertius Menegh.
 robustum D.Ntrs. ⁽¹²⁾
 rigidum D.Ntrs. ⁽¹¹⁾

CAITTOSEME.

Chrysomelia pinnulata J. Agardh.
Girardinia furcellata Montagn.

DELESSARTIE.

Plocamium mediterraneum Menegh.

ULVACE.

Porphyra livida D.Ntrs.
 nobilis D.Ntrs. ⁽¹⁰⁾
Ulva lactuca Agardh.
 rigida Agardh.
Zigua marginata Endl.
 confervicola D.Ntrs.
Bangia tristis D.Ntrs. ⁽¹⁶⁾
 lutea J. Agardh.
 fusco-purpurea coruscans Sp. alg.
 lig.
 marialis D.Ntrs. ⁽¹⁷⁾
 fusco-purpurea crinalis D.Ntrs. ⁽²⁾
 Boryi D.Ntrs. ⁽¹⁸⁾
 repens Zanard. ex Menegh.
Porphyra Boryi Montagn.

STROMEA.

Acanthomec stellata Agardh.
Codium elongatum Agardh.
 simplex D.Ntrs.
Bryopsis tenuissima Moris et D.Ntrs.
 comoides D.Ntrs.
 implexa D.Ntrs. ⁽¹²⁾
 dichotoma D.Ntrs.
 saburralis D.Ntrs. ⁽¹⁰⁾
 simplex Menegh.
 duplex D.Ntrs.
 myura J. Agardh.
 Pasizzei D.Ntrs. ⁽¹¹⁾
 Vaucheria caespitosa Agardh.

CHETOPORACE.

* *Chaetophora endiviarifolia* Agardh.

CONFERVÆ.

- * *Cladophora glomerata* Kutz.
 * *crispata* Kutz.
prolifera Kutz.
ramulosa Menegh.
flavescens Kutz.
comosa D.Ntrs. ⁽¹¹⁾
 * *Oedogonium rivulare* Kutz.
Diploneura { *spectabile* D.Ntrs. ⁽¹²⁾
 Conferva terreæ similis D.Ntrs.
 G. Bot.
 intermedium D.Ntrs. ⁽¹³⁾

* ZIGNEURÆ.

- Spirogyra decimina* Link.
quinnia Link.
Zygurus cristatus Agardh.

OSCILLATOIRIÆ.

- * *Seytonema Myochroon* Agardh.
 * *piligerum* D.Ntrs. ⁽¹⁴⁾
Lyngbya Brignolii D.Ntrs.
coruscans D.Ntrs.
 * *Oscillatoria Friesii* Agardh.
 * *nigra* Fench.
authracina D.Ntrs. ⁽¹⁵⁾

* NOSTOCINÆ.

- Nostoc commune* Fench.
crispum D.Ntrs.
muscorum Agardh.
sphaericum Fench.
lichenoides Agardh.
cylindrosporum D.Ntrs.
Anacystis minuta Menegh.
Pleurococcus angulosus Menegh.

(11) L'asterisco preposto ai nomi di tribù o di specie, accenna alghe di acqua dolce o terrestri.

DIAGNOSI DELLE SPECIE MENO NOTE

- (¹) *SACCORRHIZA BULBOSA MEDITERRANEA* — Nel golfo di Portofino. Differisce dall' oceanica per le dimensioni molte volte minori, la fronda intiera, brevemente stipitata, carnosa, fragilissima, ludente. I più grandi de' miei esemplari misurano tutt' al più due decimetri e mezzo in lunghezza, nè presentano talami; quindi il sospetto che gli individui fin qui osservati non siano ancor giunti al loro ultimo grado di perfezione.
- (²) *DESMARESTIA FILIFORMIS* — M' è stata inviata con altre alghe raccolte sulla spiaggia di S. Remo dall' egregio farmacista sig. Francesco Panizzi. Specie rarissima.
- (³) *SPHACELARIA TRIBULOIDES RADICATA* — Cresce in cespuglietti isolati, pennelliformi, e si distingue dal tipo di questa specie pel filamento primario, che colla sua parte inferiore, costituita di articolazioni semplici, alla stessa maniera di un filo confervoideo, penetra il tessuto del *Codium Bursa* sui cui vive parassitica. Le annesse figure rappresentano la parte inferiore della fronda, alcuni de' suoi ramoscelli e i propaguli triboliformi che particolarmente caratterizzano la specie.
- (⁴) *ECTOCARPUS VERMICELLIFERUS* — *laxiuscule caespitosus; filis alternatim ramosissimis, ramis extimis tenuissimis, flaccidis, comantibus; articulis diametro aequalibus, vel plerumque brevioribus, endochromate lacte viridi-nitente, in sicco lobato vel in globulos 2, 3, transverse seriatos diviso; antheridiis pedicellatis filiformibus, lateralibus terminalibusve.* Genova. Cespuglietti di due oncie all' incirca d' altezza di un bel colore verdognolo.
- (⁵) *CALLITHAMNION CABELLAE* — *filis sensim attenuatis bifarie tripinnatis, pinnis pinnaulisque strictis, alternatim ex unoquoque geniculo prodeuntibus, ramulis pinnularum inferioribus simplicibus,*

aculeiformibus, furcellatisve, superioribus bifurcellatis, extremis brevissimis corymbulosis, arcte contiguis; articulis diametro duplo longioribus; tetragonis ellipticis inter ramellos terminales conglomeratis. — Cresce sui rami del *Codium tomentosum*. Frondi riunite in fascetti, minutissime, di cinque o sei millimetri di altezza.

- (⁶) *CALLITHANION VERMICULARAE* — filo flexuoso, basi vage, superne ad unumquodque geniculum alternatim ramoso, ramisque inferius undis superne confertim ramulosis fastigiatis, ramulis inferioribus simplicibus, caeteris plerumque furcatis, elongatis, tenuissimisque; articulis fili primarii inferioribus diametrum aequantibus, caeteris diametro duplo longioribus; tetragonis ellipticis, copiosissimis ut plurimum unilateralibus. — Trovasi esso pure sul *Codium tomentosum* e somiglia al precedente pel colore porporino e le dimensioni, ma si distingue per il modo di divisione della fronda. Nella tavola, la parte inferiore del filamento principale, e alcuni ramoscelli co' loro tetragonii.
- (⁷) *CALLITHANION FLAGELLIFORME* — filo primario radiculis apice inflatis e geniculis exentibus repente, ramis erectis, distiche simpliciter pinnatis, pinnis oppositis patentibus, saepe bisve furcatis, brevibus, junioribus spiniformibus, demum in penicillos confertos filorum tenuissimorum decompositis; articulis fili primarii diametro quintuplo longioribus; tetragonis glomeratis sphaeroideis, filis penicillorum lateralium obvallatis. — Parassitico sul *Codium tomentosum*. I suoi rami arrivano appena all'altezza di tre o quattro millimetri. Le figure rappresentano porzioni del filamento colle sue radichette, e un ramoscello carico di tetragonii.
- (⁸) *CODONIA SOLIERI* — fronde filiformi lubrica a basi ramosa ramis, ramisque alterne patentibus sensim sensimque brevioribus, conformibus; fili axilis ramellis repetito trichotomo-corymbosis, sursum tenuioribus, arcuissimisque stipatis vestito, articulis diametro longioribus, supremis brevissimis disciformibus; tetragonis inter penicillos laterales solitariis, sparsis. — Sulla *Digenea*, rarissima.
- (⁹) *GRIFFITHSIA PUNILA* — filo pluries dichotomo ramisque divaricatis, rigidiusculis, ad genicula tumescentibus, nodulosis, articulis inferioribus brevissimis, mediis fili primarii ramorumque diametro sesqui, duplove longioribus, ramulorum extremis brevis-

sinis; faveolis alutibus involucri e filis furcellatis copiosissimis, conniventi-incurvis capituliformi obvallatis, pedicello uniarticulato, saepius inclinato, nutantibus. — Sulla *Digenea*, rarissima! Ha appena un centimetro d'altezza, i capolini molto voluminosi rimpetto alle dimensioni di tutta la fronda.

- (¹⁰) *POLYSIPHONIA TINCTORIA* — *dichotoma ramosissima, filo primario setaceo, ramisque erectiusculis subapplanatis, ramulis longissimis, confertis, comantibus, tenuibus, lubricis, invicemque coalescentibus, articulis subtrivenosis, fili primarii diametro multo brevioribus, secundariis diametro aequalibus, ramulorum sesquilongioribus, supremis iterum diametro aequalibus; tetragonis ramulis innatis, sparsis.* — Fuori il porto. Biunciale, di colore alquanto fosco, principalmente nella parte inferiore della fronda; tinge la carta, a cui aderisce tenacemente, di un bellissimo colore porporino.

- (¹¹) *POLYSIPHONIA DELPHINA* — *filo basi scutolato, flexuoso, inferne simplici, continuoque opaco, pluries alternatim remoteque ramoso, ramis inferioribus patentissimis superioribusque alterne ramulosis; ramulis subaequidistantibus, inferioribus penicillato corymbosis, superioribus sensim sensimque longioribus, tenuioribusque comantibus; articulis ramorum primariorum obscure articulatarum plurivenosis, geniculis contiguis, caeterorum diametro sesquilongioribus trivenosis, ramulorum terminalium diametro aequalibus; keramidiis ovatis breve pedicellatis, sporis pyriformibus, tetragonis ramulis innatis moniliformi-seriatis.* — Nel golfo di Portofino sulle foglie della *Zostera marina*. Per l'aspetto si accosta alla *P. Ruchingeri*.

- (¹²) *POLYSIPHONIA MESEGINIANA* — *gelatinosa, lubrica, filo ramisque primariis alternis ramosis, crebre punctato-lineolatis, continuis, ramis, ramulisque superne decreascentibus, confertioribusque comantibus pyramdato; articulis ramulorum extimorum brevissimis tripunctatis, apice penicillos florum tenuissimorum, autheridiaque fasciculata, oblonga gerentibus.* — Genova, fuori il porto. Frondi di due once di lunghezza, filamenti tenaci, inferiormente di color fosco, superiormente in un coi ramoscelli di color carneo, pallido.

- (¹³) *CHONDROTHAMNION ROBUSTUM* — *fronde labrica, tereti-compressa, lineari, decomposito-pinnata, irregulariterve ramosa, pinnulis*

ovato-lanceolatis obtusiusculis alternis, invicem conglutinis; keramidiis lateralibus, rotundatis, vertice poro dehiscentibus, sporis conglomeratis; tetragonis sparsis ramulis innatis. — Genova sopra altre alghe. Non può essere paragonato al *Chondrothamnion confertum*.

- (14) *CHONDROTHAMNION RIGIDUM* — Ritrae l'aspetto della *Lomentaria parvula*, ma nessuno de' suoi rami presenta articolazioni. Si distingue dal precedente, di cui forse non è che una forma, per la statura minore, la fronda più sottile di colore tra l'olivastro ed il giallognolo, pei ramoscelli eretti, assottigliati all'estremità e inestricabilmente conglutinati gli uni cogli altri. Finora non m'ha presentato che tetragonii a miriadi dispersi nello strato periferico dei rami.
- (15) *PORPHYRA LIVIDA* e *NOBILIS* — Affini l'una e l'altra alla *P. vulgaris*, nondimeno se ne distinguono pei gonidii di colore sbiadito, piuttosto distanti, non quaternati. La *P. nobilis* poi differisce dalla *livida* pei gonidii più grossi, sparsi, non ravvicinati a due a due.
- (16) *BANGIA TRISTIS* — *frondibus filiformibus, margine toto diaphano limbatis, in caespitem atrum laze implexis, rigidiusculis, longissimis, junioribus aequalibus, adultis crassioribus valde torosis, gonidiis atro-violaceis, primum rotundato-lentiformibus, crassis, contignis, diametro duplo triplove brevioribus, dein tem-nogenesi repetita numerosissimis inordinate vel subquaternatim dispositis, irregulariter cuneatis.* — Nel porto sugli scogli a fior d'acqua. Nella tavola si sono figurati alcuni frammenti di frondi di diversa età.
- (17) *BANGIA MARTIALIS* — *frondibus filiformibus, tenerrimis, tenuissimisque, flaccidis, lubricis, gonidiis pallescentibus, diaphanis, juniorum cylindraceis uniserialibus diametro duplo triplove longioribus, dein transverse divisis, dilatatisque disciformibus, diametro duplo, triplove brevioribus, senio vel longitudinaliter dimidiatis, subbiseriatis, singulove quadripartito subquaternato-biseriatis.* — Genova fuori il porto, talvolta in società colle *Bangia lutea*. Frondi sottilissime di color rosso, quasi invisibili ad occhio nudo.
- (18) *BANGIA BORYI* — *psilla, lacte purpureo, densissime caespitosa, frondibus ab ortu filiformibus, sensim superiori parte ex-*

planatis, linear-lanceolatis, linear-spathulatis, obtusis, vel apice attenuatis; gonidiis primariis simplicibus natiserialis, cylindraceis, diametro minoribus, aequalibus, duplo longioribus, dein gradatim dilatatis discoideo-rotundatis, quadripartitisve, tandem in stratum simplex dispositis, rotundatis, ovoideis, angulosisve. — Riveste a guisa di fitto tomento il *Gelidium cornutum*. Giunge al più a cinque millimetri di altezza. Sarei proclive a considerare questa forma che unisce le Porfire alle Bangie, come un genere proprio che chiamerei *Porphyrites*.

- (19) *BRYOPSIS IMPLEXA* — *compacte caespitosa lubrica, laete viriditens; filis flaccidissimis alterne confertaeque ramosis, ramisque erectis, alterne ramellosis, comantibus, ramalis fili primarii superne sensim abbreviatis confertissimis, ramorum mediis subinde elongatis axilem superantibus erectis.* — Fuori il porto in cespugli di un palmo di larghezza attaccati ad altre alghe. La lunghezza dei filamenti principali è di un'oncia all'incirca, essi sono così tenui che isolati quasi non veggonsi ad occhio nudo.
- (20) *BRYOPSIS SABURRALIS* — *filis lae caespitosis fasciculatis repetito dichotome-corymbosis, axillis acutis, ramis ad dichotomiarum originem filisque hinc inde constrictis confervoides, ramellis terminalibus perumque abbreviatis, obtusis.* — Genova e Nizza, predilige i fondi arenosi. A primo aspetto si potrebbe scambiare con una specie di *Cladophora*.
- (21) *BRYOPSIS PANIZZII* — *lae caespitosa, frondibus simplicibus circumscriptione linear-lanceolatis obtusis, retusisve, subinde supra medium simpliciter furcatis, fere a basi vestitis ramellis confertis, tenuissimis, flaccidis, fili axilis sensim attenuati diametrum 4, 5 longitudine superantibus, supremis abbreviatis apicem fili ipsius promiunt denudati non attingentibus.* — S. Remo, Panizzi. — Di un bel verde metallico; è la più bella del nostro mare. Raggiunge otto o nove centimetri di altezza: i suoi fili hanno la grossezza di una penna di passero. Affine alla *nyara* e *muscosa*, ma a mio avviso sufficientemente distinta da amendue.
- (22) *CLADOPHORA COMOSA* — *filis densissime caespitosi fasciculatisve tenuissimis, multoties alterne remote ramosis, ramis ramosos distantes, alternos, filiformes, elongatos, erectos, tenuissimasque emittentibus, articulis filorum axilium diametro quadruplo quintuplo longioribus, ramorum inferiorum tri-quadr*

longioribus, ultimis brevissimis ad genicula contractis. — Genova, su altre alghe. Cespugli rigide di oltre un palmo di lunghezza, fascicolati, di un bel verde giallognolo, appena aderenti alla carta.

- (²²) *DIPLOXEMA* nov. gen. — *filis simplicibus, callo scutiformi affixa, basi breviter continua, reliqua parte articulata, articulis dimorphis: articuli inferiores cylindracei, geniculis subaequalibus, rigidiusculi, gonidiis saturate viridibus farcti, superiores saepe annotiati, sensim ampliores teneriores, ad genicula plus minusve constricti, gonidiis perifericis luteo-virentibus.*

DIPLOXEMA *SPECTABILE* — *filis solitariis, vel ex eodem callo scutulato binis, ternisve ultra setaceis, demum longissimis, inferiori parte rigidis, aequalibus, saturate viridibus, articulis infimis diametro longioribus, reliquis plerisque diametro aequalibus; superiori parte ad apicem usque lutescentibus articulis membranaceis, sensim sensimque dilatatis, ob genicula valde constricta subrotundatis, moniliformibus.* — Genova.


- (²³) *DIPLOXEMA* *INTERMEDIUM* — *filis solitariis vel ex eodem callo binis, ternisve, capillaribus, inferne aequalibus rigidiusculis fusco-virentibus, superiori parte lutescentibus duplo crassioribus, vix ad genicula articulorum constrictis; articulis inferioribus diametro plerumque longioribus, superioribus membranaceis, diametro aequalibus vel vix longioribus.* — Genova, simile alla precedente, ma molto più tenue. A questo genere riferisco anche la *Conferva aerea*. — Le figure annesse rappresentano alcune parti dei filamenti di grandezza venti volte maggiore del vero.

- (²⁴) *SCYTONEMA* *MILIGERUM* — *late caespitosum, crustaeforme; filis erectis, inferne simplicibus, superne penicillatim ramosis, ramis simplicibus, elongatis, luteo-olivaceis, apicem versus longe attenuato-subulatis, diaphanis, piliformibus, gonidiis subrotundis.* — Ne' siti bagnati da continuo stillicidio lunghesso l'acquedotto.

- (²⁵) *OSCILLATORIA* *ANTHRACINA*. — *caespitoso-pulviniformis, mucosa, fuscescens; filis tenuissimis, flexilibus, contextis, radiantibus, oscillantibusque, apice attenuato-obtusiusculis, apiculatisve, articulis diametro dimidio brevioribus.* — Nel porto di Nizza, però in un sito ove l'acqua è temperata dall'affluenza di un ruscelletto. — Essiccata assume un colore nero-lucido.

P. II.

A. 20.



A. 100.

Callithrix

Bangia Boryi. Dntes.

Dimorphotrichia Spectabilis. Dntes.



REGNO ANIMALE

ZOOFITI

Non abbiamo, a mia notizia, intorno ai Polipi coralligeni del mare ligustico che il saggio sui Zoofiti del golfo della Spezia del chiarissimo cav. Bertoloni ¹, e l'esposizione delle specie del mare nizzardo del Risso ². Nel breve periodo di tempo concessomi per l'esame di questa classe di esseri, che fanno società colle Alghe, dalle quali talvolta a mala pena si distinguono, mi è riuscito di riunire quasi tutte le specie con nitidezza descritte dal sullodato cav. Bertoloni; ma in quanto alle Rissoane, e intendo particolarmente di accennare le più vistose, ve n'ha tuttavia moltissime che io non conosco che di nome, e che non ho potuto vedere in nessuna delle private raccolte di curiosità naturali esistenti presso i signori dott. Rosellini e dott. Savignone, e neppure nelle collezioni del rev. sig. don Carlo Zino, e dei signori Giuseppe e Gaetano Cabella, per numero e per iscelta di oggetti pregevolissime.

¹ Specimen Zoophytorum Portus Lunae in Amoen. ital. 1819. p. 246 a 274. — Memorie sopra alcune produzioni marine del golfo della Spezia, negli atti della Società Italiana, Modena 1835.

² Histoire naturelle des principales productions de l'Europe méridionale, vol. v, Paris 1826.

Colle Coralline, le Janie, le Amfiroe, le Melobesie, l'Alimeda, l'Acetabularia, le Liagore, intorno alla cui natura vegetabile oggimai non cade alcun dubbio, debbonsi pure escludere da questa classe di animali le Nullipore, che il chiariss. dott. Nardo ha dimostrato appartenere alle Alghe ¹.

I Zoofiti più robusti e cespugliosi, generalmente, non trovansi presso di noi che a molta distaaza dal lido, o nei seni più profondi, d'onde a easo son tratti o colle reti o coi palamiti. Però non ho veduto finora che un solo esemplare dell'*Antipathes Larix* proveniente dalla Spezia, un solo della *Gorgonia verticillaris*, pochissimi di *Cariofillie*, ecc. Più comuni le Retepore, le Cellepore, le altre Gorgonie, se ne veggono superbi esemplari, pescati in diverse stazioni, quasi in tutte raccolte. Le specie pusille, che vivono attaccate ad altri polipai, o più spesso sulle Alghe, alcune delle quali sembrano essere preferite, o sia in ragione della loro consistenza, o della profondità in cui stanno celate, con ispecie predilezione, riboccano per ogni dove. Così la *Phyllophora uerrrosa*, la *Rodomela*, la *Digenea*, e in genere le maggiori Floridee, forniscono da loro sole più specie, che non tutto il resto della schiatta algologica.

Nel presente prospetto, che non mi dissimulo non essere che un abbozzo molto incompleto, condotto sulle basi disposte dal nostro Bertoloni, ho preferito le serie proposte nel Manuale del Blainville ², nè ho bilanciato nell'ammetterne i generi, perchè più naturali, e a mio giudizio assai meglio cerniti che nol sono nell'opera sugli invertebrati del celeberrimo de Lamarck ³. Debbo pur confessare che i pochi studii che io ho fatto su questi esseri vertono sur esemplari da gran tempo raccolti, quindi non sarà maraviglia se nelle poche annotazioni suggeritemi dall'esame di alcuni polipai, non è cenno degli animali da cui sono prodotti.

Ho dovuto esser parco nell'indicazione dei Milleporeici, non già perchè il nostro mare scarseggi di queste produzioni, chè anzi in copia

¹ Atti della seconda Riunione degli Scienziati Italiani, Torino 1841. p. 185. — Vedasi anche Derraine sur le Corallines, negli *Annal. des science. naturell.* 2.^o sér. vol. XVII. 1842.

² *Manuel d'Artinologie*, Paris 1834. — Vedasi altresì Lamouroux, *Histoire de polypiers coralligènes flexibles*, Caen 1816.

³ *Histoire naturelle des animaux sans vertèbres*, 2.^o édition, par Deshayes et Milne Edwards, Paris 1836. vol. II.

ne ho osservate, e per avventura taluna non ancora descritta, per il solo motivo, che fin qui non ho potuto paragonarle nè coi tipi nè colle figure delle moltissime specie già conosciute. Le Spugne, tranne la semitubulosa, gli Aleioni, le Pennatule, ho tolte di pianta dai lavori del Bertoloni. Finalmente in quanto alle novità e alle specie meno note registrate dal Risso rimando al di lui lavoro poco sopra allegato.

SERTULARIINI.

- Tubularia indivisa* L.
ramosa L.
Clytia Uva Lamx.
volubilis Lamx.
Sertularia Polytonias L. (Bertol. Sp. Zoophyl.)
ahietina L.
 { *Dysomea pumila* Lamx.
 { *Sertularia pumila* L. (Bertol. Sp. Zooph.)
Aglaophenia Myriophyllum Lamx. Genova, sig. Verany.
 { *Pluma* Lamx.
 { *Sertularia Pluma* L. (Bertol. Sp. Zooph.)
 { Spec? (¹)
 { *Sertularia pinnata* Bertol. Sp. Zooph.
Amathia lendigera Lamx.
 { *unilateralis* Lamx.
Aetia anguina Lamx.
 { *Cellaria anguina* Ell. et Sol. (Bertol. Sp. Zooph.)

CELLARIANI.

- { *Eucrates?* (²)
 { *Cellaria pyriformis* Bertol. Sp. Zooph.
 { *Vorticella polygona* Esp., ex Bertol.
Bicellaria { *reptans* Blainv.
 { *Crisia reptans* Lamx.
 { *Cellaria reptans* Bertol. Sp. Zooph.

- Bicellaria* { *plumosa* Blainv.
 { *Crisia plumosa* Lamx.
Crisia eburnea Lamx.
Acanarthis neritina Lamx.
Cellaria { *Salicornia* Lamx.
 { *farcinimoides* Ell. et Sol. (Bertol. Sp. Zooph.)
 { *cereoides* Ell. et Sol.
 { *Flustra angustiloba* Lamck.
 { *Crisia flustroides* Lamx.
Phaerusa tubulosa Lamx. Hist. tab. II. fig. 1. a. b. c. (³)

TUBULIPORANI.

- Tubulipora patina* Lamck.
 — *β. minima* (¹)
Obelia tubulipora Blainv.

MILLERPORICI.

- Escharina* { *perlacea* M. Edw.
 { *Cellepora perlacea* Delle Chiaj. tab. 157. fig. 4. 5.
 { *radiata* M. Edw.
 { *Cellepora radiata* Lamx.
 { *Macry* M. Edw.
 { *Cellepora Macry* Delle Chiaj. tab. 158. fig. 9-10.
 { *Discopora verrucosa* Lamx.
 { *Cellepora verrucosa* L.
Cellepora pumicosa Lamx. (Bertol. Sp. Zooph.)
incrassata Blainv.

- { *Eschara fascialis* Lamck.
 { *Millepora fascialis* L. (Bertol. Sp. Zooph.)
 { *Millepora* { *reticulata* Lamck.
 { *Millepora reticulata* L. (Bertol. Sp. Zooph.)
 { *cellulosa* Lamck.
 { *Millepora cellulosa* L. (Bertol. Sp. Zooph.)
 { *frondiculata* Lamck.
 { *Polytremma corallinum* Risso, *Hist. p.*
 540, fig. 43, 46. (?)
 { *Millepora rubra* Ell. et Sol.
 { *Polytremma miniacum* Blainv. p. 410,
 tab. 79, fig. 4.
 { *Myriapora truncata* Blainv.
 { *Millepora truncata* L.

LAMELLIFERI.

- Caryophyllia { *Cynthia* Lamck.
 { *Madrepora Cynthia* Ell. et
 Sol. (Bertol. Sp. Zooph.
 in not. ad *Madr. rume-*
 neum) Canogli, D. Sa-
 vignone.
 Sp? (?)
 { *caespitosa* Lamck.
 { *Madrepora caespitosa* L.
 (Bertol. Sp. Zooph.)
 { *ramosa* Lamck.
 { *Madrepora ramosa* L. (Ber-
 tol. Sp. Zooph.)

CORALLI.

- Corallium { *rubrum* Lamck.
 { *Isis nobilis* L.

- Antipathes Larix Esp. — Spezia. March.
 Nicolò Brignole.
 Gorgonia Flabellum L. — Rapallo, sigg.
 G. e G. Cabella e rev. D. C. Zino.
 Gorgonia verrucosa L. (Bertol. Sp. Zooph.)
 furcata Lamck.
 ceratophyta z, 5, z. Bertol.
 Sp. Zooph. "
 { *stricta* Bertol. Sp. Zooph.
 { *G. Bertoloni* Lamck.
 verticillaris Lamck.

SPUGNE.

- Spongia subcarnosa Bertol. Mem. fig. 2.
 a, b.
 Spongia cinnabarinus Bertol. Mem. fig. 3.
 damaecornis dilatata Bertol. Mem.
 senitubulosa Lamck. — Arenzano,
 glubosa Bertol. Sp. Zooph.
 acicularis Bertol. Sp. Zooph.

ALCIUM.

- { *Lobularia palmata* Blainv.
 { *Aleyonium Exos* Bertol. Sp. Zooph.
 et Mem.
 { *Anthelia Domuncula* Blainv.
 { *Spongia Domuncula* Bertol. Sp. Zooph.
 { *Briareum molle* Blainv.
 { *Gorgonia mollis* Bertol. Sp. Zooph.
 Aleyonium coralluoides Bertol. Sp. Zooph.

PENNATULE.

- Pennatulula rubra Bertol. Sp. Zooph.
 grisea Bertol. Mem.

ANNOTAZIONI

- (¹) *SERTILARIA PENNATA* Bertoloni — Ho addotto questa specie perchè descritta dal chiarissimo Bertoloni, ma non avendone veduto nessun esemplare, mi trovo impossibilitata a decidere a cui delle due *Aglaophenia* di Lamouroux, la *pinnata*, cui spetterebbe la figura 16 a A della tavola 11 dell'Ellis, e la *setacea*, rappresentata colla figura 4 D, T della tavola 58 dell'opera medesima, si debba riferire.
- (²) *CELLARIA PYRIFORMIS* Bertoloni — I caratteri di questa specie sono così pronunciati che credo impossibile scambiarela con qualsiasi altra dei Cellariani. La descrizione che ne ha data il Bertoloni è perfetta, ma non posso ammettere seco lui che le cellette si staccino dai ramoscelli a cui sono saldate, sicchè questi appariscano talvolta filiformi e nudi. Dirò più che io dubito fortemente dell'esistenza di cotesti ramoscelli, imperciocchè, cadute le cellette, essi dovrebbero, stante la loro rigidità, presentare un andamento flessuoso, mentre invece si veggono costantemente dritti, e senza alcuna traccia di cicatrici. A mio avviso, le estremità filiformi dei monili, e i ramoscelli parimenti filiformi che nascono dalle divisioni principali del tronco, altro non sono che porzioni degli stessi monili abortiti. Riferisco per ora, e dubitativamente, questa specie alle Eucratee, perchè in esse le serie moniliformi si presentano altrimenti disposte e mancano di stipite. Potrebbe aversi come tipo di un nuovo genere. Si trova comunissima sulla *Phyllophora nervosa*, sulla *Rhodometra pinastroides*, unitamente all'*Actea anguina*.
- (³) *PHAEEREA TUBULOSA* — Non credo cadere alcun dubbio intorno al sinonimo di Risso, poichè questa specie è frequente nel Mediterraneo, e chechè ne dica in contrario il chiariss. Milne Edwards. La figura del Blainville è copiata da quella del Lamouroux.

- (⁴) *TUBULIPORA PATINA MINIMA* — Quasi invisibile ad occhio nudo, biancheggianti, fragilissima; polipaio cialiforme, pellucido, nel lembo largamente ondeggiato, doppiamente striato per delle linee finissime, le une concentriche, le altre raggianti; tubetti centrali, inferiormente saldati tra di loro coll'orificio denterellato. Si trova rarissime volte sulla *Corallina officinalis*.
- (⁵) *POLYTREMA CORALLINUM* — Polipaio lapideo, fragile, di un bel colore porporino durevole; disciforme o variamente lobato, convesso, e per lo più rilevato di protuberanze conoidee, cilindracee o compresse, ottuse o troncate; nella superficie sottilmente reticolato; interiormente celluloso, le cellette aperte nella sommità delle prominenze conoidee troncate. — Si trova attaccato ad altri polipai, e più spesso sulla fronda di alcune alghe, segnatamente sulla *Phyllophora nervosa*. — L'essere questa specie comunissima nel Mediterraneo, e così bene caratterizzata per la forma, il colore, le dimensioni, esclude il sospetto che sotto uno stesso nome passino confusi degli oggetti grandemente diversi, quantunque le descrizioni dei sullodati autori si trovino in contraddizione tra loro, e non ritraggano nè l'una nè l'altra i caratteri che io ho rilevato ne' miei esemplari. — La superficie del polipaio anzichè presentare delle cellule esagone e poligone, è vestita di uno strato corticale sottilissimo, fragile, elegantemente reticolato, impervio, onde le cellette sottoposte non comunicano all'esterno se non se nella sommità delle protuberanze che a guisa di mammille si elevano nella parte superiore del polipaio. La figura di Risso ne ritrae egregiamente l'aspetto, ma è incompleta come è cattiva quella del Blainville.
- (⁶) *CARYOPHYLLIA* — Non può aversi per una varietà della *Caryophyllia ranea*, giacchè ne differisce non solo per la statura, la grossezza dei rami e la loro forma, ma eziandio per la superficie meno scabra, per le lamellette di maggior spessore, nè denterellate, nè confluenti tra di loro nella parte centrale delle stellette. Non oso per ora proporre un nome per questa forma, ma non ho potuto tralasciare di farne cenno, perchè mi sembra la più distinta delle *Caryophyllia* del nostro mare. Fu trovata alla Spezia dal dottore Rosellini.

Il signor Verany a cui dobbiamo, siccome è stato già annunziato, il catalogo di tutti gli animali invertebrati annoverati nella presente guida, ad eccezione de' soli *Zoofiti* trattati dal signor professore De Notaris, ha principalmente seguitato, nella sua classificazione, la seconda edizione della grande opera del Lamarck, *Animaux sans vertèbres* etc. Ma egli non ha con ciò ommesso di ricavare ogni utile particolare dai lavori posteriori e progressivi degli autorevoli naturalisti viventi. Egli ha pertanto messo a taglio, per le *Attinie*, l'ottima monografia del conte Contarini; pe' *Crostacei*, il seguito al Buffon pubblicato dal signor Milne Edwards; per le *Annelidi*, a difetto della desiderata opera speciale, le diverse notizie sparse negli scritti dei signori Savigny, De Blainville, e Delle Chiaie; pe' *Molluschi*, le varie pubblicazioni del già citato Delle Chiaie, del fu Risso, del signor Cantraine e del dottor Filippi di Berlino. In testa ai *Molluschi*, egli ha collocato i *Cirripedi*, posto ad essi assegnato dal Lamarck, dal Rang, dai De Blainville e Delle Chiaie, intendendo soltanto di adattarsi all'ordine fino ad ora il più usitato, e senza tenere in minor conto le recentissime scoperte anatomiche, che hanno indotto i moderni, e tra essi, i sigg. Milne Edwards e Martin Saint'Ange

a rimuovere dai *Molluschi* i *Cirripedi* e a ritenerli intermedi fra i *Crostacei* e le *Anellidi*.

La novità di molte specie e di alcuni generi di questa classe ha resa necessaria l'aggiunta di varie note descrittive, redatte dietro a consciencioso esame e non senza avere sentito il parere dei dotti malacologi, i dottori Ruppel, Delle Chiaie e Costa. Non dubitiamo che non riescano accette a tutti gli scienziati amatori di questo ramo importantissimo e in parte nuovo della zoologia.

Immediatamente dopo la lista dei *Crostacei* del mare ligure, sembrerebbe in acconcio quella degli *Insetti* della nostra fauna, ma non havvi nessuna parità fra il numero delle specie conosciute in questa doviziosissima classe e quello di tutti gli altri invertebrati. Non vi è ristretta località che non conti le sue specie d'insetti a centinaia. Non vi è regione che non le conti a migliaia. Quando mi fossi cimentato a distendere la sterile filastrocca degli insetti nostrali di ogni ordine, quando anco avessi apposto a ciascuno il nome che avrei dovuto cogliere quasi a capriccio nell'anarchia dell'attuale nomenclatura, non mi sarebbero mancati, nè il timore d'aver fatto troppo poco per gli entomologi, offrendo ad essi un lavoro ancora incompleto, segnatamente nei più ordini de' quali non tengo e non conosco collezioni, nè la certezza d'aver fatto troppo per tutti gli altri, trattenendoli a lungo sopra oggetti da essi non ricercati ed eccedendo senza necessità i limiti prefiniti al nostro quarto della guida. Saltando quindi a piè giunti ogni particolarità, dirò solamente ai zelanti ed ai sapienti raccoglitori, a guisa di semplici avvertimenti generali: 1.º, che la fauna entomologica della Liguria partecipa di quella della Lombardia nel versante settentrionale dell'Apennino, di quella della Toscana nella riviera di Levante, e di quella della Provenza nella riviera di Ponente; 2.º, che le caccie le più abbondanti riescono in primavera lungo il litorale, in fine della medesima stagione alle falde meridionali dell'Apennino non che nelle pianure basse del versante a Po, in luglio ed agosto alle cime e negli altipiani delle nostre montagne; 3.º, che i luoghi coltivati non abbondano che in animali nocivi alle piante in coltura, e che di questi, sono moltissimi gl'individui e pochissime le specie diverse; 4.º, che le selve dei faggi non sono ricche in insetti e che i boschi delle castagne ne sono poverissimi; 5.º, che i boschi eedui, nei quali ogni taglio periodico suol distruggere quasi un'intera genera-

zione di esseri viventi, sono molto meno ricchi che i boschi d'alto fusto; 6.º, che le circostanze delle località hanno un'influenza tanto maggiore sopra la specie entomologica, quanto che questa è per indole meno sedentaria o per organizzazione meno atta al volo o alla corsa; 7.º, che la riunione di tutte le annoverate circostanze contrarie mi ha fatto sempre considerare le alture prative dei dintorni di Genova, situate fra il Bisagno e la Polcevera, siccome altri dei punti i meno propizi alla caccia dei *Coleotteri*. È però da credersi che la stessa povertà, forse presa a male dall'entomologo, sarà tenuta a bene dall'abitante, dal proprietario e dal colono. — M. SP.

POLIPI ATTINICI.

Le *Attinie*, conosciute sotto il nome di *Anemone di mare* per la somiglianza che hanno col fiore di quel nome, e di *Ortiche di mare* per la proprietà orticante di molte specie, abbondano sugli scogli, a poca profondità, ora chiuse, ora coi loro lunghi tentacoli sbucciati. Altre, stanno nei fanghi: altre, sopra conchiglie viventi o morte. La *Carciniopodos* vive, in fratellanza col *Pagurus bernardus*, sopra conchiglie univalvi disabitate. La *Rubra* si produce fuori dell'acqua con forza da resistere ai cocenti raggi del sole. Tutte godono della facoltà locomotrice; tutte sono commestibili, ma la preferibile sarebbe l'*Act. viridis*, particolarmente detta *Fidé main* nel vernacolo locale, laddove il suo nome generico sarebbe *Beetorbo*. Ne conosciamo dodici specie distinte.

<i>Actinia verrucosa</i> , Lamark. — <i>Act.</i>	<i>Actinoia effeta</i> , Linneo.
<i>crassicornis</i> , Adanson.	<i>Isaemna bellis</i> , Solander. — <i>Act. bre-</i>
<i>rubra</i> , Bruguières.	<i>vicirrata</i> , Rizzo.
<i>concentrica</i> , Rizzo. — <i>Cari</i> ,	<i>Anemonia cereus</i> , Contarini. — <i>viridis</i> ,
<i>Delle Chiaie</i> .	<i>Lamk.</i>
<i>Aurantiana</i> , D. C.	<i>ciocrea</i> , Cont.
<i>Rondeletii</i> , D. C.	<i>Cerianthus actinioides</i> , D. C. — <i>G. Jsa-</i>
<i>maculata</i> , Brug.	<i>ra</i> , Savigny. (!)
<i>carciniopodos</i> , Otto. — <i>picta</i> ,	—
<i>Rizzo</i> .	

ACALEFI FISALICI.

Gli *Acalefi* sono animali molli, quasi gelatinosi, provveduti internamente d'organi digestivi ed esternamente di stromenti atti alla loro

libera uatazione. Molti sono di una sostanza così floscia che riesce quasi impossibile il toccarli senza offenderli (*Alcinoe*); altri sono di sostanza più solida e assai resistente (*Doliolum*, *Diphya*); altri reggono una specie di conchiglia cartilaginosa inserviente ad uso di vela (*Veletta*); i più sono fosforescenti. Variabile è la loro forma. Il *Cestum* somiglia ad un nastro lungo non minore di un metro, il *Beroe* ad un popone: amendue nuotano per mezzo di ciglia vibratili. La *Diphya* possiede delle cavità natatorie, e si muove a spinte interrotte, mediante le loro alternate contrazioni. La *Veletta*, per controposto, galleggia alla superficie del mare e naviga in balia del vento.

Ne conosciamo dieci specie incontrate nelle acque del golfo ligure.

Stephanomia uaria, Lesson.
Doliolum mediterraneum, Ott.
Cestum Veneris, Less.
Beroe ovatus, Linn.
Callianira binata, Lamk.
 diptera, Péron.

Alcinoe papillosa, D. C.
Diphya Bory, Blainv?
Hippodius luteus, Blainv. — Glebba,
 Ott.
Veletta limosa, Lamk.
Porpita glandifera, Lamk.

ACALEFI MEDUSICI.

Le *Meduse* sono animali liberi, gelatinosi e trasparenti; onde ebbro, in origine, i nomi significativi di *Gelatina di mare*, *Carmarina*, *Carnassa*, non che quello di *Cappellazzo* per la forma d'alcune somiglianti ad un berrettino, ad un disco o ad un cappello di fungo. La sostanza del loro corpo è deliquescente. Alcune sono orticanti e fosforescenti. Sogliono muoversi, con celerità, mediante alternative contrazioni e dilatazioni laterali. Compariscono nelle prime belle giornate di gennaio, e spariscono nel finire di novembre. Nei periodi delle calme, si vedono alla superficie delle acque. I marosi ne rigettano molte sulle spiagge, e allora, le reti dei pesatori sono spesse volte ingombrate da quelli animali inutili all'economia dietetica degli uomini.

Ne abbiamo tredici specie.

Calliroe Basteri, Per.
Danea lucullea, D. C.

Danea proboscidalis, Lamk.
 palea, Per.

Oceania phosphorica, Lamk.

Dequorea mesonema, Per.

forskalli, Lamk.

rissoana, Per.

Pelagia panopyra, Per.

Aurelia aurita, Lamk.

crucigera, Lamk.

Cassiopaea borbonica, D. C.

Rhyzostoma Aldrovandi, Per.

—

ECHINODERMI ASTERICI.

Gli animali di questa divisione, detti volgarmente *Stelle de mè*, abbondano nel mar ligustico. Alcuni vivono nelle grandi profondità, altri nei fanghi ed altri sopra le piante marine. Si aiutano coi raggi del loro corpo, colle loro spine articolate e co' loro pedicelli ritrattili, tanto per mutar luogo, quanto per fissarsi nel sito di riposo. Si nutrono di molluschi nudi o testacei, anzi non è cosa rara il ritrovarne la spoglia nel loro corpo. A mo' d'esempio, questo si è l'unico mezzo di ottenere le *Cancellarie* che giacciono, presso di noi, in impenetrabili profondità.

Comatula Adeone, Blainv. — mediterranea, Lamk.

Eurialus costatus, Lamk. — mediterraneus, Risso.

Ophiura laceria, Lamk.

cordiformis, D. C.

squamata, Lamk.

noctiluca, Viviani.

rubra, D. C.

Ferussaci, D. C.

Asterias aurantica, Lamk.

membranacea, Gmlin.

glacialis, Lamk. — Savaresii

D. C.

bispinosa, Oll.

pentacantha, D. C.

rosacea, D. C.

subulata, D. C.

minima, D. C.

—

ECHINODERMI ECHINICI.

I veri *Echini* abbondano, durante tutto l'anno, sopra gli scogli marini ai quali possono strettamente attaccarsi mediante i loro numerosissimi picci. Le loro ovarie sono molto stimate dai gastronomi, e si mangiano cotte o crude. La *Cidarite* vive a circa 200 metri di profondità. Gli *Spatanghi* amano i terreni fangosi e profondi. Le diverse specie di questo ordine si confondono, dai pescatori, sotto i nomi generali e vernacoli di *Rizzi*, *Zin* o *Castagne de mè*.

Non ne abbiamo riscontrato più di sette specie nostrali.

Fibularia tarentina, Lamk.

P. II.

Spatangus parpareus, Lamk.

6*

Spatangus arcuarius, *Lamk.*
Echinus melo, *Lamk.*
esculentus, *Lamk.*

Echinus saxatilis, *Muller.* — *miliaris*,
Lamk.
Cydonis histri, *Lamk.*

ECHINODERMI OLOTURICI.

Le *Oloturie* si avvicinano al litorale nella bella stagione, e nell'inverno si ritirano nei fondi. La *Bonellia* vive, durante tutto l'anno, nei vacui delle madrepore del porto. Nessuna fa parte del vitto dell'uomo.

Otto sono le specie nostrali conosciute.

Holothuria tubulosa, *Gut.*
Santorii, *D. C.*
Pentata pentacta, *Goldfuss.*
Doliolum, *Grubb.*

Pentata cucumis, *Blainv.*
Siphonculus balanophorus, *D. C.* — *un-*
ius, *Lamk.*
echinorineus, *D. C.*

CROSTACEI.

Molte sono le specie di quest'ordine che s'incontrano nel nostro mare, ma varie fra loro sono poco frequenti o sono poco numerose in individui. Vivono fra gli scogli e le piante marine, o nei erepacci delle rupi. Alcune, le *Gebie*, si sotterrano in parte nella sabbia; altre, i *Paguri*, usurpano le conchiglie disabitate; altre, le *Fronime*, si alloggiano nei doglioli, e con essi galleggiano in superficie al mare; alcuni, i *Bopiri*, vivono parassiti sotto la corazza d'altri crostacei longicaudati, siccome i *Palmoni*, i *Crangoni*, le *Gebie*, ecc. Quelle si affondano sino a 150 o 200 metri, le *Dorippi*, le *Omole*. Queste discendono solamente a 50 o 100 metri, i *Crangoni* e i *Nephros*. Il loro cibo suole essere di sostanza animale. Alcuni si attaccano ai pesci cogli uncini dei loro piedi, le *Anilocre*, le *Nerocile*. Alcuni appiccansi alle loro branchie e vi succhiano il sangue, i generi *Cecrops*, *Caligus*. Altri, colla bocca fornita di un succhiatoio protrattile, appendonsi alle natatoie dei Tonni, le *Branchielle*; altri finalmente mantengono una parte del loro capo conficcata dentro il tessuto moscolare del *Xyphias gladius*, il genere *Penellus*.

Quasi tutti i crostacei sono mangiativi; più apprezzati si hanno i *Palmoni*, volg. *Gambai de mè*. La loro pesca riesce abbondante quando il mare burrascoso ha sconvolto i fondi ed intorbidito l'acqua.

Primeggia poi il *Palinurus vulgaris*, volg. *Aragosta*, più frequente e più stimato dell'*Astacus vulgaris*, volg. *Longobardo*, il quale si pesca accidentalmente alla palamitara o nei tramagli. La pesca più abbondante si fa però colle *nasse*. Il mercato di Genova è sufficientemente provveduto d'individui giovani più teneri e più delicati dai pescatori di Boceadasse, ed abbondantemente dei più grossi e meno ricercati dai pescatori còrsi che li portano da Calvi, e ne trasportano, nella stagione fresca, dei carichi qualche volta di 400 rubbi racchiusi in ceste. Si possono conservare nel porto una quarantina di giorni, e si estraggono all'occorrenza secondo i bisogni della consumazione e l'utile della vendita. Prima della rivoluzione, questo commercio facevasi dai capraiesi.

La massima parte dei nostri crostacei non suole uscire dalle acque marine, e fanno eccezione poche specie dei generi *Grapsus* e *Eriphia* che calano frequentemente a terra. Ma la specie terrestre che s'incontra in Toscana e che abbonda nell'Italia meridionale, non è stata ancora scoperta nella Liguria, almeno a nostra cognizione.

I ruscelli e i laghetti degli Appennini sono anche popolati dall'*Astacus fluviatilis* volg. *Gambao*, e non di rado si vede sul mercato di Genova ove è giustamente ricercato.

Stenorhynchus longirostris — volg. *Aragosta*. — *Inachus longirostris*, *Fabricius*.

Inachus thoracicus, *Risso*.

Herbstia condyliata, *M. Edw.* — *Maia*, *Latreille*, *Mitras*, *Risso*.

Iisa tetradon, *M. Edw.*

corallina, *M. Edw.* — *Inachus corallinus*, *Risso*.

Gibbsii, *Leach*.

armata, *Latr.*

Lissa chiragra, *Leach*.

Maia Squinado, *Rondelet* — volg. *Fanto spoglio*.

vernucosa, *M. Edw.*

Acanthonyx lunulatus, *M. Edw.* — *Maia lunulata*, *Risso*.

Lambrus mediterraneus, *Rouz.* — *Eurygnome Aldrovandi*, *Risso*.

angulifrons, *M. Edw.* — *Monograndis*, *Rouz.*

Xanthus floridus, *Leach*. — volg. *Gritta d'arena*.

revulosus, *Sav.*

Polyarcinus Pagurus, *M. Edw.*

Pilumnus hirtellus, *Pennant*.

Spinifer, *Penn.*

Shurehus genensis, *Leach*, in museo *taurinese*. — *Cleistostoma Gemellari*, *Risso*. *Descr. de' crostacei del golfo di Catania*, 1850.

Eriphia spinifrons, *Herbst*.

Platyonychus nasutus, *M. Edw.* — *Portunus biguttatus*, *Risso*.

Portunus corrugatus, *Risso*.

Rondeletii, *Latr.*

lungipes, *Risso*.

Geoplax angulata, *M. Edw.*

rhomboides, *M. Edw.* — *Au praevar.* var.?

Grapsus varius, *M. Edw.* — volg. *Gritta matta*.

- Calappa granulata*, Fabr.
Ilia nucleus, Leach.
 rugulosa, Rouz. — Praec. var.?
Dorippe isota, Dosc.
Dromia vulgaris, M. Edw. — volg. *Faulo cappelto*.
Homola spioifrons, M. Edw.
 Cuvierii, Risso.
Pagurus Pridaouxii, Leach. — *Beroardos*, Linn. — *solitarius*, Risso et Rouz.
 angulatus, Rouz.
 striatus, Latr.
 callidos, Rouz.
 pietas, Rouz.
 timidus, Risso.
 maculatus, Risso.
 orontos, Rouz.
Porcellio platycheilus, Penn.
Galathea strigosa, M. Edw.
 rugosa, M. Edw.
Seyllarus arcuos, M. Edw. — volg. *Sigé de md.*
Palinurus vulgaris, Linn. — volg. *Aragosta*.
Gebis littoralis, Desm. — volg. *Gambalusso*.
Astacus fluviatilis, Fabr. — volg. *Gambao*.
Homarus vulgaris, M. Edw. — volg. *Longobardo*.
Nephros oervegicus, Leach.
Craegon vulgaris, Fabr.
 cataphractos, Olio. — *Egeon loricatus*, Risso.
 rufipunctatus, Risso.
 fasciatus, Risso.
Alpheus ruber, M. Edw. — volg. *Gambalusso*. — *deotipes*, M. Edw.
Pontonia tyrrhena, Latr. — *Callinassa tyrrhena*, Risso.
Aotomea oliveri, Risso.
Nika edulis, Risso.
Gnathophylum elegans, Latr. — *Alpheus elegans*, Risso. — *Drimo*, Risso.
Hippolite viridis, Risso.
Pandulus narval, M. Edw. — *Pontophilus pristis*, Risso.
Lismata seticauda, Risso.
Palaeon serratus, Penn.
 squilla, Fabr.
 treillinaos, Risso.
Penaeus caramote, Rond.
 membracaceos, Risso.
Pasyphaca sivado, Savig. — *Alpheus sivado*, Risso.
Mysis spiculosa, Leach.
Phyllosoma mediterranea, Leach. — *Chrysoma mediterranea*, Risso.
Squilla maotia, Rond.
 Desmaretii, Risso.
Gammarus locusta, Montf.
Phronima niretensis, M. Edw.
 ? var. *seminulata*, Risso.
Phronima sedentaria, Latr. — ? *Var. custos*, Risso.
Tiphys ovoides, Risso.
Caprella....., Lamk.
Idotea tricuspidata, Desm.
 hectica, Pall.
 emarginata, Fabr.
 appendiculata, M. Edw.
Leptosoma appendiculata, Risso.
Aothora gracilis, Leach.
Tanaïs Carolini, M. Edw.
Ouiscus murinus, Linn.
Porcellio scaber, Latr.
Armadillo officinalis, Dumeril.
Pranyza ventricosa, Risso.
Anceos rpspx, Risso.
Sphaeroma serratum, Fabr.
Lesueurü, Risso.
Rocioela Deshayesiana, M. Edw.
Nerocila bivittata, Risso.
 affinis, M. Edw.
Anilocera mediterranea, Leach.
 physodes, Linn.
Cymothoa oestroides, Risso.
 parallela, Otto.
Bopyros squillarum, Latr.
 gebiarum, Latr. — Var. praec.?
Nebalis Geoffroy, M. Edw.
 Straossi, Risso. — Var. praec.?
Caligus Rissoanus, M. Edw.
Cecrops Latreillii, Leach.

Nemesis carcherium, *Brun.*
Brachiella thynoi, *Cuv.*

Pecollos filiosus, *M. Edw.* — *Penella*
filosa, *Cuv.* — *Lerneopeona*, *Blainv.*

Oltre queste cento e più specie determinate, non mancano, nei riali dell'interno e particolarmente in quelli del versante settentrionale, varii *Gammar* e *Entomostracei*. Ma non ce n'è riuscita, in tempo utile, la giusta determinazione.

ANELLIDI.

Gli *Anellidi* abbondano, in tutto l'anno, nel porto di Genova. Vivono, alcuni tuffati nel fango e nascosti nelle sabbie, altri serpeggiando fra gli scogli e le piante. Molti sono liberi, alcuni giacciono sedentari dentro tubi fabbricati da loro stessi, ora coriacei, ora cornei, ora arenosi, ed in cui si nascondono speditamente ad ogni minaccia di un qualunque pericolo. Sorprendente, per la disposizione a ventaglio delle sue branchie, è l'*Anfritrite* che incontrasi a pochi piedi sott'acqua nel molo vecchio e all'entrata della darsena. Maravigliosi sono il colore bleu orlato di giallo della *Phyllodoce Pareti*, quello delle *Nereidi* vario al paro dell'arco baleno, e quello pure delle sete dell'*Halithea aculeata* che non la cede allo splendore delle gemme. S'impiegano le *Nereidi* volg. *Tremoiri*, le *Arenicole* volg. *Cassoli*, le *Sabellarie* volg. *Vermelli*, per adescare agli ami nelle piccole pesche.

Comprendendovi le *Pseudo-annelese* del *Delle Chiaie*, le specie nostrali conosciute sono le seguenti:

PSEUDO-ANELLOSI-PLANARICI, *D. C.*

Planaria Diequemari, *D. C.*
syphoculus, *D. C.*
lutes, *D. C.*
aurantica, *Cuv.*

ANELLOSI SIPHONOLACEI, *D. C.*

Siphonculus balanophorus, *D. C.*
genneosis, *Blainv.*

ANELLIDI.

ANELLOSI POLICI, *D. C.*

Polis geniculata, *D. C.* — *Meckelia noel-*
losa, *Grubb.*
oculata, *D. C.*
lineata, *D. C.* — *Notospermom.*
Huëcke. — *Bortasia*, *Quoy*
et Gaimard.

Pontobdella muricata, *Lamk.*
Erpobdella vulgaris, *Blainv.*
Branchellioa torpediois, *Sav.* — *Branchiobdella*, *Blainv.*
Siphonostoma diplozonites, *Otto.*
Amphitrite ventralis, *Lamk.* — *Sabella*, *Linn.*, *Sav.* e *D. C.*
lacullana, *D. C.*

Sabellaria alveolata, Lamk. — Hermellia, Sav. — Amphitrite, Cuv. et D. C. — Sabella, Linn.
 Pectioaria aoricoma, Lamk. — Sabella, Linn. — Amphitrite, Sav. — Cistena, Leach.
 Sabella couchilega, Lamk., Cuv., Blainv. — Amphitrite, Brug., Mull., D. C.
 cristata, Mull.
 Serpula contortuplicata, Linn.
 filigrana, Linn.
 Spirothis antilloides, Lamk.
 Vermilia triquetra, Blainv.
 Stereopsis Thalassemoides, Otto (?). Thalassemia scutatum, Ranzani.
 Lombricus terrestris, Linn.
 Arenicola piscatorum, Lamk.
 Glycera nasicornis, Lamk., Sav.
 Phylodoce Paretii, Lamk. — Nereiphilla Paretii, Blainv.
 viridis, Blainv. — Eulalia viridis, Sav. — Eanomia ..., Rizzo. — Hesione zonata, D. C.
 festiva, Sav.
 Nereis lobulata, Blainv. — Lyeoris, Sav.
 Leonice fasciata, Rizzo.

Lambrineris coccineus, D. C. — Cirratulus, Lamk.
 Lysidice valentina, Sav.
 Enoice zonata, D. C.
 Halythea aculeata, Lamk., Sav. — Aphrodita, Linn., Blainv.
 hystrix, Sav.
 Polynoe squamata, Lamk., Sav. — Eumolpe, Blainv.
 foliosa, Sav.

CIRRIPEDI SESSILI.

Coronula testudinaria, Lamk.
 Balanus tulipa, Ranz.
 balanoides, Ranz.
 Chthamalus stellatus, Ranz. — Balanus patellaris, Lamk.

CIRRIPEDI PROUNCULATI.

Astarte laevis, Lamk. — Peotelasius astartifera, Sowerby.
 Otion Cuvieri, Sow.
 Cineris vittata, Lamk.
 Pollicipes scalpellum, Lamk. — Scalpellum levis, Rizzo.
 Alepas mouta, Philippi.

MOLLUSCHI.

I *Molluschi* nudi o testacei sono disseminati nelle terre, nelle acque dolci e nel mare. I *Cefalopodi* sono i meno numerosi in punto di specie, ma in generale i più abbondanti in individui e i più utili all'uomo a cui molti forniscono un cibo sano e squisito. Questi vivono nel mare, alcuni tra gli scogli e prossimi al lido, altri in maggiori profondità. Si sogliono pescare talor coll'arco, ma più frequentemente colle draie. Le loro forme diversificano moltissimo non solamente da un genere all'altro, ma pur anco fra le specie congeneri. Ammirabile è la mutabilità dei colori della loro pelle in conseguenza del suo sistema cromoforo, scoperto e descritto dal dott. Sangiovanni, sistema per cui possono dirsi veri Camaleonti. Quasi tutti i *Cefalopodi* sono commestibili. Sono stimati, i *Totani*, le *Sepie*

ed anco i *Polpi* finchè non sono troppo grossi. Di grande utilità alla classe artigiana, sono i medesimi e gli *Eledoni*. Si rigettano invece, l'*Octopus catenulatus*, l'*Histioteuthys* volg. *Pignata*, e le *Loligo todarus* e *sagittata*, essendo la loro carne acidula e indigesta.

I *Cefalopedi* sono forniti di un organo particolare atto a separare un umore nero denso che essi versano a volontà tosto che sono minacciati da un qualche nemico. L'industria italiana ne ha tratto partito impiegandolo a quella bella tinta detta *Sepia*, molto preferibile all'inehiostro della China pe' disegni all'acquarella.

Tutti i *Cefalopedi* europei sono nudi, tranne l'*Argonauta* che s'incontra nelle belle giornate, navigante alla superficie dell'acqua, giovandosi della conchiglia per barca e delle braccia per remi. Credesi, con molta probabilità, che l'uomo si valesse di questo esempio, ne' suoi primi tentativi di navigazione.

I *Pteropedi* sono tutti pelagici. La gran corrente del Mediterraneo che va dal Capocorso a Gibilterra, lambendo le coste dell'Italia, Francia e Spagna, penetrando poco e di rado ne' seni litorali, suol tenere questi animali fuori del golfo di Genova. Sono nudi, gli *Pneumodermi*: hanno una conchiglia cornea, le *Cleodore* e l'*Hiilee*, una gelatinosa la *Cymbulia*, volg. *Scarpetta*.

Fra tutti i Molluschi, i *Gasteropedi* sono i più numerosi. Le specie sono marine, terrestri, o fluviali. Molti hanno una conchiglia esterna, alcuni ne hanno una interna, altri poi ne sono affatto sprovvisti.

I *Gasteropedi* marini offrono pochissima utilità all'uomo. I *Murex tripus* e *brandaris*, volg. *Ronseggi* o *Cornetti de mû*, sono mangiati dalla plebe. Gli antichi si giovavano del licore porporino che spandono alcune *Porpore*, *Murici*, *Iantine* e *Aplisie*, per trarne la tanto decantata porpora, arte in oggi perduta, non conoscendosi il segreto di fissare quel colore fugacissimo e soggetto ad alterarsi in brevissimo tratto di tempo.

I *Gasteropedi* nudi abbondano nel porto di Genova, vivono, per lo più, fra le piante a pochi palmi sotto la superficie dell'acqua, *G. Ianus*, *Eolidia*, *Tergipes*, *Doris*, *Calliopea*, *Elysia*, *Aphysia*; altri discendono in maggiori profondità, *G. Lomanotus*, *Idalia*, *Sigaretus*, *Tethys*, *Pleurophylidia*, *Acera*. La varietà e l'eleganza delle loro forme, la ricchezza dei loro colori, rendono questi esseri, sino ad ora poco studiati, altri dei prodotti più ammirabili della creazione.

Fra i *Gasteropedi terrestri* primeggia il *G. Helix*. Molte specie sono commestibili. La *Pomatias*, abundantissima sugli Apennini, viene smerciata nel Parmigiano e nel Piemonte, più di rado portata a Genova ove si preferisce l'*Adpersa*. La *Naticoides*, dispreziata in Genova, è al contrario ricercatissima in Nizza. Il vantaggio che l'uomo ricava dalle *Elici* è contraccambiato dai danni che le specie del *G. Limax* fanno negli orti.

Gli *Acefali testacei* sono difesi da una conchiglia bivalva. Vivono nella sabbia e nel fango, i *G. Venus*, *Mya*; attaccati ai bastimenti, i *G. Mytilus*, *Ostrea*; alli scogli, i *G. Ostrea*, *Spondylus*; bucano legni e vi si conficcano, i *G. Tereido*, *Septaria*; scava la sua abitazione dentro degli scogli, il *G. Lithodoma*. A questo ordine, appartengono l'*Ostrea plicatula*, volg. *Ostrega*, frequente nel porto di Genova, lo *Spondylus gaederopus* volg. *Zampa*, la *Venus decussata* volg. *Arsella*, e la tanto pregiata *Lithodoma* volg. *Dattao de m^a*, ammessi a tutte le tavole in diverso grado di estimazione. A questo ordine appartiene pure la *Tereido navalis*, flagello dei bastimenti e al cui riparo è indispensabile l'usata fasciatura di rame.

Gli *Acefali liberi* ossia *Ascidie vere* vivono costantemente attaccate agli scogli o ai bastimenti; si chiamano volgarmente *Brugnion* o *Tettinotti*. Le ovarie del *Brugnion* sono mangiative, e il *Tettinotto* serve ai pescatori ad uso di esca. I *Salpici* sono pelagici, e non s'incontrano se non trasportati dalle correnti o rigettati dai marosi lungo le spiagge: il loro corpo è gelatinoso e trasparente. Molte specie sono gregarie. Gli individui si attaccano l'uno all'altro e formano in allora lunghissimi nastri.

ACEFALI ASCIDIICI.

Botryllus auratus, Sav.
stellatus, id.
Polycyclus Reinerii, Lamk.
diazona, Cuv.
Aplysiom lobatum, Sav.
Eneclium gelatinosum, Lamk.
Pyrosoma giganteum, Per.

Ascidia rustica, Lamk.
prunum, Mull.
Cavieri, D. C.
Phallusia fusca, Sav.
mentola, Sav.
mammosa, Sav.
intestinalis, Sav.
Cyothia microcosma, Sav.
papillosa, D. C.
Clavulina lepadiformis, Mull.

ASCIDIICI LIBERI.

Ascidia mamillaria, Puff.

ASCIDIICI SALPICI.

Salpa minor, *Forsk.*
pennata, *Forsk.*
democratia, *Forsk.*
confederata, *Forsk.*
Tilesii, *Cuv.*
scutigera, *Cuv.*
coerulea, *D. C.*

ACRYALI TESTACEI D. C. — CONCHIFERI Lk.

Teredo navalis, *Linn.*
Pholas dactylus, *Linn.*
Solen siliqua, *Linn.*
ensis, *Linn.*
strigillatus, *Linn.*
Mastra stultorum, *Linn.*
lactea, *Lamk.* — var. *proec.*
solida, *Linn.*
Solemya mediterranea, *Lamk.*
Corbula nucleus, *Lamk.*
Pandora rostrata, *Lamk.*
Amphidesma phaseolina, *Lamk.* — *Thracia*, *Lamk.*
Saxicava arctica, *Phil.* — *Hiatella*, *Lamk.*
Petricola lithophaga, *Broon.*
Venerupis irus, *Lamk.*
Tellina pulchella, *Lamk.*
donacina, *Gm.*
distorta, *Pol.*
balaustrina, *Pol.*
pluvata, *Linn.*
tenais, *Mat. et Rack.*
nitida, *Pol.*
Lacina pecten, *Lamk.*
lactea, *Lamk.*
Douax trunculus, *Linn.*
semistriata, *Pol.*
venusta, *Pol.*
Pisidium vitreum, *Pfeiffer.* — *Cyclas*, *Lamk.*
cornea, *Lamk.*
annica, *Lamk.*
Cytherea Chione, *Lamk.*
Venus verrucosa, *Lamk.*

Venus gallina, *Linn.*
decussata, *Linn.*
geographica, *Linn.*
bicolor, *Pol.*
Cardium echinatum, *Linn.*
levigatum, *Linn.*
sulcatum, *Lamk.*
aculeatum, *Linn.*
rusticum, *Ghemnitz.*
Cardita sulcata, *Brug.*
calyculata, *Lamk.*
trapezia, *Brug.*
Isocardia cor, *Lamk.*
Arca Noë, *Linn.*
barbata, *Linn.*
lactea, *Lamk.*
tetragona, *Blainv.*
Pectunculus Glycimeris, *Lamk.*
pilosus, *Lamk.*
violaceus, *Lamk.*
Nucula Polii, *Phil.*
margaritacea, *Lamk.*
Chama gryphoides, *Linn.*
Unio glaucinus, *Zigler.*
Modiola barbata, *Lamk.*
discrepana, *Lamk.*
costolata, *Risso.*
Lithodoma lithophaga, *Lamk.*
Mytilus galloprovincialis, *Lamk.*
minimus, *Pol.*
Pinna rodis, *Linn.*
squamosa, *Pol.*
vitrea, *Gmel.*
Avicula tarentina, *Lamk.*
Lima inflata, *Lamk.*
squamosa, *Lamk.*
Pecten jacobaeus, *Lamk.*
sanguineus, *Lamk.*
polymorphus, *Broon.*
testae, *Bicoma* — *vitreus*, *Risso.*
adspersus, *Lamk.* — *Dumastii*, *Payraudeau.*
apertularis, *Lamk.* — *Audouini*, *Payr.*
pusio, *Lamk.*
glauber, *Lamk.*

Spondylus gaederopus, Linn.
Ustrea plicatula, Brocchi.
 lamellosa, Linn.
Anomia ephippium, Linn.
 ecpa, Lamk.
 squamula, Lamk.
 electrica, Lamk.

BRACHIOPEDI.

Terebratula caput-serpentis, Lamk.
 truncata, Lamk.
 vitrea, Lamk.
 detruncata, Phil.
Terebratula urna antiqua, Rizzo.
 cuneata, Rizzo.
Thecidea mediterranea, Rizzo.

GASTEROPEDI.

Chiton Potii, Deshayes. — *siculus*, Phil.
 — *squamosus*, Payr.
 cajetana, Pol.
 levis, Penn.
 fascicularis, Linn. et Penn. —
 id. var. minor, Phil.
Patella caerulea, Lamk.
 punctata, Lamk.
 Bonnardi, Peyr.
Deutalum deutalis, Linn.
 entalis, Linn.
Emarginola fissura, Lamk.
Fissorella costaria, Desf.
 graeca, Lamk.
Calyptraea sinensis, Lamk.
Pileopsis hungarica, Lamk.
 ? *intorta*, Lamk.
Crepidula onguiformis, Lamk.
Halyotis toberculata, Lamk.
Sigaretus perspicuus, Phil. — *Coriucella*,
 Blainv. (?)
Marginella cypraeola, Broon. — *Erato*
 Rizzo.
Volvaria miliaria, Lamk.
Ovula adriatica, Sav.
 spelta, Lamk.
 carnea, Lamk.

Cyprea lurida, Linn.
 corciuela, Lamk.
Mitra ebenus, Lamk. — *Deffracii*, Payr.
 cornea, Lamk.
Conus mediterraneus, Lamk.
Chenopus pes-pelecani, Phil.
Pleurotoma reticulatum, Broon. — *Cor-*
 dieri, Peyr.
 variegatum, Phil.
 Bertrandii, Peyr.
 Vauquelinii, Peyr.
 laevigatum, Phil.
Fusus corneus, Lamk.
 syrcusanus, Lamk.
 despectus, D. C.
 clavatus, D. C.
Fasciolaria tarentina, Lamk.
Columbella rustica, Lamk.
Triton nodosus, Lamk.
 cutaceum, Lamk.
 serobiculator, Lamk.
 coerugatum, Lamk.
Murex brandaris, Linn.
 erinaecus, Lamk.
 truncatus, Linn.
 cristatus, Brocchi.
 Edwardsii, Menk.
Cancellaria cancellata, Linn.
Cassia solcosa, Lamk.
Cassidaria echinophora, Lamk.
 tyrrhena, Lamk.
Dotium galea, Lamk.
Buccinum asperulum, Brocchi. *Lacepedi*,
 Payr.
 variabile, Phil. — *Ferussacii*,
 Payr.
d'Orbigny, Payr. — *Mitrella*
 marminae, Rizzo.
 mutabile, Lamk.
 coruiculum, Oliv. — *Calmehi*,
 Payr.
 neriteum, Linn. — *Nacina*, Rizzo.
 maculosum, Lamk.
 Linnoei, Payr. — *coruiculum*,
 Lamk. — *Mitrella flammea*,
 Rizzo.
Cerithium vulgatum, Brug.

- Cerithium mediterraneum*, Desh. — *fuscatum*, Phil. — *lividulum*, Rizzo. *mamillatum*, Rizzo. *perversum*, Lamk. *lima*, Brug. — *Latrellii*, Payr.
- Scalaria communis*, Lamk. *pseudo-scalaris*, Rizzo.
- Trochus granulatus*, Born. *conuloides*, Lamk. — *conulus* et *zizyphicus*, Olin. *Langieri*, Payr. *reticulatus*, Broch. — *Malonii*, Payr. — *pyramidatus*, Lamk. *fragarioides*, Lamk. — *Olivieri*, Payr. *articulatus*, Lamk. — *Draparnaudii*, Payr. *divariatus*, Linn. — *Lessonii*, Payr. *sanguineus*, Linn. — *purpureus*, Rizzo. *funibul*, Gmel. — *Aegyptiacum*, Payr. *magus*, Linn. *canaliculatus*, Phil. — *Fermouli*, Payr. *Richardii*, Phil. *Adamsonii*, Payr.
- Moedonta Couturii*, Payr. *Vicellotti*, Payr. *Jussinei*, Payr.
- Phasianella palli*, Payr. *Vieuxii*, Payr. — *Tricollis nitens*, Rizzo.
- Janthia communis*, Lamk. — *bicolor*, Menk. *prolongata*, - *Blainv.* — *nileas*, Menk.
- Notia glaucina*, Linn. — *pulella*, Rizzo. *millepunctata*, Lamk. *Valenciennesii*, Payr.
- Valvata piscinalis*, Ferussac.
- Siliquaria anguina*, Brug.
- Vermetus*, Adams. — *Scolissedum*, Rein. — *Lemintia*, Rizzo. — *Serpulorbis*, Sarsa.
- Vermetus gigas*, Bivona. — ? *dentiferus*, Rousseau. (?) *subanellatus*, Bivon.
- Tarritella terebra*, Lamk.
- Littorina cerulea*, Lamk. — *Bastetii*, Payr. — *Rissoa elegans*, Rizzo. *Rissoa ventricosa*, Desmarest. *oblonga*, Desm. *violacea*, Desm. *aculeata*, Desm. *Desnoyesii*, Payr. *granulata*, Phil. — *Alvanis europaea*, Rizzo. *Montagnii*, Payr. *Brighieri*, Payr.
- Truncatella truncatula*, Rizzo. — *Cyclonoma truncatulum*, Desh. *Melania Boschii*, Phil. — *Rissoa*, Payr. — *Cambesii*, Payr. *Palludina sebastina*, Lamk. *impura*, Lamk. *Cyclostoma elegans*, Draparnaud. *Pomatias striolatum*, Porro. — *Cyclonoma sulcata*, Lamk.
- Limaea peregra*, Drap. *minuta*, Drap. *auricularia*, Drap.
- Phyza fontinalis*, Drap. *hysaorum*, Drap.
- Plasorbis complanatus*, Linn. *carinatus*, Mull. *spirobia*, Mull. *vortex*, Mull.
- Succinea amphibis*, Drap. *oblonga*, Drap.
- Aciatina foliifera*, Lamk. — *Ferussacia grosioana*, Rizzo. *lubrica*, Menk.
- Bulimus acutus*, Brug. *ventricosus*, Drap. *decollatus*, Brug. *montanus*, Drap.
- Clausilia papillaris*, Drap.
- Pupa elaeica*, Drap. *trideas*, Drap. *quadrideas*, Drap.

- Pupa frumentum*, *Drap.*
Carocolla lapicida *Lamk.*
albella, *Linn.*
elegans, *Gmel.*
Helix aspersa, *Mull.*
lucorum, *Mull.*
vermiculata, *Mull.*
naticoides, *Drap.*
pomatia, *Linn.*
candidissima, *Drap.*
memoralis, *Linn.* Var. A. — K.
carthusianella, *Drap.*
variabilis, *Drap.*
striata, *Drap.*
costulata, *Ziegl.*
conspersa, *Drap.*
moralis, *Mull.*
espitum, *Drap.*
introduceta, *Ziegl.* enm var.
pulchella, *Mull.*
leopoldiana, *Charpentier.*
abvolata, *Mull.*
ciliata, *Ferus.*
algira, *Linn.*
crustallina, *Mull.*
cellaria, *Mull.*
obscura, *Porro*, var?
einctella, *Drap.* — var. a-b.
conica, *Drap.*
cingulata, *Stud.* — *bizona*, *Ros-*
master.
nicensis, *Ferus.*
pyramidata, *Drap.*
pisana, *Mull.*
charthasiana, *Drap.*
hispida, *Linn.*
Vitruina diaphana, *Pfeiff.*
Testacella haliotidea, *Fourc-Biget.*
Limax gagates, *Drap.*
cinereus, *Drap.*
marginatus, *Drap.*
agrestis, *Drap.*
Gasteropteron Meckelii, *Kosse.*
Bullaca aperta, *Linn.*
Bulla lignaria, *Linn.* — *Scaphander*, *Risso.*
striata, *Brug.*
Bulla hydatis, *Linn.*
akera, *Gmel.* — *fragilis*, *Lamk.*
Acera carnosa, *Cuv.* — *Doridium*, *Meck.*
Meckeliana, *D. C.* ⁽⁹⁾
aplysiiformis, *D. C.*
 var? *marmorata*, *Cantraine.* —
Eidothea marmorata, *Risso.*
Elysia *Risso.* — *Acteon* *Oken.* — *Aply-*
siopterus, *D. C.*
viridis, *Cantr.* ⁽⁶⁾
Aplysia depilans, *Linn.*
fasciata, *Poir.*
punctata, *Rang.*
marginata, *Rainw.*
virescens, *Risso.*
Webbi, *Roob.* et *Vanbeneden.*
Brugnatelli, *Roob.* et *Vanb.*
Umbrella mediterranea, *Lamk.* ⁽⁷⁾
Pleurobranchus aurantiacus, *Risso.*
stellatus, *Risso.*
ocellatus, *D. C.*
Denotarisii, *Ferrug.* ⁽⁴⁾
Savii, *Ver.* ⁽³⁾
Costantini, *Ver.* ⁽¹⁰⁾
Pleurobranchidium Meckelii, *Lew.*
Delle Chianii, *Ver.* ⁽¹¹⁾
Ancylus lacustris, *Mull.*
Dyphyllidia....., *Cuv.* — *Pleurophyllidia*
, *Meckel.*
lineata, *Otto.*
pustulosa, *Phil.* ⁽¹²⁾
 ? *verrucosa*, *Cantr.*
Polycerus....., *Cuv.* — *Doris*, *Mull.* *D. C.*
quadrilineatus, *Mull.*
 var. *Polyc. lineatus*, *Risso.*
Doria Nardii, *Ver.* ⁽¹³⁾
Calcara, *Ver.* ⁽¹⁴⁾
Intescena, *D. C.* ⁽¹⁵⁾
Pasiuli, *Ver.* ⁽¹⁶⁾
Orsini, *Ver.* ⁽¹⁷⁾
Villafranca, *Risso.*
verrucosa, *Cuv.*
tumentosa, *Cuv.* ⁽¹⁸⁾
Guttata, *Risso.* ⁽¹⁹⁾
Sismondæ, *Ver.* ⁽²⁰⁾
Rissæ, *Ver.* ⁽²¹⁾

Doris Villae, Ver. ⁽¹¹⁾
Piraini, Ver. ⁽¹²⁾
Schembrii, Ver. ⁽¹³⁾
argo, Linn.
limbata, Cuv.
Porti, Ver. ⁽¹⁰⁾
tuberculata, Cuv. et D. C. —
testudinaria, Risso.
Krohnii, Ver. ⁽¹⁴⁾
Paretti, Ver. ⁽¹⁵⁾
Idalia... *Leuckart*. — *Euploramus cro-*
cens, Phil.
Lomanotus Genei, Ver. ⁽¹⁶⁾
Tritonia Costae, Ver. ⁽¹⁷⁾
Thetys leporina, Gmel.
Calliopea ? *Risso*, M. Edw.
Sonleyetii, Ver. ⁽¹⁸⁾
Tergipes coronata, D'Orbigny. ⁽¹⁹⁾
Jaous Spinolae, Ver. ⁽²⁰⁾
Erolia napolitana, D. C. ⁽²¹⁾
Panizzae, Ver. ⁽²²⁾
? fasciculata, Lamk. ⁽²³⁾
flabellina, Ver. ⁽²⁴⁾
Janii, Ver. ⁽²⁵⁾
affinis, Lamk. ⁽²⁶⁾
Demartini, Ver. ⁽²⁷⁾
Rusconii, Ver. ⁽²⁸⁾
Cavolinii, Ver. ⁽²⁹⁾
Deftlippii, Ver. ⁽³⁰⁾
peregrina, Lamk. ⁽³¹⁾
Bellardii, Ver. ⁽³²⁾
Durazzii, Ver. ⁽³³⁾
Balsanii, Ver. ⁽³⁴⁾
Gandolfii, Ver. ⁽³⁵⁾
Whately, Ver. ⁽³⁶⁾
Bassii, Ver. ⁽³⁷⁾
Casaretii, Ver. ⁽³⁸⁾
tergipedina, Ver. ⁽³⁹⁾
Phylliroe Borephalum, Per.
Firola coronata, Lamk.
fredericiana, Les.
mutica, Les.
Carinaria mediterranea, Lamk.
Atlante Peronii, Less. ⁽⁴⁰⁾
Keraudrenii, Less.

PTEROPODI.

Pneumodermum violaceum, Vanb.
Cymbolia Peronii, Lamk.
Cleodora lanceolata, Les. — *Pyramidata*,
Per. — *Hyalaea pyramidata*,
Cant.
enspidata, Less.
Hyalaea tridentata, Lamk.
depressa, D'Orb.
uncinata, Linn.

CEPHALOPEDI.

Sepia officinalis, Linn.
elegans, Blainv. — *Orbigniana*,
Feruss.
biserialis, Denis Montfort. —
elegans, Feruss.
Sepiula Rondeletii, Lamk. — *Desvigan-*
na, Vanb. ou *pret. var.*
Rossia macrosoma, Owen. — *Sepiula ma-*
erosoma, D. C.
Histioteuthys Bonellii, D'Orb. — *Cranchia*
Bonellii, Feruss.
Ruppellii, Ver. ⁽⁴¹⁾
Knopoteuthys Oweni, Ver. ⁽⁴²⁾
Onychoteuthis Liechtensteini, Carus.
Onmastrephe, D'Orb. — *Loligo toda-*
rus, D. C.
sagittata, Lamk.
Loligo vulgaris, Lamk.
Lamarumora, Ver.
Coindetii, Ver.
Berthelotii, Ver.
subulata, Lamk.
Loligopsis Veranii, Feruss.
Eledon moschatum, Lamk.
Aldrovandi, D. C. — *Leuco-*
derma, Sangiovanni.
Genei, Ver. ⁽⁴³⁾
Octopus vulgaris, Lamk.
Coeco, Ver. ⁽⁴⁴⁾
ruber, Raf. — *macropus*, Risso.
Salotii, Ver.
carena, Ver.

Octopus catalanus, Feruss. — *tuberculatus*, D. C.

velifer, Feruss. ⁽¹⁷⁾

Trochilopus violaceus, D. C. ⁽¹⁸⁾ —

Octopus velatus, Rang. — G. Philonexis, D'Orb. — *Ocythoe mezzaro*, Risso.

Argonauta argo, Linn. ⁽¹⁹⁾

(¹⁷) Questo genere, figurato nella grande opera dell'Egitto (*Tav. F.*) ed ivi nominato *Jouura* dal sig. Savigny deve riprendere il nome assegnato dal fondatore.

(¹⁸) Lo *Sternopsis* non è raro dal 150 ai 200 metri di profondità, trovasi nella *Mezrolanza* portata da Pegli e da Cornigliano. Ebbi occasione di assicurarmi che il prof. Otto si era ingannato, prendendo la bocca per l'ano e viceversa, che nello stato normale della vita, tutta la parte del corpo anteriore ai tentacoli rimane inerte, che l'animale non la caccia fuori, se non quando è prossimo a morire, e che il tubercolo anale è parimente retrattile. L'equivoco del prof. Otto indusse pure in errore il sig. di Blainville, ma non sfuggì all'oculatissimo anatomico il dott. Delle Chiaie.

(¹⁹) Non di rado incontransi i *Sigareti*. La varietà bianca vive in mezzo agli scogli del porto; la cenericcia colle macchie gialle, la gialla colle macchie rosse, e la rossa stanno nei fondi, dai 100 ai 150 metri. Le conchiglie di tutte queste varietà non presentano differenze apprezzabili, onde convergo in parte nell'opinione del sig. Philippi, intorno all'opportuna riunione di alcune fra le specie ammesse dal dott. Delle Chiaie.

(²⁰) Al congresso di Milano, annunziai che il *Vermetus* non ha che una branchia e non due, siccome era parso al prof. Sassi che il disse nel Gioruale Ligustico; che il mantello di moltissimi individui è profondamente locavato, comunque il Philippi e il Bivona non l'abbiano rilevato, e che ciò accade, non solamente negli adulti, ma negli individui di tutte le età. Soggiunsi essere stato in sospetto che tali individui fossero femminei, non avendo incontrato uova fuorchè nelle loro conchiglie ove rimangono avvolte in un sacco trasparente. Esposi quindi che meglio avventurato del sig. Philippi mi era riuscito di estrarre l'embrione dalla sua conchiglia eliciforme e avente un solo giro di spira, che l'animale era benissimo fornito d'un piede peduncolato e molto sviluppato, di un rudimento di mantello e del muscolo che lo ritiene alla sua conchiglia, ma che non aveva opercolo. Valga questo tanto per correggere quanto mi si è fatto dire lo contrario, nella pagina 426 degli *Atti del nostro congresso italiano*.

(²¹) Abbondano, nel golfo di Genova, le *Acerre* che si pescano nei fondi, dai 150 ai 200 metri di profondità. Assai rara è la *Meckelii* nella quale osservai che le macchie rotonde bianche non hanno risalto tuberculiforme, se non dopo l'immersione nell'alcool, e che l'angolo sinistro del lobo posteriore si allunga in punta ed oltrepassa sempre l'angolo destro. L'*Aplysinaeformis* trovasi in maggior copia e giunge alla lunghezza di 10". La tinta generale del suo manto è nera violacea e vellutata, colle estremità orlate di azzurro e di giallo. Ho veduto individui coi lobi inferiori

del piede macchiati irregolarmente di giallo e di bianco, altri col dorso sottilmente punteggiato di bianco, altri volgenti al bruno e facienti il passaggio all'*Eidotea marmorata*, *Risso*, la quale è color di cioccolata con punti alquanto più chiari, onde la ritengo anch'essa per una mera varietà dell'*Aplysiaeformis*. Le conchiglie di tutte sono consimili, e nei moltissimi individui che conservai viventi e per più giorni, non mi riuscì di scorgere la mutazione, nel colore del piede, asserita dal *Risso*.

- (⁶) *Elysia viridis* (*Ver. Tav. II. fig. 1*). — L'apertura del collo, prossima all'inserzione del lobo foliaceo, descrittasi generalmente per l'apertura degli organi genitali, è veramente l'ano. Dietro a questa, avviene un'altra più piccola, inserviente all'introduzione dell'acqua che giunge alle branchie. L'organo maschile è alquanto all'indietro presso la base del tentacolo destro, ed il femminile è sotto l'ano presso alla giuntura del lobo foliaceo e del collo. Queste osservazioni sono state confermate dall'anatomico sig. Souleyet, *Revue Cuvèrienne* 1843. L'*Elysia* non spande mai umore porporino, sebbene l'avesse supposto il sig. Rang, *Monographie des Aplysienae*. Le uova della *Viridis* sono distribuite in un cordone giallognolo che si attacca ora agli scogli, ora si aggruppa colle conchiglie ed ora rimane abbandonato a pelo d'acqua, e in questo ultimo caso, si ripiegano a guisa di spira serrata e regolare. Questo cordone gelatinoso, men denso di quello delle *Aplysiae*, ha dai 4", ai 5" di lunghezza ed 1. $\frac{1}{16}$ " di diametro. Le uova sono della grossezza di $\frac{1}{16}$ ". La coarbiglia embrionale è nautiliforme, ed il mollusco regge un opercolo molto minore dell'apertura della conchiglia. Trovasi accidentalmente nel porto di Genova, a stagioni indeterminate: è più frequente in quello di Camogli ove giace a due metri di profondità: sopra la *Conferva lium*. Le *Elys. viridis*, *timida* e *marmorata* mi sembrano varietà della medesima specie, avendone rinvenuti gl'insensibili passaggi nei moltissimi individui che mi fu dato di osservare.
- (⁷) Incontrasi di rado, e ne osservai tre varietà: una col piede rosso cinabro, l'altra molto più grossa col piede giallognolo e con grossi tubercoli bianchi, la terza col piede cenerino e co' tubercoli bianchi.
- (⁸) *Pleurobranco di Denotaris*, *Verany*. — Corpo largo, colore, roseo; mantello, tuberculoso; tubercoli, piramidali e protratti in punta anteriormente; piede, largo quanto il mantello; branchia, della lunghezza del medesimo, di color tendente all'azzurro. Lung. 60". Larg. 43". Riviera di Ponente, molto raro.
- (⁹) *Pleurobranco di Savi*, *Verany*. — Corpo, ovale, compresso, color nankino. Mantello, più piccolo del piede, marmorizzato di bianco e di color cioccolata. Tentacoli e testa, coperti di punti ferrugini. Orlo del piede, tendente all'aurario. Branchia, più lunga del mantello, di colore azzurro chiaro. Lung. 43". Larg. 32". Raro, nella riviera di Ponente.
- (¹⁰) *Pleurobranco di Contarini*, *Verany*. — Corpo, ovale, di color vinaceo. Mantello, più piccolo del piede, coperto di macchie irregolari rosso-iaeca e di piccole verruche irregolari giallognole. Testa, tentacoli e parte superiore del piede, punteggiati di rosso. Branchia, uguale al mantello. Conchiglia, grande e membranacea. Lung. 50", larg. 30". Pescasi di rado, dai 150 ai 200 metri di profondità, nel golfo di Genova.
- (¹¹) *Pleurobranchidio di Delle Chiaie*, *Verany*. (*Tav. II. fig. 2 e 3*). — Corpo, convesso. Velo frontale, liscio. Mantello, piccolo e molto sviluppato; colore, roseo e cosperso di punti rossi piccoli e persistenti dopo morte. Lung. 30". Pescato ai 150

metri di profondità, nel golfo di Genova. Pubblicato, in una tornata del congresso di Milano.

- (11) Il mantello della *Diphyll. pustulosa*, *Philippi* e verrucosa, *Cantraine* è rosso vinoso, cenerino verso l'orlo. I tubercoli sono bianchi, piccoli, irregolari e disposti in serie longitudinali. Il velo frontale è punteggiato di ferrugineo e il piede è giallognolo. Lung. 50". — La frase del *Philippi* si converrebbe meglio ad altra specie che vidi in Gibilterra, presa al 45 metri di profondità, di colore arancio, violaceo verso la coda, col mantello coperto di grosse pustole irregolari e di piccoli punti bianchi. Lung. 110".

- (12) *Doride di Nardo*, *Verany*. — Corpo, quadrilatero, largo, terminato in una punta che oltrepassa il mantello di un quarto della sua lunghezza. Tentacoli superiori, conici, di colore bleu scuro, col rispettivo incavo conico e orlato di giallo. Quattordici branchie, fatte a guisa di penne laciniate, con una linea dorsale di punti azzurri e gialli, vengono fuori dall'incavo respiratorio, il quale ha il suo orlo rilevato a cono. Testa, munita di due tentacoli che hanno l'estremo apice ceruleo. Colore del mantello, celeste chiaro tendente al verde, bleu nella sua parte posteriore. Estremità del piede parimente bleu e il corpo tutto tempestato di punti, di macchie irregolari circolari o bislunghe e di lineeole gialle: contorno marginale, giallo, orlato di bianco. Lung. 125", larg. 35". Non molto rara, nella riviera di Ponente. Questa specie differisce dall'*Elegans* del *Cantraine*, pel numero delle sue branchie e per la loro linea esterna, gialla nell'*Elegans*, punteggiata di bleu e di giallo nella *Nardii*, caratteri costanti e comuni a tutti gli individui.

- (14) *Doride di Calcara*, *Verany*. — Corpo, convesso, quasi quadrilatero: margine del mantello, alquanto ondeggiante. Piede, stretto, molto rilevato lateralmente, oltrepassando il mantello di un quinto della sua lunghezza. Tentacoli superiori, conici, bleu scuri col rispettivo incavo conico e orlato di giallo. Dieci branchie penniformi e laciniate, di colore bleu con una linea interna gialla e altra esterna di punti parimenti gialli, disposte a mezza luna ed aderenti ad un reticolo orlato di giallo ingente in parte l'ano, vengono fuori da un incavo respiratorio rilevato a cono. Colore generale del corpo, ceruleo chiaro, tendente al violaceo, tempestato irregolarmente di punti, linee e macchie dilatate gialle. Estremità del piede e del mantello, bleu scure; quest'ultimo, orlato di bianco. Lung. 120". Rara nella riviera di Ponente.

- (15) Accetto il nome di *Doris lutescens*, comunicatomi dal sig. Delle Chiaie, quantunque i miei individui sieno cerulei chiari colle macchie gialle, co' tentacoli bleu scuri e colle branchie aventi esteriormente una linea di punti bleu e gialli. Lung. 90". Rara, nella riviera di Ponente.

- (16) *Doride di Pasini*, *Verany*. — Corpo, bislungo, compresso. Color generale, verde tendente al bleu sopra la testa, con riflessi azzurri nei lati del mantello. Questo, più largo del piede, presenta quattro linee longitudinali e una quinta marginale gialle. Altre linee, dello stesso colore, cingono l'estremità dorsale del piede bleu scuro alla sua base ed orlato d'azzurro verso la sua estremità. Branchie, in numero di otto, penniformi e laciniate, con linea esterna longitudinale gialla, sortono da un incavo respiratorio tinto di giallo. Tentacoli dorsali, conici: colore bleu scuro. Piede stretto, verde cenerino. Lung. 25". Rara, nella riviera di Ponente.

- (17) *Doride di Orsini*, *Verany*. — Corpo, bislungo, compresso. Mantello, largo, munito di undici tubercoli conici ed orlato di due larghe linee gialle, delle quali, l'interna

non oltrepassa, né i tentacoli, né le branchie. Piede, alquanto più stretto del mantello. Tentacoli, conici: colore, bleu. Branchie, in numero di otto, penniformi e laciniate, bleu scuro, sortono da un incavo respiratorio rilevato a cono. Colore generale, verde scuro. Piede, tendente al cenerino. Lung. 30". Rara, nella riviera di Ponente.

- (¹⁰) Riferisco, sotto questo nome, una *Doride* comune nel porto di Genova alla qual conviene benissimo la frase del Cuvier e pochissimo quella del Philippi.
- (¹¹) *Doride macchiata*, Risso. — Corpo, ovale, poco convesso. Mantello, più largo del piede. Tentacoli, conici. Branchie, fatte a guisa di foglie ovali e pinnulate, in numero di sei intorno all'ano. Color generale, bianco cenerino. Mantello, irregolarmente macchiato di nero. Il Risso, pubblicando questa specie, non accennò al numero delle branchie. Lung. 40". Larg. 22". Rara, nella riviera di Ponente.
- (¹²) *Doride di Sismonda*, Verany. — Corpo, ovale, poco convesso. Piede, più piccolo del mantello. Tentacoli, conici. Otto branchie, fatte a guisa di foglie ovali e pinnate, circondano l'ano. Color generale, fulvo, tendente al giallo sotto il piede. Mantello, coperto di macchie irregolari più o meno scure, onde ne prende l'aspetto d'una breccia. Orlo del piede, nerognolo. Estremità delle branchie, biancastre. Lung. 32". Larg. 22". Rara, nella riviera di Ponente.
- (¹³) *Doride di Riana*, Verany. — Corpo, ovale, convesso, del colore della cioccolata. Piede, più stretto del mantello: colore, cinabro. Tentacoli, conici, lamellati, gialli. Branchie, in numero di dieci, piccole, fatte a guisa di foglie ovali e pinnate, di colore scuro, cingenti l'ano, il cui orlo è pure colore di cinabro. Lung. 43". Rara, nella riviera di Ponente.
- (¹⁴) *Doride di Villa*, Verany. — Corpo, ovale, convesso, ben chiaro. Mantello, orlato di giallo, con due linee mediane tortuose che si accavalcano e si rette dello stesso colore. Piede, orlato di giallo e terminato in una punta che oltrepassa di poco il mantello. Ad ogni lato del piede, vedesi una linea pinnata parimente gialla. Tentacoli, conici: colore, bleu scuro. Branchie, in numero di otto, fogliacee, bipartite, situate all'estremità del mantello e cingenti l'ano. Lung. 48". Rara, nella riviera di Ponente.
- (¹⁵) *Doride di Pirajno*, Verany. — Corpo, bislungo, liscio, di colore bianco e diafano. Mantello, orlato di giallo. Tentacoli, alquanto claviformi: colore, rosso di porpora. Branchie, piccioline, in numero di dodici, somiglianti a foglie ovali e laciniate, del colore dei tentacoli, cingenti l'ano. Piede, stretto ed orlato di giallo, oltrepassando il mantello di un quinto della sua lunghezza. Lung. 30". Larg. 11". Rara, nella riviera di Ponente.
- (¹⁶) *Doride di Schembri*, Verany. — Corpo, ovale, convesso. Mantello, largo, di color violaceo cenerino con macchie scure e margine giallognolo, intieramente coperto da piccoli tubercoli irregolari, bianchi e granuliformi. Tentacoli, conici, colla base gialla e roll'apice lamellato e bianco. Branchie, in numero di otto, fatte a guisa di foglie bipinnate, di colore giallo, cingenti in parte l'ano. Lo stipite di ciascuna è rilevato dal lato interno della sua base, e ne risulta, una specie di corna anale di soli sei denti essendo la foglia inferiore di ogni lato ramificata al di sopra della laterale. Faccia inferiore del mantello, violacea cenerina. Faccia superiore, del piede, dello stesso colore con piccole macchie carmioie: sua faccia inferiore ed il solco marginale anteriore, gialli cennarini. Testa coi tentacoli smorzati, della stessa

tinta. Pescasi, colle druse, a 150 o 200 metri di profondità. Fuori dell'acqua, trasuda una mucosità densissima. L'avrei riportata alla *Leuckartiana* del Delle Chiaie alla quale si avvicina per l'eccessiva mole del suo pene, ma ho dovuto arrendermi al di lui parere contrario, attesa la diversità della forma delle branchie. Lung. 50". Larg. 30". — *Varietà*. — Mantello, del color della cioccolata, coperto da piccoli tubercoli poco fitti e gialli foschi: tentacoli, clavati, lamellati e neragnoli; parte inferiore del mantello, testa e piede, gialli.

- (13) *Doride di Porro, Verany*. — Corpo, bislungo. Mantello, convesso, alquanto inbercoloso. Tentacoli, conici e lamellati. Piede, più stretto del mantello. Testa, piccola: suoi tentacoli, conici. Sei branchie, a guisa di foglie ovali e bipinnate, cingenti l'ano. Mantello, di colore cenerino tendente al violetto, coperto lateralmente di punti ferrugini, inferiormente più chiaro e punteggiato color di ruggine. Piede, cenerino chiaro, un poco trasparente, con alcuni sottilissimi punti rossi, nella parte inferiore, più fitti presso il margine della superiore. Estremità lamellata dei tentacoli, giallognola e coperta di punti ferrugini. Branchie, di un bianco cenerino coll'apice giallo. Lung. 26". Larg. 10". Questa specie è molto coriacea. Quando i tentacoli e le branchie sono rientrati, essa prende l'aspetto di un *Chiton fuscicularis*. Trovata, nel porto di Genova, li 10 gennaio 1846.

- (14) *Doride di Krohn, Verany*. — Corpo, ovale, poco compresso, di color roseo. Mantello, largo, orlato di giallo con tre linee bianche, una mediana diretta dalla testa alle branchie e due laterali che partono dalla base dei tentacoli e si riuniscono dietro le branchie. Piede, stretto, più largo del mantello: sua estremità, carenata e orlata di bianco. Tentacoli, clavati e lamellati, color rosso di lacca. Sei branchie, somiglianti a foglie ovali, laciniato, disuguali ed isolate, disposte intorno all'ano. Lung. 10". Trovata, sopra un *Maia squinado*, nel mercato di Genova.

- (15) *Doride di Pareto, Verany (Tab. II. fig. 4. 5)*. — Corpo, bislungo, acuminato, convesso, alquanto carenato: mantello, col margine costantemente rilevato e facente quasi corona al dorso. Tentacoli, lunghi, poco clavati, lamellati. Branchie otto, somiglianti a foglie bipinnate, isolate, non retrattili, disposte intorno all'ano. Testa limaceiforme: bocca, inferiore. Piede, con un solco marginale anteriore; colore, bruno scuro, punteggiato di bianco, con una fascia trasversale media dorsale giallognola poco apparente. Branchie, nere coll'apice cenerino. Piede, stretto, di un color vinaceo, molto trasparente. Lung. 35". Assai rara, nel porto di Genova. I giovani, lunghi 6", sono perfettamente somiglianti agli adulti, tranne i punti bianchi e il colore men cupo. Le uova aggregate formano una specie di nastro bianco e trasparente, lungo 60", alto 3", spesso 1". S'incontrano attaccate perpendicolarmente sopra agli scogli.

- (16) *G. Lomanotus, Verany (Congresso di Milano e Revue Cuvèrèenne 1844)*. Corpo, bislungo, coniforme, gasteropodo. Testa, larga quanto il corpo, fornita di un velo frontale che regge da ogni lato due piccoli tentacoli. Tentacoli dorsali, retrattili, terminati in una clava, come nelle *Doride*, e collocati ognuno dentro una specie di guaina caliciforme. Organo della respirazione, composto di due membrane sottili e fimbriate, fissate da ciascun lato, tra la faccia dorsale e le laterali. Orifizio degli organi genitali e dell'ano, situati a destra.

Lomanoto di Gend, Verany (Tab. II. fig. 6). — Corpo, allungato, coniforme: dorso, poco convesso. Branchie, aderenti anteriormente a due guaine calciformi e annellate, coll'apertura quadridentata, nelle quali sono situati i due tentacoli dorsali

fatti a guisa di clava e forniti di lamiette parallele oblique. Piede, stretto, con un solco marginale anteriore. Apertura degli organi genitali, a destra e molto in avanti. Ano, dallo stesso lato, ma molto all'indietro. Colore, rosso vinoso intenso, punteggiato di bianco, variabile in ragione della sua trasparenza che lascia scorgere le parti interne di un colore più oscuro. Lung. 60". Pescasi, di rado, a 200 o 230 metri di profondità, onde non si ottiene se non morto, più o meno imperfetto, perchè è molto floscio.

- (²³) *Tritonia di Costa, Verany (Tav. II, fig. 7, 8).* — Corpo liscio, quadrilatero. Dorsa, sporgente lateralmente con doppia serie di dodici piccole brachie flosce e ramificate. Vela frontale, incurvato nel centro e dentato presso gli angoli laterali. Tentacoli dorsali, ramificati, situati in una guaina caliceforme quadridentata. Organi genitali ed ano, a destra. Colore, azzurro cenerino, diafano, tutto coperto di punti più chiari. Si vedono, per trasparenza, gli organi viscerali di colore arancio. Lung. 50". Pescasi coi Bianchetti, ai 40 metri di profondità. Si è dietro il parere dei professori Delle Chiaie e Costa, i quali hanno veduto la *Quadrilatera* e l'hanno giudicata diversa della nostrale, che ho dovuto ritenere quest'ultima per una nuova specie.

- (²⁴) *G. Calliopea, D'Orb. Mag. de Zool. 1836.* — Il distinguono dal *G. Eolidia*, la mancanza dei tentacoli superiori, la disposizione dei cirri branchiali in file longitudinali e la situazione degli organi genitali inosservati però dal sig. D'Orbigny. Questi sono separati: l'organo femminile stanza a destra, sotto i cirri branchiali: il maschile, dallo stesso lato pure, ma assai all'indietro della base del tentacolo. Ano, situato quasi sulla linea mediana del dorso.

Calliopea di Soudryet, Verany. — Corpo, ovale, arundinato posteriormente; tentacoli anteriori, coarcti, molto lunghi. Occhi, sessili alla loro base posteriore. Cirri branchiali, avuli, divisi in quattro serie longitudinali, le superiori di nove cirri, le inferiori di sedici, i cirri anteriori alquanto più grossi degli altri e le serie inferiori decrescenti in conformità. Piede, stretto e senza espansioni tentacolari. Organo maschile, situato al lato destro della testa, alquanto all'indietro dell'occhio: il femminile, dallo stesso lato, sotto al secondo e al terzo cirro brachiale. L'ano, fra il primo e il secondo pressochè sulla linea mediana del dorso. Colore del dorso, ora verde olivo più o meno scuro e ora di un bianco puro. Fucina inferiore del corpo, verde chiara. Lung. 10". Questa specie nuota rovesciata a pelo d'acqua ove si accoppia e indi abbandona le sue uova, le quali sono legate in un cordone grosso e lungo 16". L'embrione possiede una conchiglia nautiliforme con columella rovesciata all'infuori e un piccolo opercolo. Commaissima, sopra la *Conferia tinum*, nel porto di Camogli. Differisce dalla *Cal. Bellula* del D'Orbigny, per l'assenza delle espansioni tentacolari al piede e pel diverso numero dei cirri branchiali.

- (²⁵) *G. Tergipes D'Orbigny. Mag. de Zool. 1836.* — Il distinguono dalle *Eolidie*, i due tentacoli peduncolati e infundiboliformi dai quali escono fuori due fili conici, le sei paia dei grossi cirri branchiali fatti a forma di clava e tuberculati, la posizione degli organi genitali che non furono descritti dal D'Orbigny che sporgono, fra il tentacolo, il primo cirro branchiale destro e l'ano. Questi posa quasi sopra la linea mediana dorsale, come nella *Calliopea*, tra il primo e il secondo cirro.

La *Tergipes coronata D'Orb.* incontrasi di rado, nel porto di Genova. Lung. 9". Avere una varietà, di color gialliccio, coi cirri violacei. Questi, al pari del dorso, sono coperti da punti sottilissimi e più scuri: altri punti, di egual tinta, ma

assai più grossi, fanno corona in cima a tutti i tubercoli dei cirri branchiali. La *Tergipede* agglutina le sue uova, in una specie di cordone bianco e alquanto schiacciato che fa il passaggio da quello delle *Eolidie* a quello delle *Doridi*. Le abbondano anch'essa, nelle acque ove nuota col dorso rovesciato.

(14) *G. Janus*, *Verrany* (*Congresso di Milano e Revue Curieuse* 1844). — Corpo, limaceiforme, gasteropodo. Testa, distinta e fornita di tentacoli. Due tentacoli dorsali, conici, non retrattili, inseriti sopra di un grosso e comune pedicciuolo. Occhi, sessili, poco visibili, situati all'indietro di questo pedicciuolo. Branchie, formate, come nelle *Eolidie*, da molti cirri cilindrici disposti in serie longitudinali cingenti tutto il corpo, tranne la coda. Ano, dorsale, posteriore e mediano. Estremità dei due organi sessuali, riunite in un tubercolo comune, nella parte anteriore e dal lato destro.


Giano di Spinola, *Verrany* (*Tuc. II. fig. 9.*). — Corpo, bislungo, convesso, acuminato posteriormente. Piede, largo, con un solco marginale anteriore. Cirri branchiali, ordinati in sei file longitudinali, i superiori ed anteriori più grandi. Tentacoli superiori, provvisti di lamiette parallele e oblique, ed aventi una specie di cresta alla loro base interna. Testa, munita di piccoli tentacoli conici e coperta dai cirri anteriori. Bocca, aperta all'estremità d'una trousse retrattile e armata di due mandibole cornee. Corpo, viscido, gelatinoso, di un colore roseo giallognolo, con due linee bianche dall'ano alla testa ed altra protratta dall'ano all'estremità della coda. Cirri gialli coll'estremità cerulea sfavillante. Nel loro interno non che la quello di tutto il corpo, traspare il sistema gastro-epatico di colore bruno. Le uova aggregate formano un filo tortuoso, lungo 20', composto di una sola serie d'uova, che ciascuno dei quali contieno dai 45 ai 75 vitelli. L'Embrioe possiede una conchiglia antiliforme e un piccolo apercolo. Nel porto di Genova, frequente in alcuni anni, rarissimo in altri. — Il dottore Delle Chiaie nella tavola 88 della sua classica opera *Descrizione e nomenclatura degli animali invertebrati del regno di Napoli* ha figurato di recente questo mollusco, sotto il nome di *Eolidia cristata*. La sua descrizione non è ancora pubblicata.

(15) *Eolidia neapolitana*, *Delle Chiaie*. — Corpo, ovale, convesso, poco acuminato posteriormente. Tentacoli anteriori, medioeri; i superiori corti, con lamiette parallele e oblique; occhi, alla loro base posteriore. Cirri branchiali, fusiformi, disposti in 24 serie trasversali o divergenti, le quali formano quasi una sola serie longitudinale tortuosa. Piede, largo, munito anteriormente di un solco marginale e di espansioni tentacolari brevissime. Ano, fra la terza e la quarta serie dei cirri. Colore, rosso viandee, roseo o giallognolo, tempestato, massimamente nel dorso e nei cirri, di punti obliquati, questi interamente di color ferrugineo. Tentacoli superiori, color della lacer colle estremità gialle. Lung. magg. 8'. Le uova agglutinate formano un filo tortuoso e roseo, lungo da 2' a 3' che incontrasi irregolarmente attaccato agli sengli. Questa specie, vicinissima all'*Eolidia histrix*, d'Otto ossia *Aethusa histrix*, di Rizzo, vive sapina sotto agli sengli del porto di Genova, ad 1 o 2 metri di profondità.

(16) *Eolidia di Panizza*, *Verrany*. — Corpo, ovale, posteriormente acuminato. Tentacoli anteriori, lunghi, superiori, medioeri, con lamietta parallele oblique, avanti gli occhi alla loro base. Cirri branchiali, lineari, riuniti in sei gruppi crescenti da ogni lato del dorso. Piede, largo, con espansioni tentacolari medioeri. Ano, fra il primo e il secondo gruppo dei cirri, all'altezza dei superiori. Colore,



MADE IN AFRICA



MADE IN AFRICA

MADE IN AFRICA

MADE IN AFRICA

roseo pallido. Tentacoli superiori, giallastri; cirri, internamente rossi. La trasparenza dei tegumenti lascia vedere tutto il sistema gastro-epatico. Lung. 45". Comune, nel porto di Portofino.

- (34) *Eolidia ? affusciata*, Lamarck. — Corpo, ovale, posteriormente molto acuminato. Tentacoli anteriori, lunghi: i superiori, mediocri, con laminette parallele oblique e cogli occhi alla loro base posteriore. Cirri branchiali, fusiformi, numerosi, riuniti in otto gruppi decrescenti da ogni lato del dorso. Piede, mediocemente largo, con espansioni tentacolari assai lunghe. Ano, fra il secondo e il terzo gruppo dei cirri, all'altezza dei superiori. Colore, rosso vinaceo chiaro, micotamente punteggiato di bianco. Tentacoli superiori, rosso di lacca coll'apice giallo. Cirri, nerognoli e punteggiati di bianco. Lung. 35". Le sue uova compongono un filo bianco, sottile, contorto in una spira regolare, lungo da 15" a 17". Non rara, nel porto di Genova.
- (35) *Eolidia Flabellina*, Verany. — Corpo, bislungo, posteriormente acuminato. Tentacoli anteriori, mediocri: i superiori, lunghi, regolarmente anellati e cogli occhi alla loro base. Dieci cirri branchiali ramificati, in ogni lato del dorso. Piede, largo e con espansioni tentacolari. Ano, al lato anteriore del secondo cirro. Colore, rosso porporino coll'estremità dei cirri cerulea. Lung. 50". Le uova formano un filo sottile e tortuoso, di colore roseo, lungo da 20" a 30" che s'incontra attaccato irregolarmente agli scogli. Comune, nel porto di Genova.
- (36) *Eolidia di Jan*, Verany. — Corpo, ovale, posteriormente acuminato. Tentacoli anteriori, molto lunghi: i superiori, mediocri ed anellati, cogli occhi alla loro base. Cirri branchiali, lineari, numerosissimi, riuniti in otto gruppi decrescenti in ogni lato del dorso. Piede, molto largo, con un solco marginale anteriore e con lunghe espansioni tentacolari. Ano, fra il primo e il secondo gruppo dei cirri. Dorso, roseo. Piede, celeste chiaro. Tentacoli superiori, giallognoli alla loro estremità: gli anteriori, con linea longitudinale bianca. Cirri, rossastri internamente ed anellati di bianco alla loro estremità esterna e anteriore. Lung. 70". Le sue uova sono pure disposte a foggia di filo sottile che s'incontra attaccato agli scogli ed ivi sempre regolarmente contorto a guisa di spira. Frequente, nel porto di Genova.
- (37) *Eolidia affine*, Carolini. — Corpo, bislungo, acuminato. Tentacoli, mediocri: gli occhi, alla base dei superiori. Cirri branchiali, lineari, corti, riuniti in otto gruppi poco distinti in ogni lato del dorso, composti il primo di tre, gli altri di due fila di cirri. Piede, mediocemente largo, con lunghe espansioni tentacolari. Ano, fra il primo e il secondo gruppo dei cirri. Color generale, porporino; cirri, rossastri internamente coll'apice bianco. Lung. 35". Le uova, come nella precedente, spira più stretta. Trovasi frequentemente, nel porto di Genova.
- (38) *Eolidia di De-Martino*, Verany. — Corpo, ovale, posteriormente acuminato. Tentacoli, lunghi: gli occhi, alla base dei superiori. Cirri branchiali, lineari, lunghi, riuniti in otto gruppi molto decrescenti. Il primo è composto di quattro file trasverse di cirri, il secondo di tre, il terzo e il quarto di due, gli altri di uno. Piede largo assai, con lunghe espansioni tentacolari. Ano, fra il primo e il secondo gruppo dei cirri. Colore generale, roseo: dorso, lati e tentacoli anteriori, annellati di bianco; cirri, rosso di lacca all'interno coll'estremità bianca. Lung. 50". Uova, come nell'*Eolidia fusiculata*. Comune, nel porto di Genova.
- (39) *Eolidia di Rusconi*, Verany. — Corpo, ovale, posteriormente acuminato. Tentacoli, mediocri: gli occhi, alla base posteriore dei superiori. Sei fila di cirri bran-

etiali lineari e di mediocre lunghezza, da ogni lato del dorso: le tre prime, doppie; le altre, semplici. Ano, dirimpetto ai cirri della seconda fila. Il colore del corpo varia dal bianco cenerino al bruno, dal giallognolo al verdognolo, dal roseo al violaceo con linea dorsale bianca. Cirri che paiono sempre rioperti da una specie di polvere bianca. Tentacoli superiori, verdi coll'apice bianco. Lung. 15". Le sue uova, come nella *Eol. fasciculata*. Trovasi comunemente, nel porto di Genova.

- (11) *Eolidia di Cavolini, Verany.* — *Peregrina, Delle Chiaie.* (Tav. 73. fig. 16. figura di *Cavolini*). — Corpo, bislungo, posteriormente acuminato. Tentacoli, lunghi,

gli occhi alla base posteriore dei superiori. Cinque gruppi di cirri branchiali, ovali, riuniti sopra un peduncolo comune, da ogni lato del dorso. Piede, poco allungato, senza espansioni tentacolari. Corpo, roseo chiaro. Dorsò, irregolarmente punteggiato di bianco. Cirri branchiali, di un color rosso tendente all'arancio, coll'estremità bianca. Alla base anteriore di ogni testarolo superiore, si vede una bellissima macchia, colore del carminio. Lung. 5". Incontrata, nel porto di Genova, in aprile e io marzo.

- (12) *Eolidia di Deftippi, Verany.* — Corpo, ovale, acuminato posteriormente. Ten-

tacoli, corti; gli occhi, alla base posteriore dei superiori. Sei cirri branchiali, glandiformi, riuniti in due gruppi, in ogni lato del corpo. Piede, largo, senza espansioni tentacolari. Colore, bianco verdastro: cirri, coperti da sottilissimi panti di un colore di cioccolata più intenso verso la base. Dorsò, testa e testaroli, bianchi. Due linee carminie scorrono dai tentacoli superiori ai primi cirri: una terza costeggia ogni lato, dietro i tentacoli anteriori; una quarta, più piccola, si scorge all'estremità di questi, ed una quinta in parte biforcata è pur visibile anteriormente, sopra la regione del cuore. Lung. 5". Rarissima, incontrata in marzo, nel porto di Genova.

- (13) *Eolidia pellegrina, Cavolini e Lammark.* — Corpo, ovale, molto acuminato po-

steriormente. Testaroli, lunghi: gli occhi, alla base posteriore dei superiori. Cirri branchiali, lineari, molto lunghi, ordinati sovente in dieci, più di rado in otto file, in ogni lato del dorso, la prima doppia. Piede, largo, con un solco marginale anteriore e con lunghe espansioni tentacolari. Ano, fra la prima e la seconda fila dei cirri branchiali. Color generale, roseo pallido: estremità dei tentacoli superiori, color d'arancio; due macchie triangolari, formate da linee rispettivamente parallele e dello stesso colore alla loro base anteriore. Interno dei cirri branchiali, vinaceo, estremità cerulea. Lung. 45". Le sue uova sono agglutinate in un filo bianco, sottile, tortuoso, lungo dai 12" ai 14", che incontrasi attaccato in diversi modi agli scegli. Trovasi frequente, nel porto di Genova.

- (14) *Eolidia di Bellardi, Verany.* — Corpo ovale, convesso, poco aruminato. Ten-

tacoli, corti, gli occhi, alla base dei superiori. Cirri branchiali, lineari, distribuiti in dieci file, in ogni lato del dorso: le quattro anteriori doppie, le altre semplici. I cirri anteriori della prima fila si prolungano molto in avanti. Piede, largo, con un solco marginale anteriore, espansioni tentacolari mediocri, estremità posteriore velata dagli ultimi cirri branchiali posteriori. Ano, fra la terza e la quarta fila dei cirri. Colore generale, roseo pallido, interno dei cirri, color di ruggine. Lung. 20". Rara, nel porto di Genova. — *Varietà.* — Corpo, bislungo, poco acuminato: testaroli, lunghi; colore, roseo tendente all'arancio; cirri branchiali, più brevi.

- (15) *Eolidia di Durazzo, Verany.* — Corpo, ovale, convesso. Testaroli anteriori, mediocri: i superiori, corti, gli occhi alla loro base. Cirri branchiali, lineari, corti, disposti in otto file da ogni lato del dorso, la prima doppia coi cirri inferiori pro-

lungati molto in avanti. Ano, fra la prima e la seconda fila. Piede, largo, con espansioni tentacolari piccole. Color generale, bianco giallognolo: dorso e parte superiore dei tentacoli anteriori, color di minio; cirri, internamente browni. Lung. 12". Le uova sono agglutinate in un cordone bianco e lungo dai 12" ai 20". Trovasi, non comune, nel porto di Genova.

(¹⁶⁵) *Eolidia di Balsano, Verany.* — Corpo, ovale, convesso, poco acuminato. Tentacoli, mediocri: gli occhi, alla base dei superiori, Cirri branchiali, claviformi, disposti in sei file in ogni lato del dorso, la prima triplice. Piede, largo, senza espansioni tentacolari. Color generale, roseo livido, dorso bianco: tentacoli superiori, color d'arancio coll'apice bianco, gli anteriori longitudinalmente nallioati di bianco. L'opacità dei cirri non lascia trasparire il sistema gastro-epatico. Lung. 3". Trovata, nel porto di Portofino.

(¹⁶⁷) *Eolidia di Gundolfo, Verany.* — Corpo, ovale, convesso, acuminato. Tentacoli anteriori mediocri, i superiori lunghi. Cirri branchiali, lineari, subelavati, distribuiti in sette file in ogni lato del dorso. Piede, largo, senza espansioni tentacolari. Ano, fra il primo e il secondo dei cirri branchiali. Color generale, variabile dal rosso di cinabro al giallo. Lung. 12". Le uova agglutinanti formano una specie di cordoncetto bianco, brevissimo e incurvato a mezza luna. La madre le abbandona costantemente alla superficie dell'acqua. Trovasi, di rado, nel porto di Genova.

(¹⁶⁸) *Eolidia di Whately, Verany.* — Corpo, bislungo, acuminato posteriormente. Tentacoli anteriori lunghi, i superiori ancora più allungati. Cirri branchiali, ovali, deserescenti inaccessibilmente dall'avanti all'indietro, e con molta maggior rapidità dall'alto al basso, distribuiti in sei file longitudinali in ogni lato del dorso, la prima doppia. Piede, poco allungato, senza espansioni tentacolari. Ano, fra la seconda e la terza fila dei cirri, molto alto. Color generale, cenerio: dorso, coperto da grandi macchie irregolari rosse, e orlate di nero; apice dei tentacoli, giallo; cirri, cenerini, con grossi punti neri ed estremità rossa. Lung. 15". Le uova, come nella precedente. Non rara, nel porto di Genova. — *Varietà.* — Dorso, coperto di macchie rosse più omerose, cirri branchiali neri e punteggiati di bianco, apice dei tentacoli rosso. Trovasi pure, nel porto di Genova, ma più rara del tipo.

(¹⁶⁹) *Eolidia di Bussi, Verany.* — Corpo, bislungo, molto acuminato posteriormente. Tentacoli anteriori, mediocri: i superiori, lunghi; gli occhi alla loro base posteriore. Cirri branchiali, conici, lineari, distribuiti in sette file trasverse in ogni lato del dorso, la prima triplice. Piede, stretto, con un solco marginale anteriore, senza espansioni tentacolari. Ano, orlato di rosso, tra la prima e la seconda fila dei cirri. Color generale, giallo canarino; cirri, colla base verde, la parte superiore bleu di cobalto e l'apice, cinabro. Maggior lunghezza, 16". Le uova agglutinate compongono un grosso cordone, regolarmente piegato in breve spirale e qualche volta più voluminoso della stessa *Eolidia* madre. Questa suole abbandonarle a pelo d'acqua. Trovasi una varietà, col corpo più allungato, colle papille gialle e più brevi, col bleu di cobalto orlato sopra e sotto di rosso e coll'apice dei cirri bianco. L'una e l'altra, sono comuni nel porto di Genova.

(¹⁷⁰) *Eolidia di Casaretto, Verany.* — Corpo, ovale, acuminato posteriormente. Tentacoli anteriori, corti, i superiori lunghi. Cirri branchiali, lineari, disposti in sette file longitudinali in ogni lato del dorso, la prima triplice. Piede, molto largo, con espansioni tentacolari mediocri. Ano, fra la prima e la seconda fila dei cirri. Coloro

generale, giallo traente al verde: cirri, blu di cobalto coll' apice giallo. Lung. 15". Il cordone, risultante dalle uova agglutinate, è irregolarmente contorto, lungo 25". Rara, nel porto di Genova.

- (¹⁰) *Eolisia tergipredina*. Verany. — Corpo, ovale, convesso, acuminato posteriormente. Tentacoli anteriori, corti; i superiori, molto lunghi. Cirri branchiali, lunghi, lineari, con due cerchi di piccoli oodi verso la loro estremità, distribuiti in sette file longitudinali in ogni lato del dorso. Piede, largo, con un solco marginale anteriore e senza espansioni tentacolari. Ano, molto alto, fra la seconda e la terza fila di cirri. Colore generale, verde chiaro, sottilmente punteggiato di verde olivo. Piede, biancastro, con una serie di otto punti gialli da ogni lato. Lung. 6". Trovato, nel mese di maggio, nel porto di Genova.

- (¹¹) Nel 1834, incontrai per la prima volta, in Nizza, in mezzo a numerosissime *Haler uccinate*, alcune *Haler tridentate* e *Cleodore*, non pochi individui della *Atlanta*, genere allora nuovo pel Mediterraneo. Nel congresso di Tocino, nel 1840, la pubblicai come specie nuova, dedicandola al presidente della sessione, il principe Bonaparte. Mi sono assicurato, dopo avere consultato l'opera del signor Souleyet *Voyage de la Bonite*, che la mia specie non era che un giovane individuo dell'*Atl. Peroni*. In maggio 1843, ebbi in Genova, alcuni esemplari delle *Atl. Peroni* e *Keraudrenii*.

- (¹²) *Histioteuto di Ruppel*, Verany (Congresso di Milano Tor. III). — Sacco, conico, campanuliforme. Due naustole, semilunari, riunite nella loro parte inferiore e formandone una sola rotondata e alquanto incavata presso la base, sono collocate sulla metà posteriore del sacco e l'olterpassano. Testa, alquanto schiacciata, avente due occhi molto grossi ed una corona formata da otto braccia disuguali e da due altre tentacolari. Primo, secondo e terzo paio delle braccia, riuniti insieme da una grande membrana irregolare alta circa la metà delle braccia medesime. Due altre membrane più strette partono dai lati esteriori del terzo paio, nel quale porta, come i *Calamari* una piccola membrana lungo la sua parte dorsale, e vanno a riunirsi con altre due piccolissime aderenti alla base laterale della quarta. Braccia tentacolari, lunghe il doppio del primo paio. Le cupole sono piccole, bianche, globose, coll'apertura piccola, circolare e dentata per metà (fig. d. e.), divise in due file di cinquanta a sessanta per ogni braccio e piantate sopra di un peduncolo piramidale (fig. d. e.). Quelle del quarto paio sono più piccole delle altre. Quelle delle braccia tentacolari hanno l'apertura più grande e tutta dentata: alcune cupole, non peduncolate e piccolissime, vedonsi a molta distanza l'una dall'altra, lungo la loro metà superiore. Corpo, roseo vinoso, coperto di sottilissimi punti cromofori del color della cinghia: parte inferiore, regolarmente coperta di punti azzurri sfavillanti accoppiati ad una macchia chiara che ha i riflessi dell'opale: una serie assai fitta delle medesime intorno all'occhio ed altra triplice lungo le braccia. Parte superiore, con punti e macchie consimili meno regolari e più sbiadite. Membrana interbraebiale, di un colore vinoso ondato di rosso-ruggine. Lamina dorsale, cornea, romboidale, lanceolata, alquanto pedunculata (fig. a. b.), accoppiata, nella sua parte superiore ed interna, ad altra più piccola ovale e pedunculata (fig. c.). Questa specie vive a circa 1000 metri di profondità, nel golfo di Genova ove furono pescati tre individui, il primo in settembre 1844 e gli altri in maggio 1845 e 1846. L'*Histioteuto di Bonelli*, ossia *Crangia Bonelliana*, Feruss. Trovata pure da me nel Mediterraneo e ceduta al



Fig. 1. Squid, dorsal view.

Fig. 2. Squid, ventral view.

Fig. 3. Squid, lateral view. Fig. 4. Squid, ventral view. Fig. 5. Squid, lateral view. Fig. 6. Squid, ventral view. Fig. 7. Squid, lateral view. Fig. 8. Squid, ventral view. Fig. 9. Squid, lateral view. Fig. 10. Squid, ventral view.

barone di Ferussac, nel 1834, sotto condizione di dedicarla al prof. Bouelli, diversificata dalla *Ruppelii*, per la regolarità delle braccia e della membrana, per le cupole cerulee e per il color generale molto più risplendente. L'ho incontrata, di rado nel porto di Genova, più frequente nel litorale di Nizza.

- (⁴⁴) *Eunoptentis* di Owen, Verany, Congresso di Napoli (Tav. IV. fig. 2. 3). — Sacco, cuoico, molto seminato. Le natatoie romboides e sagittate, occupano i due terzi della lunghezza del sacco e si prolungano sino alla sua estremità posteriore. Testa, medioce, con otto braccia alquanto disuguali; il primo paio, più lungo; secondo, terzo, e quarto gradatamente abbreviate, nude alla base, armate di uncinetti disposti in due file, in numero di sette per ogni fila, ed aventi alcune cupole quasi microscopiche verso la loro estremità. Color generale, roseo chiaro con punti cromofori rossi, la linea mediana dorsale rossa vinacea. Laminie, inosservate. Non ho tentato estrarla, per timore di guastare l'unico individuo che possedo. Questa specie è vicinissima all'*Eunoptenthis* Verany, Ruppel. Recata dall'estremità della riva di Puente.

- (⁴⁵) *Eledon* di Gend, Verany (Quadro dei Cefalopodi, atti del Congresso di Torino). — Le sue braccia più corte che nelle altre specie, il colore costantemente roseo pallido coi punti cromofori dalla parte inferiore poco fitti e una serie d'altri punti cromofori, sul dorso delle braccia, molto più grossi nella metà e decrescenti verso le estremità, sono i caratteri distintivi di questa nuova specie che s'incontra, di rado, nel litorale dei dintorni di Genova.

- (⁴⁶) *Polpo di Cocco*, Verany, Congresso di Napoli (Tav. IV. fig. 1.). — Sacco conico. Braccia, poco disuguali, lunghe tre volte il sacco, primo e quarto paio uguali, terzo più lungo; tutte riunite, in un settimo della loro lunghezza, da una membrana ombelliforme. Un piccolo cirro, in cima al bulbo degli occhi. Dorso, liscio, sottilmente marmorizzato di piccoli punti cromofori foschi che formano una reticola a maglia stretta più oscura verso l'estremità della membrana ombelliforme, il cui orlo è di una tinta azzurra. Parte inferiore del corpo e superficie interna dell'umbello, bianche con riflessi azzurri e sottilissimi punti rossi. Lung. 15". Questa specie differisce dall'*Oct. vulgaris*, per la forma del sacco più allungato, per la grandezza delle braccia fra loro meno disuguali, per il margine azzurro dell'orlo della membrana ombelliforme e per il numero dei cirri sporgenti sopra il bulbo degli occhi. Pescato, in Genova, nell'agosto del 1843.

- (⁴⁷) *Polpo velifero*, Ferussac. — Ha il sacco conico coll'apertura grande, la testa molto grossa, gli occhi grandi pure, l'infondibolo lungo, le braccia disuguali, decrescenti alternatamente dal secondo al primo e dal quarto al terzo paio, le due ultime però minori di una metà del primo. Una larga membrana interbrachiale lega interamente le quattro braccia superiori. Quella del primo paio è profondamente spaccata, le due altre sono intiere. Le cupole sono pedunculiste e divise in due serie. Color generale, roseo vinaceo: membrana, della stessa tinta volgente al giallognolo. Sopra le membrane vedonsi all'interno ed al lato del primo paio di braccia, una serie crescente di macchie violacee scure, e accanto al secondo paio, un'altra serie decrescente di color carminio coll'orlo bianco. Lung. 18". Trovata nel 1828, e comunicata al Ferussac che la figurò nella sua monografia.

- (⁴⁸) *Trematopoda violacea*, Della Chiaie. — Forma del *Polpo velifero*, dal quale diversifica, per quattro grandi forami chiusi da valvole che vedonsi, due sulla parte

superiore della testa e due sopra l'inferiore. Si è, sopra questi caratteri, che il sig. dottore Delle Chiaie, appoggiato anche da osservazioni anatomiche, ha genericamente distaccato questa specie dal G. *Polpo*. Il sig. D'Orbigay, dopo la pubblicazione dell'opera del Delle Chiaie, produsse lo stesso genere, col nome di *Philonotis*, e le assegnò, siccome carattere essenziale, un *Apparato di resistenza* che non sono riuscito a rinvenire nei tre individui che mi fu dato di osservare. Lung. 20". Pesco, in settembre, io Genova, a circa 1000 metri di profondità.

(¹⁰⁰) L'*Argonauta* è molto rara, nella Liguria. Ebbi la sorte d'incontrarla due volte, mentre ossigava, ed ebbi ad osservare che le sue braccia le servivano di remo e non di vela.



Fig. 1. Head of *Sepia* *sepioides* (Günther).
Fig. 2. Head of *Sepia* *sepioides* (Günther).
Fig. 3. Head of *Sepia* *sepioides* (Günther).

PESCI

L'Italia nostra, che dalla cortese natura ricevette il dono di ricchissima Flora, non fu meno favoreggiata in quella multiplice, e brillante famiglia dei *Pesci*, che destinati ad animare i laghi, i fiumi, e più copiosamente i mari circostanti, porge alimento utilissimo a tutti i suoi abitatori, ma sovra gli altri prezioso a quelli della zona litorale. L'italica ittiologia, secondo l'enumerazione fattane dal chiarissimo principe di Canino raggiugne 470 specie, numero, che nel sopravanzare di molto le altre classi indigene di animali vertebrati, è avvicinato appena da quella degli uccelli. Non è rhe da un anno, che fu dato rivolgere le indagini nel seno del mare ligustico per arricchire la raccolta accademica delle varie specie dei pesci, che han soggiorno fra noi, avvegnachè per lo avanti si diede opera principale alla parte ornitologica più elegante certamente di forme, e non meno splendida, e vaga per la ricchezza dell'esterno ornamento. Nonpertanto possiamo annunziare con certezza che 212 specie sono classificate come nostre, abbenrhè sia vero d'altra parte, rhe non tutte abbiamo avuto la sorte di rinvenire nelle nostre accurate ricerche, perchè riconosciute sinora entro breve periodo di tempo. Non crediamo quindi apporei al vero, se a 280 circa ascender

facciamo il numero complessivo di tutte le specie marine e fluviali, che avvenir possa d'incontrare nella nostra patria. Si può ammetter del pari, che nessuna delle vere specie descritte dal signor Risso, come proprie del confinante mare nizzardo, si abbiano a desiderare tra noi, poichè la più parte furono già colte, e le restanti non possono mancare di presentarsi. Ad una quindicina soltanto argomentiamo, si possano elevare le fluviali, e lacustri, che il tempo non ha pernesso di procurarci, sebbene abbiamo certezza dell'esistenza fra noi della Trota, della Lampreda, dei Barbi, *Quagliastri*, delle *Botte*, dei Lucci. Ma saremmo ingiusti, se lamentar si volesse la scarsità, dei pesci d'acqua dolce, beneficati largamente, quali siamo, dalla dovizia e superiorità nel gusto di quelli di mare. Il suolo ligure non è incavato a frequenti, e spaziosi laghi d'acqua dolce, non solcato da poderosi fiumi, come l'Italia boreale, nutre soltanto quelli a breve corso ed umili torrenti, che discendono bensì impetuosi da forti declivi nelle piogge copiose, ma non si espandono a larghe inondazioni nel soverchiare le sponde, ritornando fra breve al naturale confine. Gode però l'invidiabil fortuna d'esser, la maggior parte, assiso lungo l'azzurro specchio del Mediterraneo, maggiore dei laghi europei, difeso per l'Apennino dai ghiacciati venti boreali, aperto verso il mare alle tepide aure del mezzogiorno. L'illustre entomologo signor marchese Massimiliano Spinola, ed il professor Viviani tentarono i primi da molto tempo spargere qualche luce sopra questa oscura parte della nostra zoologia. Estese quest'ultimo un catalogo dei pesci del nostro mare, al quale fu aggiunto dal primo scrittore un supplemento, oltre una memoria particolare sopra specie nuove, o confuse. Per questi lavori, inseriti negli annuali del museo di Parigi, l'ittiologia ligure ascende a 120 specie circa, alle quali come si è veduto dalla nostra statistica, abbiamo avuto la sorte di aggiungerne quasi un centinaio di più.

Il litorale ligure è costituito da protesi capi, da inclinate costiere, che alternano con golfi, spiagge e scni arenosi, ove versano il loro tributo i fiumi ed i torrenti del paese. Presso di quelli, il mare presenta delle grandi profondità: presso gli ultimi, forma sovente dei bassi fondi. Distante due miglia circa dalla costa, una zona di alghe formata principalmente dalla *Caulinia oceanica* Decand. si estende lungo il litorale a guisa di selva marina, nell'istesso modo che fu osservato dal signor Delaroche presso le isole Baleari. La fami-

glia dei pesci occupa una regione, che cominciando dalla sponda, si allarga a gradi più di 25 miglia lontano, sicchè arriva alla profondità approssimativa di 800 metri. I pescatori a palamite vi piombano i loro ami raccomandati a pietre pesanti, mentre le barche peschereccie, dette bilancelle perchè vanno di pari corso, discendono le reti a 4 o 5 miglia distante. Colà stanziano i pesci più voraci, la famiglia degli *Squali* principalmente, qualche *Razza*, ed altri veramente pelagii. Al di là di questa regione, cioè a dire a 25 miglia dal litorale, non crediamo possa più vivere alcuna generazione di pesci. Vi si deve opporre la forte pressione di una colonna d'acqua presso che eguale alle alte cime del nostro Apeunino, la mancanza della luce, per cui i pesci pelagii sono dotati di globo oculare più vasto, e più di tutto finalmente, la scarsità dell'aria necessaria alla loro respirazione. Aggiungeremo pur anche che le specie carnivore che sono nella massima proporzione, non possono in ultimo risultato vivere che a spese delle specie erbivore, e di quelle poche che si pascolano di molecole organiche decomposte. Ora nei nostri alti fondi distanti dal litorale, manca la vegetazione marina; la decomposizione organica proveniente principalmente da corpi di tal natura, trascinati in mare dalle correnti dei fiumi, e torrenti, ha luogo naturalmente presso le coste. Mancherebbero dunque in quei luoghi i mezzi di esistenza per queste due ultime classi, e per conseguente necessità quelli, che servono alla classe carnivora che direttamente, o indirettamente per altre specie carnivore, si nutrice delle due precedenti. D'altronde è noto per le osservazioni del signor Forbes, la classe dei moluschi marini non vivere al di là di un limite determinato di profondità. Lo stesso si vuole ammettere in quella dei pesci. Perciò il mare ha solitudini e deserti più estesi che quelli della terra, dove regna un notevole freddo ed una notte senza giorno.

La vivace fantasia dei Greci immaginò che Venere fosse nata nel seno delle onde, qual simbolo rappresentativo dell'immensa fecondità dei pesci. Questo però, accennare deve soltanto alla grandissima quantità di uova, che sbucciano dal corpo materno all'epoca riproduttiva, non già alla frequente ripetizione nell'istesso anno dei riservati loro connubii. Da tutte le indagini fatte, da tutte le notizie raccolte, i pesci di mare, almeno nel nostro litorale, intendono all'ufficio della procreazione una volta sola nell'anno. La verità di un tal fatto si mette in piena luce per l'osservazione costante dei ven-

ditori di questi, che mondanlogli spesso dagli intestini, una volta solamente nell'anno trovano turgide e mature le ovaie, una volta soltanto ripieni gli organi fecondatori. Il che si conferma del pari nel rinvenire i piccoli di ciascheduna specie una volta solamente nell'anno, dentro un tempo determinato piuttosto breve, mentre se dessero opera a molteplici annue generazioni, i piccoli di coteste non mancherebbero di mostrarsi egualmente come avviene dei primi. Per tali ragioni, che mi sembrano decisive, non si verifica tra noi l'opinione di Aristotile che insegna le *Triglic* essere state denominate dalla triplice annua generazione, nè quella del Rondelet che l'ammette multiplice secondo la qualità, nè quella del Cuvier che due ne iscrive alla specie della *Boga*.

Nei pesci, il numero delle femmine sorpassa quello dei maschi, almeno di una quarta parte. Da ciò si può inferire che i maschi usino una venere vaga con molte femmine, ovvero esercitino una specie di poligamia. Nei pesci ovipari, ambo i sessi a folti stuoli riuniti nell'epoca riproduttiva, i maschi devono fecondare le uova che si emettono da più femmine, quando che nei pesci vivipari gli stessi maschi eseguiscano congressi separati con diverse di queste, vivendo in altri tempi, da ambo le parti, solitarii.

La massima parte, salve poche eccezioni, obbediscono alla legge generale dell'impulso propagatore, dal principio di primavera fino al principio di estate, quasi a norma dei volatili, ma però in mesi diversi, secondo la natura della specie. Sono nel caso che fa eccezione la Spigola, ed il Muggine nero dei genovesi, *Mugil chelo*, Cav., che gettano le uova nei mesi di novembre e dicembre, come pure le Sarpe che le gettano verso la fine di ottobre, in cui se ne fa preda molto più copiosa. Non diversamente succede nelle *Sardelle*, i cui piccoli che vivono a torme, chiamati *Gianchetti*, si mostrano dal 13 gennaio sino a tutto marzo, mentre i piccoli delle *Alici* disegnati anch'essi col nome comune di *Gianchetti*, comparendo da agosto ad ottobre, indicano chiaramente che l'*Alice*, pel tempo della fecondazione, non differisce dalla legge comune dei pesci. La stessa eccezione si conferma nel *Ruscetto*, il quale si ritrova dal principio di ottobre fino a tutto maggio, senza giungere in questo intervallo a superare la lunghezza circa di un pollice, non conoscendosi finora, se rimanga sempre limitato a cotesta piccolezza, come pretendono i pescatori, o se cresca a maggiore volume. Quel che sembra certo si è, che esso

formi una nuova specie nel genere *Gobius*, mentre più lunghe indagini si richiederebbero per seguitarne il completo sviluppo. Inoltre nella specie medesima il tempo a ciò destinato può durare sino a tre mesi. Il che è dimostrato dal ritrovare i piccoli nati di recente tanto al principio, che nel decorso, e fine di detto intervallo trimestrale. E più di tutto lo provano gli individui adulti, che durante tutto quel tempo si rinvengono ora pieni, ora sgravati del prodotto moltiplicatore. Questa prolungata generazione deve dipendere probabilmente dal minore, o maggiore nutrimento degli individui, e conseguentemente dal diverso grado di sviluppo degli organi generatori.

Le specie dei pesci hanno una patria limitata, e sono distribuite in zone circoscritte del globo, se escludere però vogliamo quelle che sono veramente migranti. Forse nessuna è cosmopolita, benchè tale da alcuni si ammetta la legittima *Cagnesia*, o *Carcharias Lamia*, Muller ed Henle.

Il Mediterraneo, a guisa degli altri mari, è fecondo di specie sue proprie, non molte gli sono comuni coll'Oceano occidentale-boreale, e col Capo di Buona Speranza, dove crediamo le nostre piuttosto migranti anzichè sedentarie, ed una specie soltanto col vicino mar rosso. Popolano le sponde del mare ligustico, quelle che sono particolari alla parte occidentale del Mediterraneo, cominciando dallo stretto di Gibilterra fino a capo Bon nell'Africa, quindi volgendosi a Nord Est, lungo una linea che incontri la Sicilia, la punta estrema d'Italia, e vada a metter capo nella terra di Grecia. Al di là di questo confine, progredendo fino alle coste dell'Asia, il Mediterraneo sembra formare un bacino particolare nutrice molte specie diverse. Ve ne ha però di coteste che dipartendosi dal loro abituale soggiorno, trascorrono sino ai lidi nostri, come sarebbe il *Caranx Luna*, Geoff., il *Ruvettus pretiosus*, Bp., il *Tetrapturus belone*, Rafin. La nostra ittiologia è dunque in generale analoga a quella delle regioni mediterranee occidentali, comprese nei sovra descritti confini, il che ci dispensa dal farne una particolare comparazione.

In varie classi desunte dalle loro diverse sedi, è ragionato il dividere le specie tutte, che nel ligustico mare incontrare si possono.

- 1.^a I pesci litorali, che vivono nelle sabbie, e negli scogli sottomarini prossimi alle sponde, nei quali si possono distinguere le specie, che rimontano i fiumi, come la Spigola, i Muggini, la Laccia.
- 2.^a Quelli che han soggiorno nella zona frondosa delle alghe formate

dalla *Cunlinia oceanica*, Decand. Le diverse specie di *Murena*, di Groughi, di Serrani ecc.

- 5.^a I pesci veramente pelagii, od abitatori delle grandi profondità sino ad 800 circa metri. Gli *Squali*, il *Polyptrion cernium*, Val. *Pagellus centrodontus*, Cuv., *Centrolophus pompilus*, Cuv., *Sebaste imperialis*, Braua Ray, Cuv., *Dentex macrophthelmus*, Cuv.
- 6.^a A questi si hanno da aggiungere i pesci migranti, oggetto più essenziale e lucroso di tutte le altre specie.

Ogni anno, a tempo determinato e costante, nei mesi di primavera o di estate, secondo le specie, gl'individui d'ambo i sessi a forme innumerevoli congregati, muovono dalle regioni boreali-occidentali dell'Oceano, si avanzano verso il Sud, costeggiando le terre di Francia, Spagna e Portogallo; pervenuti allo stretto di Gibilterra, irrompono nel Mediterraneo, diffondendosi largamente nel suo vasto bacino, poscia difilando per l'Arcipelago, si avanzano sino alle spiagge del mar Nero. Da istinto providenziale guidati, vanno peregrinando in cerca di climi più temperati, di bassi fondi più tranquilli, onde dar opera alla funzione imperiosa della generazione, compiuta la quale, con movimento retrogrado, ritornano alle lor sedi primitive. In pari modo, veggiamo eseguirsi le periodiche migrazioni dei volatili; ma più degne le prime della nostra ammirazione, perchè operate da esseri meno elevati nella struttura comparativa dell'organismo, ed ai quali, non può soccorrere la vista di lontane regioni che si scoprono dagli uccelli nell'alto dominio dell'aria. Quale potrà essere la causa determinante il maraviglioso fenomeno della migrazione, sì ne' pesci che nei volatili? Noi abbiamo tutte le ragioni per credere che la migrazione sia essenzialmente eccitata dall'istinto donato ad essi dal Creatore, onde viaggiando a climi più ubertosi, e più ricchi di preda, procurare un alimento sufficiente alla prole futura, la quale ne mancherebbe in quel tempo, se nascesse nella regione abitata dai padri loro. È un mandato della Provvidenza a cui obbediscono ciecamente, senza esser determinato da un giudizio, a cui fallirebbe il limitato sviluppo delle loro facoltà intellettuali, nè tanto meno dall'esperienza, che riuscendo assai volte fallace, avrebbe messo in pericolo l'esistenza della generazione ventura. Ciò si eseguisce dai pesci, e dai volatili, in ragione di quella sensazione interna per cui quest'ultimi costruiscono i lor nidi intrecciati d'erbe, e modellati a duttile argilla, senza aver mai veduto

il modo di operare, nè appresane l'arte dai genitori; nell'istesso modo che l'insetto più che perito botanico non erra giammai nella scelta delle piante a cui affidare la speranza della cara sua prole; come valente entomologo fa preda soltanto di quelle specie d'insetti atti a nutrire i suoi figli bambini; per quella legge finalmente per la quale il *Misocampus Nigri-cornis* conosce che stanza una larva della *Cecidomyia Verbasci* nella gallozzola corallina del *Verbascum*, ne perfora coll'ovidutto la parete, e giunge ad intiggere nella pelle di quella un ovicino dal quale sbucciando poscia il pargolo del *Misocampus* dovrà vivere parassito sulla stessa sino alla di lei distruzione, contemporanea alla sua misteriosa metamorfosi. È una conseguenza, remota bensì, ma non meno necessaria ed indispensabile, dell'eco immensa al gran comando del Creatore, *create, et multiplicamini*. Nell'abbracciar questa opinione, si rende ragione del motivo pel quale certe specie d'ucelli tenuti in casa, sebbene copiosamente nutriti, periscano all'approssimarsi del tempo della migrazione, come sarebbe l'*Oriolus galbula*, e molte specie insettivore; perchè certe altre, come la Quaglia, battono sì fortemente nelle sbarre della loro prigione, da rimanerne estinte; perchè le Orche, e molte altre specie domestiche sieno assalite in quel tempo da insolita agitazione, e straordinario orgasmo, mentre nelle altre teorie questi fatti rimangono senza spiegazione adeguata. Obbediscono a questa legge la famiglia degli *Scombridi* e quella dei *Clupeidi*. Tali sono il *Thynnus vulgaris*, Cuv. *Thynnus alalunga*, Cuv., *Thynnus thynnina*, Cuv., *Thynnus brevipinnis*, Cuv., *Auxis bias*, Bp., *Pelamis sarda*, Cuv., *Scomber scombrus*, L., *Scomber colias*, Cuv., *Caranx trachurus*, Cuv., *Naukrates ductor*, Cuv., le *Coriphene*, la *Sardella* o *Clupea Sardina*, Ris., l'*Accinga* o *Eugraulis encrasicolus*, Cuv., l'*Accinga* di Spagna, o *Eugraulis amara*, Risso.

Finalmente, vi sono dei pesci assolutamente avventizi od accidentali, che abitatori di lontanissime regioni arrivano fra noi, o seguitando navigli per pascersi di quel che si getta in mare, o deviati dalla forza delle correnti, o dispersi per qualunque altra causa. Questi sono i più rari, ma le prove ne sono ben certe nel *Lagocephalus Pennanti*, Swain, *Thynnus pelamis*, Cuv., *Lampris guttatus*, Retz, *Seriola bipinnulata*, Cuv. La quale ultima specie, rinvenuta soltanto da qualche tempo nel mare equatoriale della Polinesia, presso le isole dei Papù, porge forse una nuova prova delle lunghe peregrinazioni che eseguiscano i pesci della famiglia degli *Scombridi*.

Conchiudendo, in ultimo, sopra il risultato del lavoro intrapreso, crediamo aver dimostrato l'analogia della Fauna ittologica ligure con tutta la regione occidentale del bacino del Mediterraneo, compresa nei limiti sovra enunciati, come si vedrà dal catalogo, mentre si sono rettificati moltissimi errori sopra la corrispondenza del nome scientifico coll'appellazione volgare. Due nuove specie voluminose furono scoperte, la *Laeviraia bramante* e la *Cerna macrogenis*, Sassi. Si è assegnato un limite di profondità alla zona ittologica, ed assicurata una sola annua riproduzione nei pesci di quel litorale nel quale abbiamo sortito la patria.

PROSPETTO DEI PESCI DEL MARE LIGUSTICO.

NOME VOLGARE	NOME SCIENTIFICO	OSSERVAZIONI
Abri (vedi cabassùn) .	.	
Agua	<i>Trachinus draco</i> L. .	Tutto l'anno. Qualità seconda.
Agùn	<i>Belone acua</i> Riss. . .	Inverno. Qualità terza.
Agugia	Tutte le diverse specie del generi <i>Syngna-</i> <i>thus</i> L., e <i>Scyphius</i> Riss.	Tutto l'anno. Qualità quarta.
Agugiù rosso, o de stampa	<i>Spinax Blainvillii</i> B.	Tutto l'anno. Qualità quarta.
Agugiù da bocca nei- gra.	<i>Spinax uyatus</i> Bp. .	Inverno. Qualità quarta.
Agugiù maciù. . . .	<i>Spinax acanthias</i> C. .	Primav., estate. Qual. quarta.
Agugiù uigro, spinnel- lo, spinuccello, spinu- lin.	<i>Spinax niger</i> Bp. . .	Inverno. Qualità quarta.
Alalunga	<i>Thynnus alalunga</i> C.	Autunno. Qualità quarta.
Ancina	<i>Engraulis encrasiotus</i> . Cav. Piccola si chiama giochetto , nome che si estende anche ai piccoli della sardella , o <i>Clupea</i> <i>sardina</i> Riss.	Da marzo a maggio. Qualità terza. Si sale in gran quan- tità e il salume riesce della miglior qualità.
Ancina de Spagoa. . .	<i>Engraulis amara</i> Riss.	Primavera. Qualità quarta.
Angeo (pesco)	<i>Squatina angelus</i> D., e <i>Squat. oculata</i> Bp.	Autunno, inverno. Qual. terza.
Anghilla d'acqua duse .	<i>Anguilla vulgaris</i> Cav.	Tutto l'anno. Qualità seconda.
Anghilla d'acqua cà . .	<i>Anguilla vulgaris</i> Cav. var. <i>acutirostris</i>	Tutto l'anno. Qualità seconda.

NB. Riguardo all'ortografia genovese si è seguita quella proposta dall'ab. Olivieri nel
 suo dizionario genovese italiano, salvo alcuna modificazione.

NOME VOLGARE	NOME SCIENTIFICO	OSSERVAZIONI
Argentinala	<i>Argentina phrynenal</i> L.	Inverno. Qualità terza.
Argento (pesce) . . .	<i>Diaphana acus</i> Lowe, e <i>Diaphana denta-</i> <i>ta</i> Lowe.	Primavera. Qualità terza.
Ariolo (vedi luvèrto).		
Barchetta	<i>Serranus scriba</i> Cuv.	Primav., estate. Qualità quarta.
Bastea (vedi ciucca) .		
Bastinetta, gallinetta tremuza, batti p. .	<i>Torpedo naske</i> Cuv., <i>Torpedo Galtanus</i> Cuv., e <i>Torpedo Nobiliana</i> Bp.	Tutto l'anno. Qualità quarta.
Bausa	Tutte le specie dei ge- neri <i>Blennius</i> L., ed <i>Ichthyocoris</i> Bp.	Inverno. Qualità terza.
Bausetta	<i>Clinus argentatus</i> Val.	Estate. Qualità terza.
Bellua	<i>Notella fuscus</i> Swains.	Estate. Qualità terza.
Bezingo	<i>Pagellus centrodontus</i> Cuv.	Tutto l'anno. Qualità terza.
Biscia de ma	<i>Ophiurus serpens</i> Lac. <i>Conger myrus</i> Lac. . . <i>Sphagebranchus serpa</i> Riss.	Estate. Qualità quarta.
Bolaxo	<i>Serranus cabrilla</i> Cuv.	Estate. Qualità quarta.
Bolaxio de tacca ucigra.	<i>Serranus hepatus</i> Cuv.	Tutto l'anno. Qualità quarta.
Bottassa (vedi potassa).		
Bramante	<i>Laeciscus bramante</i> S.	Estate. Qualità quarta.
Bruneo, brusco bianco, bruno de fundo, tia- gallu, fiagallo, pea- gallu.	<i>Conger verus</i> Riss. Pic- colo si chiama fiagal- lo, tiagallo, pengallo.	Tutto l'anno. Qualità seconda.
Bruno de schenggio .	<i>Conger niger</i> Riss. . .	Tutto l'anno. Qualità seconda.
Buga	<i>Box boops</i> Bp.	Tutto l'anno. Qualità terza.
Budgassa (v. giannello)		
Budego	<i>Lophius breviphonus</i> C.	Tutto l'anno. Qualità terza.

NOME VULGARE	NOME SCIENTIFICO	OSSERVAZIONI
Cabassini, abri	<i>Atherina Boeri</i> Riss.	Aprile. Qualità terza.
Cagnassa, palumbo, palumba.	<i>Galeus canis</i> Bp. . .	Tutto l'anno. Qualità quarta.
Cagnassini de fuodu. .	<i>Odontaspis ferox</i> Ag.	Estate. Qualità quarta. Gionge al peso di 40 rubbi, come si può rilevare dall'individuo esistente nella collezione accademica.
Cagualu	<i>Heptanchias cinereus</i> Rafin.	Estate. Qualità quarta. Fra noi non arriva che a 12 circa libbre.
Can (pesce)	<i>Squalus glaucus</i> L., ed il <i>Carcharodon tannia</i> Bp.	Estate. Qualità quarta. Il Carchar. tannia Bp. è il gigante dei nostri mari. Nelle tonare di santa Margherita ne fu preso uno d'uo peso maggiore di 80 rubbi.
Cappin (pesce)	<i>Scurpaena acropha</i> L.	Tutto l'anno. Qualità seconda.
Castagneia	<i>Chromis castaneus</i> C.	Primavera. Qualità terza.
Castagneia russa . . .	L' <i>Apogon rex multorum</i> Cav., e l' <i>Anthi assacer</i> Bl.	Estate. Qualità terza.
Cavalla	<i>Scomber colias</i> Cav. .	Autunno. Qualità quarta.
Cavallo marino. . . .	<i>Hippocampus brevis rotetris</i> Cav.	Estate. Qualità quarta.
Cavigen.	<i>Cepola rubescens</i> Cav.	Inverno. Qualità terza.
Cavina, treggia de fuodu	<i>Mullus barbatus</i> L. .	Tutto l'anno. Qualità prima.
Cherussani.	<i>Trigla rorax</i> Bp. . .	Estate, inverno. Qualità terza.
Cioca, bastea	<i>Muena insculum</i> Cav.	Tutto l'anno. Qualità quarta.
Cipra, salacca.	<i>Atosa communis</i> Cav.	Estate. Qualità quarta.
Ciaccio, oxellu	<i>Myliobatis naetula</i> Bp.	Inverno. Qualità quarta.
Cravo (pesce)	<i>Gomus nigra</i> Cav. .	Tutto l'anno. Qualità seconda.
Cumolo, cumbinha . .	<i>Labrus curmeus</i> Bl. .	Estate. Qualità terza.
Dentexo	<i>Dentex vulgaris</i> Cav.	Tutto l'anno. Qualità prima.

SOMA VULGARE	NOME SCIENTIFICO	OSSERVAZIONI
Ferrassa	<i>Trygon pastinaca</i> D.	Inverno. Qualità quarta.
Ferrassa negra, o de fundo.	<i>Trygon brucco</i> Bp. . .	Inverno. Qualità quarta.
Fideà	<i>Trigla mitleus</i> Lac. .	Inverno. Qualità terza.
Figao	<i>Sciaenà umbra</i> Lac. .	Autunno, inverno. Qualità prima.
Figozotto	<i>Muraena blennoides</i> C.	Inverno e primavera. Qualità terza.
Furea (pesco)	<i>Peristedion cataphractum</i> Lac.	Inverno. Qualità quarta.
Gallettu	<i>Trigla aspera</i> Viv. . .	Inverno. Qualità terza.
Gallinetta (vedi battinetta).		
Gangà (vedi müsso).		
Gastòdella	<i>Soyris Camperi</i> Bp. .	Estate. Qualità quarta.
Gatto-bardu	<i>Scyllium stellare</i> Bp.	Inverno. Qualità quarta.
Gattùsso	<i>Scyllium canicula</i> C. .	Inverno. Qualità quarta.
Ghiggiùn de fundo o oeigro.	<i>Gobius capito</i> Cav. . .	Tutto l'anno. Qualità terza.
Ghiggiùn de scheuggio	<i>Gobius Jozzo</i> Bl. . .	Tutto l'anno. Qualità terza.
Giaochetti	I piccoli delle acciughe e i piccoli delle sardelle che vivono gregali.	I primi da agosto ad ottobre. I secondi dai 15 gennaio a tutto marzo. Qualità quarta.
Gianello o büdegassa .	<i>Lophius piscatorius</i> C.	Inverno. Qualità quarta.
Gratønha	<i>Echeneis remora</i> L. .	Estate. Qualità quarta.
Imbringo	<i>Trigla cuculus</i> L. . .	Tutto l'anno. Qualità terza.
Imperatù (pesco) . . .	<i>Luarus imperialis</i> Raflo.	Primavera. Qualità prima.
Indoradda	<i>Coryphaena hippurus</i> L.	Estate. Qualità seconda.

NOME VOLGARE	NOME SCIENTIFICO	OSSERVAZIONI
Laggiù	Tutte le specie dei generi <i>Labrus</i> , <i>Crenilabrus</i> , <i>Acanthilabrus</i> , <i>Ctenilabrus</i> e <i>Coriscus</i> Val.	Tutto l'anno. Qualità terza.
Lagheu	<i>Saurus lacerta</i> R. . .	Estate. Qualità terza.
Lambrina	<i>Trachipterus Bonelli</i> Val.	Estate. Qualità terza.
Lamma (pesco) . . .	<i>Lepidopus ensiformis</i> Vandel. - <i>Trachipterus iris</i> e <i>Trachipterus Spinolae</i> Val.	Estate. Qualità terza.
Laxerto	<i>Scomber scombrus</i> L.	Primavera. Qualità terza.
Leccia, leccia vena .	<i>Micropteryx Dumerilii</i> Agas.	Primavera. Qualità prima.
Leccia bastarda . . .	<i>Lichia grayae</i> Cov. .	Autunno. Qualità seconda.
Leoto (vedi musao) .		
Lioarda, o passienza .	<i>Lota elongata</i> R. . .	Inverno. Qualità terza.
Lingua	<i>Solea vulgaris</i> Cav. - <i>Solea oculata</i> Bp. - <i>Monochirus trichodactylus</i> Bp.	Inverno. Qualità prima.
Lingua d'arenha . . .	<i>Solea lascaris</i> R. . .	Inverno. Qualità prima.
Lingua oxellinha . . .	<i>Solea Kleinii</i> Bp. . .	Inverno. Qualità prima.
Lôu	<i>Smaris alcedo</i> Cav. .	Inverno. Qualità quarta.
Luasso	<i>Labrax Lupus</i> Cav. .	Tutto l'anno. Qualità prima.
Lusso	<i>Sphyræna spet</i> Lac. .	Estate. Qualità terza.
Lüxerna, löxerna de fundo, pampanotto	<i>Polyprion cernium</i> V. Adolto si chiama Laxerna, piccolo pampanotto.	Tutto l'anno. Qualità prima.
Lüxerna de scheuggio (vedi meo)		
Marc' Antogno	<i>Chimera monstrosa</i> L.	Estate. Qualità quarta.

SOME VULGARE	SOME SCIENTIFICI	OSSERVAZIONI
Massan (vedi mûsan).		
Memto	<i>Ozgerrhina Spallanzani</i> Agas.	Primavera, estate. Qualità terza.
Ménon	<i>Macna vulgaris</i> Cav. .	Tutto l'anno. Qualità terza.
Neu olûxerna de scheugio.	<i>Cerna gigas</i> Bp.	Primavera. Qualità seconda.
Neua	<i>Mola luna</i> Nardo . .	Estate. Qualità quarta.
Noenia	<i>Muraena helena</i> L. . .	Estate. Qualità terza.
Mniello	<i>Pristiurus melanopterus</i> Bp.	Estate. Qualità quarta.
Murûn	<i>Centrolophus pompidus</i> Lacép.	Autunno, inverno. Qualità prima. — È il re dei pesci nel mercato di Genova, avendo sapore più squisito di tutti gli altri, e vendendosi quindi a prezzo maggiore. Dagli autori che l'hanno ritrovato nelle acque di Nizza, Roma, ed altri litorali del Mediterraneo, vien reputato di carne men che buona, il che può dipendere dal pascolo e dalla natura dei fondi, quando non sia un pregiudizio prodotto dal nauseante lezzo della pelle colla quale non si deve lasciarlo bollire; precauzione non mai omessa dai buoni cuochi genovesi. Il nostro si ciba di meduse, vive a grandissima profondità, essendo veramente pelagio, e giunge al sommo al peso di due rubbi.
Murina	<i>Pogellus mormyrus</i> C.	Tutto l'anno. Qualità prima.

NOME VULGARE	NOME SCIENTIFICO	OSSERVAZIONI
Moe d' auciua	<i>Leptocephalus Spallanzani</i> Riss.	Primavera. Qualità quarta.
Moràdda (vedi sùlla).		
Mostella, mostella de fundo.	<i>Phycis blennoides</i> Sch-wed.	Inverno. Qualità terza.
Mostella de scheuggio.	<i>Phycis tinca</i> Schneid.	Tutto l'anno. Qualità terza.
Murùu spinoso	<i>Ruvettus pretiosus</i> Cor-co.	Estate. Qualità prima. — Ne fu preso un solo individuo in questi ultimi anni.
Mùggao (pesce) . . .	<i>Notidamus eimerus</i> C.	Estate. Qualità quarta. Giunge a peso maggiore di 20 rubbi.
Mùsau dell'ou	<i>Mugil auratus</i> Riss. .	Primavera, estate. Qualità seconda.
Mùsau gaghà	<i>Mugil capta</i> Cav. . .	Estate. Qualità seconda.
Mùsau leuso	<i>Mugil labeo</i> Cav. . .	Estate. Qualità terza.
Mùsau massuu	<i>Mugil cephalus</i> Cav. .	Tutto l'anno. Qualità terza.
Mùsau negro	<i>Mugil chela</i> Cav. . . .	Tutto l'anno. Qualità terza.
Nasello	<i>Merluccius sinuatus</i> Sw.	Tutto l'anno. Qualità seconda.
Negra	<i>Scymnus litchu</i> Cav. .	Estate. Qualità quarta.
Nissena	<i>Musculus equestris</i> , e <i>plebeius</i> Bp.	Tutto l'anno. Qualità terza.
Olà	<i>Sparus aurata</i> Bp. . .	Estate. Qualità prima.
Ombriuha	<i>Umbriua cirrosa</i> Bp.	Tutto l'anno. Qualità prima.
Ociellu	<i>Thynnus brevipinnis</i> C.	Autunno. Qualità terza.
Oggiù	<i>Oblata melanura</i> Cav.	Tutto l'anno. Qualità terza.
Organo	<i>Trigla lyra</i> L. . . .	Inverno. Qualità terza.
Oxello (pesce) o ciuccio.	<i>Myllobatis noctala</i> Bp.	Inverno. Qualità quarta.
Palamia	<i>Pelamis sarda</i> Cav. .	Da gennaio a giugno. Qualità seconda.
Pannitùu	<i>Thynnus pelamis</i> Cav.	Primavera. Qualità terza.
Pagau, pagau veaxo .	<i>Pagellus erythrinus</i> C.	Inverno. Qualità prima.

NOME VULGARE	NOME SCIENTIFICO	OSSEVAZIONI
Pagan biffio, pagan ad-dentexoiù, pagan dent-tù.	<i>Pagrus vulgaris</i> Cuv.	Inverno. Qualità prima.
Palo (pescio)	<i>Balistes caprisrus</i> L.	Estate. Qualità quarta.
Paluabò, paluuba (vedi cagnassa).		
Pampano	<i>Nancrates ductor</i> Cuv.	Autunno. Qualità terza.
Paupaaotto (vedi lu-xerna)		
Pappagallo	<i>Coryphæna cyaneus</i> L.	Estate. Qualità terza.
Pasien-a (vedi liarda).		
Petrale	Si intende sotto que-sto nome comune il <i>Pleuronectes citha-rus</i> , Spin., il <i>Pleu-ronectes Boscii</i> Bp., ed <i>Arnoglossus</i> Id.	Inverno. Qualità terza.
Pigaoeth (vedi zero).		
Porco (pescio)	<i>Centrina Salviani</i> , R.	Primavera, estate. Qual. quarta.
Preve (pescio)	<i>Uranoscopus scaber</i> L.	Tutto l'anno. Qualità terza.
Ratto (pescio)	<i>Utopias vulpes</i> Bp. . .	Autunno. Qualità quarta. Pesa sino a 25 rubli.
Razi (pescio). . . .	<i>Xyrichtys novacula</i> C.	Inverno. Qualità terza.
Razza bramante. . . .	<i>Laeciraris bramante</i> S.	Primavera, estate. Qual. terza.
Razza capuscina . . .	<i>Laeciraris oxyrhynchus</i> Bp., e <i>Laeciraris macrorhynchus</i> Id.	Tutto l'anno. Qualità terza.
Razza ruscina	<i>Dasybates asterias</i> Bp.	Estate. Qualità terza.
Razza sfograla. . . .	<i>Raja miraletus</i> L., e <i>Raja quadrimaculata</i> Bp.	Primavera. Qualità terza.
Razza spumosa, o razza vena	<i>Dasybates clavata</i> Bl.	Tutto l'anno. Qualità terza.
Razza torsina	<i>Raja falsucella</i> Bp. . .	Inverno. Qualità terza.

NOVE VOGLARE	NOME SCIENTIFICO	OSSERVAZIONI
Ré (pescio).	<i>Lampris gattatus</i> Retz.	Rarissimo. Qualità prima.
Roello	<i>Pagellus bogaraveo</i> C.	Tutto l'anno. Qualità terza.
Rùbia, o imbrìngo. . .	<i>Trigla lineata</i> Bp. . .	Estate. Qualità terza.
Rumbo veaxo.	<i>Rhombus maximus</i> C.	Inverno. Qualità prima.
Rumbo de fundo . . .	<i>Rhombus laevis</i> Ron- delet.	Inverno. Qualità prima.
Rumbo bastardo o rum- bo d'arenha	<i>Bothus rhomboides</i> Bp. e <i>Bothus podas</i> Bp.	Inverno. Qualità prima.
Rodonin	<i>Brana Ray</i> Cav. . .	Tutto l'anno. Molto abbondante negli alti fondi.
Ruodoninba.	<i>Erocaetus exilis</i> L.	Estate. Qualità quarta.
Rusotto	<i>Gobius aphya</i> Sassi, species nova.	Da novembre sino al principio d'aprile. Qualità seconda.
Sagao veaxo.	<i>Sargus Rondetii</i> C. .	Tutto l'anno. Qualità prima.
Salacca (vedi cipra).		
Sant'Andria (vedi svoid)		
San Pè (pescio) . . .	<i>Zeus faber</i> L.	Tutto l'anno. Qualità prima.
Sardenha	<i>Clupea sardina</i> R. Pic- cola si chiama giau- chetto, ou poco più grande, pàzetta, adul- ta sardenha.	Da aprile a giugno. Se ne sale gran quantità di barili
Salpa.	<i>Boz salpa</i> Cav. . . .	Tutto l'anno. Qualità quarta.
Sbiro (pescin)	<i>Tetragonurus Cuvieri</i> R.	Inverno. Qualità quarta.
Scaggiùn	<i>Cantharus orbicularis</i> Cav.	Estate. Qualità terza.
Scignos.	<i>Ophidium barbatum</i> L.	Estate. Qualità terza.
Scurpea, scurpea de schuggio.	<i>Scorpena porcus</i> L. .	Inverno. Qualità terza.
Scorpenin, scorpenin de fundo.	<i>Sebaste imperialis</i> C.	Inverno. Qualità quarta.
Serossma	<i>Sphyrna zygaena</i> Raf.	Inverno. Qualità terza. Arriva al peso di 20 rubbi.

NOME VULGARE	NOME SCIENTIFICO	OSSERVAZIONI
Serretta	<i>Lichia vadigo</i> Cuv. . .	Primavera. Qualità prima.
Serrenia	<i>Lichia amia</i> Cuv. . .	Primavera, estate. Qual. second.
Spa (pescio)	<i>Xiphias gladius</i> L. . .	Primavera, estate. Qualità prima. — Giunge nella massima grandezza a 20 e più rubbi.
Spurio	<i>Sargus annularis</i> C. . .	Estate, autunno. Qualità terza.
Su	<i>Cacanz trachurus</i> C. . .	Primavera. Qualità quarta.
Solla, o morüda	<i>Charax puntazzo</i> Cuv.	Tutto l'anno. Qualità quarta.
Spinello, spinüerü, spinulin (vedi agugliu neigro).		
Straxius	<i>Trachinus araneus</i> , e <i>Trachinus radiatus</i> Cuv.	Inverno. Qualità terza.
Strumbo	<i>Auris biasus</i> Bp. . . .	Estate. Qualità quarta.
Süssa peixe	<i>Petromyzon marinus</i> Lin.	Estate. Qualità quarta.
Svotiä, Sant'Andria, testa neigra.	<i>Sargus Salviati</i> Cuv.	Estate. Qualità seconda.
Tacca de fudo	<i>Echinorhinus spinosus</i> Blainv.	Primavera, estate. Qual. terza.
Tacca de scheggio	Tutte le diverse specie del genere <i>Lepidogaster</i> , Gouan.	Primavera, estate. Qual. terza.
Tanüa	<i>Cantharus vulgaris</i> C.	Estate. Qualità quarta.
Tagallo (vedi broneo gianco).		
Torsi-cuä (vedi razza).		
Treggia veaxa, n treggia de scheggio	<i>Mallus surmuletus</i> L.	Tutto l'anno. Qualità prima.
Treggia de fudo (vedi cavün).		
Treggia volatica	<i>Dietylopterus volitans</i> Lac.	Estate. Qualità terza.

NOME VOLGARE	NOME SCIENTIFICO	OSSERVAZIONI
Tremoize (vedi battinella).		
Trambetta (pescio) . .	<i>Centiscus scolopax</i> L.	Inverno. Qualità quarta.
Tunoella, tunna. . . .	<i>Thynnus thynnus</i> C.	Autunno. Qualità terza.
Tunno	<i>Thynnus vulgaris</i> C. .	Da marzo ad ottobre. Qualità seconda. — Nelle tonnare di riviera di Levante se ne prendon esemplari di varia grandezza dalle tre libbre fino a 15 rubbi, non mai però di 45 rubbi come in Sardegna.
Turdu.	<i>Larus turdus</i> L. . .	Tutto l'anno. Qualità terza.
Vaca (pescio)	<i>Cephaloptera Giorna</i> D.	Primav., estate. Qual. quarta.
Verdun	<i>Squalus glauus</i> L. . .	Estate. Qualità quarta. — Soppassa i 20 rubbi.
Zerla	<i>Somus chryselis</i> Cav.	Inverno. Qualità quarta.
Zerlo	<i>Smaris gracilis</i> Bp. . Piccolo si chiama pignoetto, e corre gregale come i gianchetti, adulto si dice zerlo.	I pignoetti nell'estate, i zerli tutto l'anno. Qualità quarta.
Zigoella.	<i>Julis mediterraneus</i> ed <i>Julis Gioffredi</i> Riss.	Estate. Qualità terza.

DISTRIBUZIONE DEI PESCI LIGURI

secondo il sistema ittologico pubblicata dal principe Bonaparte
negli atti del congresso di Milano nell'anno 1845.

CLASSIS PISCES.

Subclassis Elasmobranchii. — *Sectio 1.^a Plagiostomi.* — *Ordo I. Selache. Rajidae.*

Cephalopterini.

Cephaloptera Giorna, Dum. — *Raja cephaloptera, Schueid.* — *Raja Giorna, Lacep.*, volgarmente *pescio Vacca*.

Myliobatini.

Myliobatis noctula, Bp., volg. *Orello, Cincio*.

Trygonini.

Trygon pastinaca, Dam. — *Raja pastinaca L. e Lacep.*, volg. *Ferrassa neigra, Ferrassa de fundo*.

— *bruceo, Bp.*, volg. *Ferrassa neigra, Ferrassa de fundo*.

Rajni.

Dasybatis clavata, Blainv. — *Raja clavata* L., volg. *Razza spinosa*, *Razza veuro*.

— *asterias*, Bp. — *R. asterias*, Delaroche — *R. oculata*, Risso, volg. *Razza ruscinha*.

Raja falcuceta, Bp., volg. *Razza torsi-cua*.

— *miraletus*, Lin. — *R. bioculata*, Geoff., volg. *Razza sfeugenha*.

— *quadrinaculata*, Bp. e Risso, volg. *Razza sfeugenha*.

— *marginata*, Lacep., volg. *Specie de torsi-cua*.

Leviraja bramaute, Sassi. — Specie nuova. — *Latitudo disci longitudinalium et sextam partem superans; latera anteriora clonubi profundè excavata, sed a basi rostri fere usque ad apicem pinnarum pectoralium notabiliter convexa. Rostrum acutum spatio interoculari triplo cum quadrante longius, utriusque scabrum, orbitis supra aculeatis; superficies levis, demptis marginibus vixle asperis. Cauda longitudine corporis minor, aculeis serie 1-5 retroflexis; dentes valde acuminati. Color superius plumbeus, maculis rotundis raris nigris aut albis; inferius pallescens.* — È la maggiore delle razze del nostro mare arrivando al peso straordinario di 20 rubbi.

— *oxyrhynchus*, Bp., volg. *Razza capüssinha*.

— *macrorhynchus*, Bp., volg. *Razza capüssinha*.

Torpedinini.

Torpedo narke, Cav. — *Raja torpedo*, Gmel., volg. *Battinetta*, *Gallinetta*, *Tremalze*, *Battipotta*.

— *Galraui*, Cav. — *R. Torpedo*, L. — *Raja torpille*, Lacep., volg. *Battinetta*, *Gallinetta*, *Tremoize*, *Battipotta*.

— *Nobiliana*, Bp., volg. *Battisetta*, *Gallinetta*, *Tremoize*, *Battipotta*.

Squalide.

Squatiniini.

Squatina angelus, Duan. — *Squalus squatina*, L. — *Squale ange*, Lac., volg. *pescio Angeo*.

Squatina oculata, Bp., volg. *pescio Angeo*.

Spinacini.

Spinax acanthias, Cuv. — *Acanthias vulgaris*, Bp., volg. *Aguggioù maccioù*.

— *Blainvillii*. *Acanthias Blainvillii*, Ris. e Bp., volg. *Aguggioù russo*, *Aguggioù de stampa*.

— *niger*, Bp. *Squalus* — *spinax*, L. e Laccp., volg. *Spinuëccio*, *Spinuëllò*, *Spinulin*, *Aguggioù neigro*.

— *uyatus*, Bp. — *Squalus uyatus*, Rafn. — *Squalus infernus*, Blainv., volg. *Aguggioù da bucca neigra*.

Centrina Salviani, Ris. — *Squalus centrina*, Lin. — *Squale humantun*, Laccp., volg. *pescio Porco*.

Scymnorhiniini.

Scymnus lichia, Bp. — *Squalus americanus*, Gmel. — *Squale liche*, Laccp. — *Scymnus nicaensis*, Ris., volg. *Neigra*.

Echinorhinus spinosus, Blainv. — *Squalus spinosus*, Gmel. — *Squale bouclé*, Broussonet. — *Scymnus spinosus*, Cuv., volg. *Tacca de fundo*.

Notidanini.

Notidanus griseus, Cuv. — *Squalus griseus*, Gmel. — *Squale grisè*, Broussonet, volg. *pescio Moggio*.

Heptanchias cinereus, Rafn. — *Squalus cinereus*, Gmel. — *Squale perlon*, Broussonet e Cuvier, volg. *Cagnolìn*.

Odontaspidini.

Odontaspis ferox, Agas. — *Squalus ferox*, Ris. — *Triglochin ferox*, Mull. ed Hentl., volg. *Cagnassùn de fundo*.

Lamnini.

Carcharodon lamia, Bp. — *Squalus carcharias*, Ris. — *Squale lamia*, Blainv., volg. *pescio Can*.

Oxyrhina Spallanzanii, Bp. — *Isurus Spallanzanii*, Rafn., volg. *Meanto*.

Atopiadini.

Atopias vulpes, Bp. — *Squalus vulpes*, Gmel., volg. *pescio Ratto*.

Squalini.

Sphyrna zygaena, Rafn. — *Squalus zygaena*, L., volg. *pescio Scrossua*.
Squalus glaucus, L. — *Carcharias glaucus*, Cuv., volg. *Verdàn*, *pescio Can*.

Galeus canis, Bp. — *Squalus galeus*, L. — *Squale milandre*, Lac.,
 volg. *Patumbo*, *Patumba*, *Cagnassa*.

Mustelini.

Mustelus plebejus, Bp. — *Squalus mustelus*, L. — *Enissole comune*, Cuv., volg. *Nisseua*.

— *equestris*, Bp., volg. *Nisseua*. I nostri pescatori non lo distinguono dalla specie precedente.

Scyllini.

Pristiurus melanostomus, Bp. — *Galeus melanostomus*, Rafn. — *Scyllium* Artedi, Ris., volg. *Moiello*.

Scyllium stellare, Bp. — *Squal. stellaris* L. — *Squale rochier*, Lacep.

— *Squal. catulus*, Cuv., volg. *Gatto-bardo*.

— *canicula*, Cuv. — *Squalus canicula*, L. — *Squale roussette*, Lac., volg. *Gattüso*.

Ordo II. Holocephala. Chimæridæ.

Chimærii.

Chimæra monstrosa, L. — *Chimère arctique*, Lacep. e Cuv., volg. *Marcantogno*.

Subclassis II. Pomatobranchii. — Sectio 2.^a Micrognathi. Ordo III. Sturiones. Acipenseridæ.

Acipenserini.

Acipenser sturio, Lin., volg. Sturion.

Subclassis III. Teleostomi. — Ordo V. Cyprini. Clupeide.

Clupeini.

Clupea sardina, Risso, volg. Gianchetto quando è molto piccolo, Paasetta un poe più grande, Sardenha quando è adulto.

Alosa communis, Cuv. — *Clupea alosa*, L., volg. Salacca, Laccia, Cipra.

Eugraulis enchrasiculus, Cuv. — *Clupea enchrasiculus*, L., volg. Anciuu. I suoi piccoli che vivono gregali si chiamano Gianchetti come quelli della *Clupea sardina*, Ris., o Sardella comune.

— *amara*, Ris., volg. Anciuu de Spagna.

Scopelidae.

Scopelini.

Odontostomus Balbo, Cocco. — *Scopelus Balbo*, Risso e Cuv. Di rado avviene che se ne faccia preda, perciò non ha nome volgare; si nutrice di piccole acciughe, negli stuoli delle quali si trova mescolato.

Autopodiini.

Saurus lacerta, Risso. — *Salmo saurus*, L., volg. Lagheu.

Salmonidae.

Coregonini.

Argentina Spyraena, Lin., volg. Argentinha.

Esocidae.

Esocini.

Alepocephalus rostratus, Risso. Raro nell'estate, vivendo nelle grandi profondità.

Ordo VI. Pharyngognathi. Erocetidae.

Exocetini.

Exocetus exsiliens, Lin., volg. *Rundaniuha*.

Belonini.

Belone acns, Risso. — *Esox belone*, L., volg. *Agùn*.

Sayris Camperi, Bp. — *Scombresocce camperien*, Lacep., volg. *Gastòdella*.

Labridae.

Labriini.

Labrus turdus, Lin., volg. *Turdo*.

— *merula*, Lin., volg. *Laggiùn*.

— *carneus*, Blok. — *Labrus trimaculatus*, Pennant., volg. *Ciumba*, *Ciumbinka*.

— *festivus*, Ris., volg. *Laggiùn*.

Crenilabrus pavo, Val. (non Lin.), volg. *Laggiùn*.

— *Melanops*, Val., volg. *Cannaaleo*.

— *Roissatii*, Ris. e Val., volg. *Laggiùn*.

— *Mediterraneus*, Val., volg. *Laggiùn*.

— *Boryanus*, Val., volg. *Laggiùn*.

Coriscus rostratus, Val., volg. *Laggiùn*.

Julis mediterraneus, Ris., volg. *Zigoetta*.

— *Gioffredi*, Ris., volg. *specie di Zigoetta*.

Xyrichtys novacula, Cuv., volg. *pescio Razù*.

Chromididae.

Chromini.

Chromis castaneus, Cuv. — *Sparus Chromis*, Lin., volg. *Castagneù*.

Ordo VII. Heterosomata. Pleuronectidae.

Pleuronectiini.

Pleuronectes citharus, Spinola. — *Pleuronectes macrolepidotus*, *Dela-*
roche e Cuv. (non Bp.) — *Citharus*, *Rondelet*, volg. *Petràle*.

— *arnoglossus*, Bp. e Schneid. — *Rhombus nudus*, Ris. e Cuv.,
volg. *Petràle*.

Pleuronectes Boscii, Ris. e Bp. — *Rhombus Boscii*, Cuv., volg. *Petrale*.

Rhombini.

Rhombus maximus, Cuv. — *Pleuronectes maximus*, L., volg. *Ruambo vearo*.

— *Laevis*, Rondel. — *Pleuronectes rhombus*, L. — *Rhombus barbatus*, Cuv., volg. *Rumbo de fundo*.

Bothus rhomboides, Bp. — *Rhomboides*, Rondel. — *Rhombus mancus*, Ris., volg. *Rumbo bastardo*.

— *podas*, Bp. — *Pleuronectes podas*, Delaroche. — *Pleuronectes argus*, Ris. — *Rhombus podas*, Cuv., volg. *Rumbo bastardo*.

Soleidae.

Soleini.

Solea vulgaris, Cuv. — *Pleuronectes solea*, Lia., volg. *Lingua o Seta*.

— *oculata*, Bp. e Rondel. — *Pleuronectes ocellatus*, Schneid. — *Pleuronectes pegusa*, Lacep., volg. *Lingua o Seta*.

— *Lascaris*, Ris. e Bp., volg. *Lingua d'arenha*.

— *Kleinii*, Bp. — *Rhombus Kleinii*, Ris., volg. *Lingua ozelliana*.

Monochirus trichodactylus, Bp. — *Pleuronectes pegusa*, Ris. (non Lacep.), volg. *Lingua*.

Ordo IX. Percæ. Fistularidae.

Caproidini.

Capros aper, Cuv. — *Zeus aper*, L., volg. *Truabetta larga*.

Centriscini.

Centriscus scolopax, Lia., volg. *pescio Truabetta*.

Menidae.

Menaii.

Mena vulgaris, Cuv. — *Sparus mena*, L., volg. *Menoa*.

— *Osbekii* Cuv. — *Sparus tricuspidatus*, Spia., volg. *specie de Menoa*.

— *Jusculum*, Cuv., volg. *Ciocca*.

- Suavis gracilis*, Bp. — *Sparus suavis*, *Delaroche*, volg. *Zerlo*.
 — *alcedo*, Cuv. e Bp., volg. *Löcu*.
 — *chryselis*, Cuv. e Bp., volg. *Zerta*.
Sparidae.

Obladini.

- Oblata melanurus*, Cuv. — *Sparus melanurus*, L., volg. *Ouggia*.
Box salpa, Cuv. — *Sparus salpa*, L., volg. *Sarpa*.
 — *boops*, Bp. — *Sparus boops*, L., volg. *Baga*.

Cantharini.

- Cantharus vulgaris*, Cuv. — *Sparus cantharus*, L., volg. *Tanua*.
 — *orbicularis*, Cuv., volg. *Scaggiu*.

Denticini.

- Dentex vulgaris*, Cuv. — *Sparus dentex*, L., volg. *Deutexo*.
 — *macrophthalmos*, Cuv. — *Sparus macrophthalmos*, Bl. —
Dentex erythrostomus, Ris., volg. *Sciauma*.

Sparini.

- Pagellus mormyrus*, Cuv. — *Sparus mormyrus*, L., volg. *Murona*.
 — *bogaraveo*, Cuv. — *Sparus bogaraveo*, *Guel.*, volg. *Roello*.
 — *Centrodontus*, Cuv. — *Sparus centrodontus*, *Laroche*, volg. *Bezùgo*.
 — *erythrinus*, Cuv. — *Sparus erythrinus*, L., volg. *Pagau veaxo*.
Pagrus vulgaris, Cuv. — *Sparus pagrus*, L., volg. *Pagau büffo*,
Pagau addentezou, *Pagau testau*.
Sparus aurata, Lin. e Bp. — *Chrysophris aurata*, Cuv., volg. *Oà*.
Sargus Roudeletii, Cuv. — *Sargus raucus*, *Geoff.*, volg. *Svoià*, *San-*
t' Andria, *Testa ueigra*.
 — *annularis*, Cuv. — *Sargus annularis*, L. e *Laroche*, volg. *Sparto*.
Chacax puntazzo, Cuv. — *Sparus puntazzo*, *Guel.* — *Sparus acuti-*
rostris, *Laroche*. — *Charax acuti-rostris*, *Ris.*, volg. *Sutta*, *Ma-*
riudda in riviera di Ponente.
Sciaenidae.

Scianini.

Corvina nigra, Cuv. — *Sciaena umbra*, L. e *Lacep.* — *Sciaena nigra*, Bl., volg. *pescio Croco*, Loca.

Umbrina cirrosa, Bp. — *Sciaena cirrosa*, L. — *Perca umbra*, *Lacep.*, volg. *Umbrinua*.

Sciaena umbra, L. e Bp. — *Cheilodipterus aquila*, *Lacep.* — *Sciaena aquila*, Cuv., volg. *Figan*.

Percidae.

Percini.

Labrax lupus, Cuv. — *Perca labrax*, L. — *Centropomus lupus*, *Lacep.*, volg. *Luasso*. Giovine è spesso punteggiato di nero sul dorso.

Apogon rex mullorum, Cuv. — *Mullus imberbis*, L. — *Apogon ruber*, *Lacep.* — *Centropomus rubens*, *Spinola*, volg. *Castagneña russa*.

Anthias sacer, Bl. e Bp. — *Labrus anthias*, L. — *Lutjanus anthias*, *Lacep.* — *Serranus anthias*, Cuv., volg. *Castagneña russa*; confuso dalla maggior parte dei pescatori, in ragione del color rosso, con la specie precedente.

Serranus scriba, Cuv. — *Perca scriba*, L. — *Holocentrus argus*, *Spin.* — *Holocentrus argus*, *Laroche*, volg. *Barchetta*.

— *cabrilla*, Cuv. — *Perca cabrilla*, L. — *Holocentrus chani*, *Lacep.*, volg. *Bolaxo*.

— *hepatus*, Cuv. — *Labrus hepatus*, *Lin.* — *Holocentrus siagonotus*, *Laroche*, volg. *Bolaxo da tacca negra*.

Cerna gigas, Bp. — *Serranus gigas*, Cuv. — *Perca gigas*, *Gmel.*, volg. *Men*.

— *macrogenis*, *Sassi*. Nuova specie. *B.* 7. *D.* 41-46. *P.* 13. *V.* 1-3. *A.* 3-14. *C.* 20. *Operculum tricuspidatum. Longitudo 7 vices crassitiem, et quatuor vices altitudinem evincens. Caput anterius fere per rectilineam attenuatum. Maxilla inferior superiorem excedens dimidia parte longitudinis propriae.* Diversissima dalla *Cerna gigas*, Bp. o *Serranus gigas*, Cuv., per il profilo acuto del capo, il numero diverso dei raggi, e la lunghezza straordinaria della mascella inferiore che ci ha suggerito il nome. Il colore era oscuro uniforme dappertutto; l'unico individuo finora conosciuto fu

preso l'anno scorso, e si conserva nella raccolta accademica.

Polyptrion cernium, Val., volg. *Lüzerna*, piccolo, *Pampanotto*.

Sphyrænidæ.

Sphyrænini.

Sphyræna spet, Lacep. — *Esox sphyræna* Lin., volg. *Lüso de mä*.
Atherinidæ.

Atherinini.

Atherina hepsetus, Lin. e Cuv., volg. *Cheunau*.

— *mochon*, Cuv. *Atherina hepsetus* var. 2 *mochon*, seu *mochon*,
Delaroche, volg. *Cheunau*.

— *Bojeri*, Ris. e Cuv., volg. *Cabassùn*, *Abri*.

Mugilidæ.

Mugilini.

Mugil cephalus, Cuv. — *M. cephalus* var. A., *Delaroche*. — *M. cephalus*,
Ris., volg. *Müsao massàn*.

— *capito*, Cuv. — *Mugil ramada*, *Ris.*, volg. *Müsau gangà*.

— *auratus*, *Ris.* e Cuv., volg. *Luzento*, *Müsao dell'ou*.

— *chelo*, Cuv. — *M. cephalus* var. B., *Delaroche*. — *M. labrosus*,
Ris., volg. *Müsao negro*.

— *labeo*, Cuv., — *M. provincialis*, *Ris.*, volg. *Leuio*.

Tetragonuridæ.

Tetragonurini.

Tetragonurus Carierii, *Ris.*, volg. *pescio Shiro*.

Mullidæ.

Mullini.

Mullus surmuletus, L., volg. *Treggia veaxa*, *Treggia de scheuggio*.

— *barbatus*, L., volg. *Treggia de fundo*, *cavàn*.

Triglidæ.

Triglini.

Trigla lineata, Pennant, — *Rouget camard*, Cuv., volg. *Rubin*.

— *cuculus*, L. — *Trigla Pini*, Bl. — *Trigla hirundo*, *Ris.* —
Rouget comun, Cuv., volg. *Imbrìago*.

Trigla aspera Ris. e Cav. — Trigla cavillone, Lacep., volg. Galletto.

— *milvus*, Lacep. — Grondin rouge, Cav., volg. Fideu.

— *obscura*, Lin. — Morruda, Cav., volg. Spagnollo, Spagnoletto.

— *corax* Bp. — Perlon de la Mediterranée, Cav., volg. Cheussano.

— *lyra*, L. e Cav., volg. Organo.

Peristedion cataphractum, Lacep., volg. pescio Farca.

Scorpenini.

Scorpena scrofa, L. — La grande scorpena, Cav., volg. pescio Cappàn.

— *porcus*, L. — La petite scorpena, Cav., volg. *Scorpena*.

Sebaste imperialis, Cav. — *Scorpena daetyloptera*, Laroche, volg. *Scurpenia*, *Scurpenia de fundo*.

Trachinidae.

Trachinini.

Trachinus draco, Lin., volg. Agnù.

— *radiatus*, Cav., volg. Stràxina.

— *araneus*, Lin., volg. Stràxina.

Frauscopini.

Frauscopus scaber, Lin., volg. pescio Prave.

Scombridae.

Centronotini.

Nancrates ductor, Cav. — *Gasterosteus ductor*, L. — *Scomber ductor*, Bl., volg. Pampano.

Lichia grayes, Cav. — *Scomber glaucus*, L., volg. Leccia bastarda.

— *amia*, Cav. — *Scomber amia*, L., volg. Serreüia.

— *vadigo*, Cav., volg. Serretta.

Micropteryx Dumerilii, Agassiz, volg. Leccia veaza.

— *bipinnulatus* Agas. — *Seriola bipinnulata*, Cav., Zool. di *Frycinet*, t. 61. f. 3. Crediamo poter riferire a questa specie uno stuolo di 8 o 10 individui colti nel nostro mare la primavera del 1846, sconosciuti intieramente ai pescatori.

Ritrovata soltanto nei mari equatoriali della Polinesia presso le isole dei Papù, è probabile che ci sia pervenuta come il *Lagocephalus Penanti* dirigendo prima il corso all'Ovest verso il capo di Buona Speranza, quindi piegando al Nord sino allo stretto di Gibilterra, pel quale è entrata nel bacino del Mediterraneo.

Carangini.

Caranx trachurus, Cuv. — *Scomber trachurus*, L., volg. *Su*, *Sorallo*.

— *suaureus*, Ris., volg. *Ciuciallo*.

— *lana* Geoff., volg. *specie de Su*. È proprio dell'Egitto, e delle parti orientali del bacino del mediterraneo, ma suol visitare le nostre spiagge, poichè in un solo anno ne furono presi due individui adulti, l'uno in primavera, l'altro nell'autunno.

Niphiadini.

Niphius gladius, L., volg. *pescio Spa*.

Tetrapturus belone Rafinesque, volg. *specie de pescio Spa*. Un solo individuo fu colto vari anni sono, nè i pescatori avevano memoria d'averne visto altra volta.

Bramini.

Brama Ray, Cuv. — *Sparus Ray*, Block., volg. *Ruadanin*.

Stromuteini.

Stromateus fiatola, L., volg. *Leccia bastarda*.

— *Microchirus*, Bp. — *Seserinus* Rondeletii, Cuv.

Lampris guttatus, Retz., volg. *pescio Rò*. Rarissimo, proveniente dall'Oceano, di sapore squisito.

Lycarus imperialis, Rafinesque. — *Ausonia Cuvierii*, Risso, volg. *pescio Inpentà*. È di sapore migliore e più raro ancora del precedente, prendendosi un individuo ogni dieci o dodici anni. L'ultimo preso recentemente fu acquistato per la raccolta accademica; pesava 60 circa libbre.

Coryphaenini.

Coryphaena hippurus, L., volg. *Indoradda*.

— *equisetis*, L., volg. *Pappagallo*. Questa specie oceanica sebbene non sia stata giammai indicata nel mediterraneo, pure visita quasi annualmente il nostro litorale, essendo volgarmente conosciuta dai pescatori col nome anzidetto.

Centrodophus pompilus, Cuv. — *Coryphaena pompilus*, L., volg. *Muràn*, *Mariàn*.

Zeini.

Zeus faber, Lin., volg. *pescio San Pè*.

— *pungio*, Cuv., volg. *pescio San Pè*.

Scombrini.

Scomber Scombrus, Lin., volg. *Lazerto*.

— *colias*, Cuv., volg. *Cavalla*.

Auxis vulgaris, Cuv. — *Scomber bisus*, Rafin. — *Scomber Rocheanus*, Ris., volg. *Strumbo*.

Thynnus vulgaris, Cuv. — *Scomber Thynnus*, L., volg. *Tunno*.

— *thunpina*, Cuv. — *Scomber alliteratus*, Rafin., volg. *Tanna*, *Tunnella*.

— *brevipinnis*, Cuv., volg. *Occialùn*.

— *atalunga*, Cuv., volg. *Atalunga*.

• *Ruvettus pretiosus*, Cocco, volg. *Muràn spinoso*. Un solo individuo fu preso in quest'ultimi anni.

Trichiurini.

Lepidopus ensiformis, Vandelli. — *Lepidopus argireus*, Cuv., volg. *pescio Lamma*.

Cepolidae.

Cepolini.

Cepola rubescens, Lin., volg. *Cavigea*, *Picaggia*.

Lophotini.

Lophotes Cepediauns, Giorna. *Rarissimo.*

Gymnetrini.

Trachypterus iris, Cuv., volg. *pescio Lamma.*

— *Bonelli*, Cuv., volg. *Lambrea.*

— *Spinolæ*, Cuv., volg. *pescio Lamma.*

Gobidae.

Gobini.

Gobius capito, Cuv., volg. *Ghiggiù neigro, Ghiggiù de fuado.*

— *Jozzo*, Bl., volg. *Ghiggiù de schenggio.*

— *aphya*, Sassi, volg. *Ruscetto.* Lo credo una nuova specie.

Cyclopteride.

Cyclopterini.

Lepadogaster Desfontaini, Ris., volg. *Tacca scheuggio.* Esistono varie altre specie, che sinora non si son potute raccogliere.

Bleunide.

Blennini.

Blennius ocellaris, Lin., volg. *Bausa, Galletto.*

— *gattoruggine*, Lin., volg. *Bausa.*

— *palmicoruis*, Cuv., volg. *Bausa.*

Ichthyocoris basiliscus, Bp., volg. *Bausa.*

Anarichadini.

Clinus argentatus, Valenc. — *Blennius variabilis*, Rafn., volg. *Bausetta.*

Callionymide.

Callionymini.

Callionymus maculatus, Rafn. — *Callionym. cithara*, Cuv., volg. *Tacca scheuggio.* Vi hanno altre specie che non si sono ancora studiate.

*Lophidae.**Lophini.*

Lophius piscatorius, Cuv. e Bp. — *Lophius budegassa*, Spinola, volg. *Gianello*, *Budegassa*. — Di carne molto inferiore e meno buona del seguente, perviene a grandezza quasi maggiore del doppio, motivo per cui è chiamato *budegassa*. Bollito si scioglie quasi intieramente nell'acqua, mentre l'altra specie rimane della solita consistenza.

- *brevipinnis*, Cuv. — *Lophius Budegassa*, Bp. non Spinola, volg. *Budego*, *Budego ruscin*. Differisce dal primo oltre la consistenza della carne pel colore rossiccio, non nero ondeggiato, per la forma più allungato del corpo, pel minor numero dei raggi alla seconda pinna dorsale, finalmente per un carattere che non è stato ancora rilevato, cioè la membrana nera del peritoneo, mentre nell'altro è costantemente bianca. Quindi erediamo coll'illustre signor march. Spinola e col principe Bonaparte, andar errato il Valenciennes nel persistere a voler riunire in una sola le due specie, distinte con avvedutezza dai pescatori, e dai consumatori.

Ordo 10. *Gadi. Gadidae.**Gadini.*

Morrhua blennoides, Cuv. — *Gadus blennoides*, Pall., volg. *Figaotto*.

Merlangus vernalis, Ris., volg. *Potassa*, *Bottassa*.

Mora mediterranea, Ris. — *Gadus furcatus*, Swains. Rarissimo nell'estate.

Merlucius sinuatus, Swains. — *Merluccius esculentus*, Ris., volg. *Nasello*.

Lotini.

Lota elongata, Ris., volg. *Linarda*, *Pasiensa*.

Motella fusca, Swains, volg. *Bellua*.

Phycis mediterraneus, Laroche. — *Blennius phycis*, L., volg. *Mustella de scheuggio*.

- *blennoides*, Schneid. — *Gadus albidus* Gmel. — *Blennius gaidoides*, Ris., volg. *Mustella*.

*Macruridae.**Macrurini.*

Lepidoleprus trachyrhynchus, Ris., rarissimo nell'estate.

*Echeneididae.**Echeneidini.*

Echeneis remora, L., volg. *Gratonka*.

Ordo 11. *Ophiosomata*. *Ophidiidae*.

Ophidiini.

Ophidium barbatum, L., volg. *Sciguua*.

Diaphasia acus, Lowe. — *Fierasfer imberbe*, Cuv., volg. *pescio Argento*.

— *dentata*, Lowe. — *Fierasfer dentatum*, Cuv., volg. *pescio Argento*.

*Muraenidae.**Muraenini.*

Muraena helena, L. — *Muraenophis helena*, Lacep., volg. *Moenha*.

— *unicolor*, DeTarroche. — *Muraena Christini*, Ris., volg. *Moenha*.

Conger verus, Ris. — *Conger vulgaris*, Cuv. — *Muraena couger*, L., volg. *Brunco* quando è adulto, *Fiagallo*, *Peagallo*, *Tia-gallo* quando è piccolo.

— *niger*, Ris., volg. *Brunco de scheuggio*.

— *myrus*, Ris. — *Muraena myrus*, L., volg. *Biscia de mǎ*.

Anguilla vulgaris, Cuv., volg. *Anguilla d'ægua duse*.

— *vulgaris*, Cuv., var. *acutirostris*, volg. *Anghilla d'ægua sǎ*.

Sphagebranchus serpa, Ris., volg. *Biscia de mǎ*.

Ophisurus serpens, Lacep. — *Muraena serpens*, L., volg. *Biscia de mǎ*.

Leptocephalini.

Leptocephalus Spallanzanii, Ris. — *Leptocephalus Morisii*, Gmel., *Moæ d'anciuu*.

Section. IV. *Plectognathi*. Ordo 12. *Gymnodontes*. *Tetraodontidae*.

Tetraodontini.

Lagocephalus Pennanti, Seaius. — *Tetraodon laevigatus*, Cuv. —
Tetraodon lagocephalus, Pennant. L'unico individuo pescato nel
 nostro mare, fu descritto dal chiar. sig. march. Durazzo, ed illu-
 strato in seguito nella Fauna Italica dal principe Bonaparte.
Orthogoriscidae.

Molini.

Mola luna Nardo. — *Tetraodon mola*, L., volg. *pescio Mena*.
Ordo 13. Sclerodermi. Balistidae.

Balistini.

Balistes capricus, L., volg. *pescio Pato*.
Subclassis III. Lophobranchii — Sectio V. Syngnathi — Ordo 14.
Osteodermi. Pegasidae.

Hippocampini.

Hippocampus brevisrostris, Cuv., volg. *Cavallo marino*.
Syngnathidae.

Syngnathini.

Syngnathus typhle, L. — *Syngnathus Rondeletii*, DeCiaroche, volg.
Aguggia.

Scyphini.

Scyphius litoralis, Ris., volg. *Aguggia*.
Subclassis IV. Marsipobranchii — Sectio VI. Cyclostomi. Ordo 15.
Helminthoidei. Petromyzonidae.

Petromyzini.

Petromyzon marinus, Lin., volg. *Süssa peire*.



RETTILI

I rettili si trovano rari anzi che no, sì in numero che in ispecie, il che forse deve ripetersi dall'aria piuttosto asciutta del nostro clima, essendo noto che essi hanno largo predominio nelle zone umide equatoriali. Unico fra i nostri rettili forniti di veleno si è la *Vipera aspis*, Mer., abitante soltanto nelle vette più montane dell'Apennino, mancando fortunatamente fra noi la velenosa *Pelias berus*, Mer., propria di molti luoghi palustri d'Italia. Siamo privi di varie specie di colubri, e salamandre acquatiche viventi in Lombardia, mentre invece possediamo il *Thimon ocellatus*, Tschudi, e l'*Ascalobotes Mauritanicus*, Bp., che in quella non furono osservati.

Chelonj.

Emys lutaria, Mer., volg. Tartaruga.

Thalassochelys caretta, Bp., volg. Tartaruga de mà.

Saurj.

Podarcis muralis, Wagl., volg. Grigua.

Lacerta agilis, Dand., volg. Lagheu.

r. 11.

Thomomys ocellatus, Tschudi, volg. *Laghetta de coste*.

Asculobates Mauritanicus, Bp., volg. *Scurpiàn*.

Seps chalcidicus, Cuv.

Anguix fragilis, Liu., volg. *Sagneggia*, *Seirella*, *Seiguella*.

Ofidj.

Coluber viridi-flavus, Lacep., volg. *Biscia ôzelluha*.

Zamenis Riccioli, Bp., volg. *Biscia*.

Euphis quadrilineatus, Bp., volg. *Biscia rattwa*.

Natrix torquata, Mer., volg. *Biscia d'acqua*.

— *tesselata*, Mer., volg. *Biscia*.

Vipera aspis, Mer., volg. *Vipera*.

Batrachj.

Hyla viridis, Laur., volg. *Rena*, *rena di timoin*.

Rana esculenta, L., volg. *Rena da maggid*.

— *temporanea*, volg. *Baggio giano*.

Bufo vulgaris, Laur., volg. *Baggia*.

Salamandra maculata, Laur., volg. *Scuastro*, *Sevestro*, *Silvestro*.

Sciranota perspicillata, Bp., volg. *Siestra*.

Triton cristatus, Laur.

UCCELLI

I due susseguenti cataloghi, dovuti alla gentilezza e al sapere del signor marchese Carlo Durazzo, basteranno a far conoscere quante e quali sieno le ricchezze ornitologiche della Liguria. Il primo, a nostro giudizio, l'unico necessario, è stato regolato secondo il giusto concetto della presente Guida. La prima colonna contiene i nomi locali e vernacoli delle diverse specie, disposti secondo l'ordine alfabetico; la seconda, la loro sinonimia scientifica; la terza, le loro particolarità statistiche. Le generalità della classe si possono ridurre, riguardo alle abitudini, alla nota seguente che abbiamo dovuto estrarre dal manoscritto comunicatoci dal marchese Durazzo.

• Due, com'è consueto, sono le passate (degli uccelli nelle nostre contrade); l'una a primavera, ed allora gli uccelli giungono dal mare, alcuni per ristarsi e por nido, altri per seguitare a paesi più mediterranei; la seconda in autunno, nella quale alcuni per la via stessa si rendono alle loro patrie, e la maggior parte si tengono, lung'hesso la riviera di Ponente, per la Francia e la Spagna. Nei rigidi inverni gli acquatici lasciano il Nord e vengono in cerca di molle clima, ma il difetto di paduli non ci fa avere il più di essi che in passando, poichè seguono il loro viaggio verso Provenza o verso Toscana o Romagna. Quando poi le nevi cadono in copia

a coprire i nostri monti, allora gli uccelli che amano le alture e le rocce calano affollatissimi alle falde apennine; ed è in siffatta occasione che ne facciamo abbondante caccia. Dessa si fa alle uccellerie con reti aperte, rasenti terra, nei luoghi più a ridosso dai venti settentrionali. Ne' dintorni di Savona alcune uccellerie, nelle più fredde giornate, colgono tra i mille e i duemila individui. Di quelle de' sobborghi di Genova, le meglio stimate, e che prendono dai cinque ai mille, sono poste tra la badia del duca Pasqua a Sestri Ponente, fino oltre il Comune di Pegli. In autunno, al di là del capo di Noli, è grandissimo l'uso della pania. Assai abbondante abbiamo noi il passaggio in primavera delle specie comuni; e però, innanzi fosse vietato dalle leggi testè promulgate, si tendevano molte reti, principalmente per far preda di nittolani, i quali, ingrassati, diventano bocconi squisiti e ricercati. In autunno invece la caccia riesce scarsetta per la preda incredibile che si fa nelle provincie lombardo-venete, e soprattutto nella bergamasca e nella bresciana, luoghi di primo arrivo, ove non è possidente che non abbia più roccoli e paretai. »

Il secondo catalogo vuolsi dire *scientifico*, perchè l'ordine e la nomenclatura, affatto stranieri alle cognizioni e alle pratiche del volgo, sono sistematiche creazioni dei maestri della scienza. La sinonimia, apposta nella seconda colonna del primo catalogo, mi avrebbe fatto considerare l'altro come una duplicazione, e l'avrei creduto inutile, se il marchese Durazzo non vi avesse inserito varie specie che non potevano avere posto nel primo, per essere da noi rarissime o fortuite e quindi senza nome vernacolo, e se egli non avesse colta l'occasione di aggiungervi varie osservazioni nuove e profittevoli all'avanzamento dell'ornitologia. A preferenza del metodo proposto dal principe di Canino e adottato dal marchese Durazzo nelle sue notizie *Degli uccelli liguri*, Genova 1840, vien seguito quello del signor H. Schlegel, siccome *più adatto a comune servizio degli amatori*. Abbandonando un metodo che sembra però *più consentaneo alla filosofia della scienza*, egli teme soltanto d'incorrer taccia di troppo inconstante. Siamo persuasi che il mondo scienziato non dubiterà di assolverlo pienamente da questo rimprovero preso in astratto, essendo ad ognuno notorio e sapendo noi per propria esperienza, che la vita del naturalista, qualora sia diretta dal costante e dall'unico amor del vero, è una catena di successivi pentimenti. — M. S.

CATALOGO PRATICO.

NOME VULGARE	NOME SCIENTIFICO	OSSERVAZIONI
Agùgia	<i>Circus gallicus</i> . . .	Numerosa nel passag. ed annida.
Agùgia	<i>Buteo lagopus</i>	Casuale.
— neigra	— <i>vulgaris</i>	Abbondantissima nel passaggio entrambe stagioni ed annida.
Allochetto	<i>Otus scops</i>	Comune ed annida.
Annia neigra	<i>Anas nigra</i>	Casuale nel 1844.
— scia	— <i>fusca</i>	Non rari i giovani in prima- vera, rarissimi gli adulti.
Aquila de mà	<i>Haliaeetus albicilla</i> . . .	Di raro passaggio in primavera ed autunno.
— neigra	<i>Aquila naevia</i>	Passa in primavera ed autunno.
— peceus	<i>Pandion haliaetos</i> . . .	Soggiorna l' inverno lungo i nostri torrenti.
— reh	<i>Aquila fulva</i>	Abita le alte nostre rocce.
Avoltoio	<i>Vultur fulvus</i>	Casuale.
— barbù	<i>Gypaetos barbatus</i> . . .	Soggiorna nelle nostre Alpi.
— oeigro	<i>Vultur cinereus</i>	Casuale ne' dintorni di Genova, più spesso è visto a Savona.
Balainka da eua lunga	<i>Motacilla boarula</i> . . .	Abbondante e di permanenza.
— da testa neigra	— <i>melanocephala et</i> <i>cinereo-capilla</i>	Specie identica, di passaggin in primavera.
Barbagiuni, o Ouco	<i>Strix aluco</i>	Abbona il passaggio e molte copie vi soggiornano.
Barbaotto, o Sbiru	<i>Cypselus apus</i>	Abbondantissimo ed annida. Quest' anno i 27 gennaio ar- rivò in gran copia, senza meno per cagione dei rigidi freddi nell' Africa.

NE. Riguardo all'ortografia genovese si è seguita quella proposta dall' ab. Olivieri nel suo dizionario genovese italiano, salvo alcuna modificazione.

NOME VOLGARE	NOME SCIENTIFICO	OSSERVAZIONI
Bardo, o Grixian. . .	<i>Accentor alpinus</i> . . .	Comune in inverno.
Bazzanà du collo bianco.	<i>Muscicapa albicollis</i> . .	Searso in primavera, né mai visto in autunno.
— du peto russo . . .	— <i>parva</i>	Un individuo fu preso nella primavera del 1835, ed un altro nell'autunno del 1845.
— grisa	— <i>grisola</i>	Annida ed è piuttosto abbondante.
— scuro.	— <i>atricapilla</i> . . .	Alquanto scarso, ma penso che annidi, poichè in autunno abbiamo individui giovani.
Beccafico	<i>Sylvia hortensis</i> . . .	Di abbondante passaggio ed annida.
— du peto giauco.	— <i>cincera</i>	Annida e viagg. le due stagioni.
Beccassa	<i>Scolopax rusticula</i> . . .	Trovata in autunno a tutto marzo, qualche volta annida.
— de mè.	<i>Limosa melanura</i> . . .	Passa solo in primavera.
— de mè.	— <i>rufa</i>	Si vede soltanto in autunno.
Becca-sin comune . . .	<i>Scolopax gallinago</i> . . .	Soggiorna l'inverno e viaggia in primavera.
— da cna larga . . .	— <i>Brahmii</i>	Soggiorna l'inverno e viaggia in primavera.
— mazzengo	— <i>maior</i>	Viaggia in primavera ed autunno.
— surdo	— <i>gallinula</i>	Dimora l'inverno e parte a primavera.
Beco ciatto	<i>Anas clypeata</i>	Di passaggio in primavera, e qualche volta in autunno i giovani.
— fin sardo	<i>Sylvia sarda</i>	Annida in iscarso novero, non è sedentario.
— torto	<i>Loxia pytiopsittacus</i> . .	Avuto dal Calvi, da me mai visto.
— torto	— <i>curvirostra</i> . . .	Passa in estate, non annualmente.

NOME VULGARE	NOME SCIENTIFICO	OSSERVAZIONI
Berbecin	<i>Parus coerulescens</i>	Sedentario.
— cna lunga	— <i>caudatus</i>	Annida a' monti, in inverno scende agli oliveti.
— süffetto	— <i>cristatus</i>	Raro ne' dintorni di Genova, più comune in riviera di Ponente.
Berta	<i>Pica varia</i>	Annida nelle interne valli dei monti.
Biancola	<i>Motacilla alba</i>	Abbondantissima e sedentaria.
— de spalle negre.	— <i>lugubris</i>	Qualche individuo si preda ogni primavera, però giunge più tardi dell'altre, mai vista in autunno.
Bibin sarvago	<i>Otis tarda</i>	Casuale ne' rigidi inverni.
Boën	<i>Ficedula trochilus</i>	Annida a' monti, e migra in settembre.
Boën	— <i>icterina</i>	Di passaggio piuttosto raro nelle due stagioni.
— gianco	— <i>Bouellii</i>	Numeroso ed annida.
Boinetto	— <i>rufa</i>	Permanente.
Buschin da monti . .	<i>Acceator modularis</i> . . .	Sedentario.
Buschin	<i>Saxicola rubicola</i> . . .	Come il precedente.
Canoruo foestè	<i>Lanius meridionalis</i> . .	Assai raro.
— lombardo	— <i>eximitor</i>	Di scarso passaggio entrambe stagioni.
— mezzan	— <i>minor</i>	In gran copia ed annida.
— zostrà	— <i>collurio</i>	Come il precedente.
— testa rossa	— <i>rufus</i>	Come il precedente.
Calandra	<i>Alauda calandra</i>	Raro, ma annida.
Carcabaggi, o tetta crasse	<i>Caprimulgus europaeus</i> .	Annida e parte in settembre.
Cardaina	<i>Fringilla carduelis</i> . . .	Comune e sedentaria.
Ciarla	<i>Authas campestris</i> . . .	Annida ed abbonda nelle due stagioni del passaggio.

NOME VOLOARE	NOME SCIENTIFICO	OSSERVAZIONI
Chiara grossa	<i>Anthus Richardii</i> . . .	Vedesi sul finire d'autunno piuttosto scarsa, ma credo che annidi.
Chiarletta lombarda . .	<i>Silvia curruca</i>	Annida e parte in autunno.
— nostrà	<i>Ficedula ambigua</i> . . .	Di passaggio ed annida.
— nostrà	— <i>hypoleuca</i>	È di passaggio nelle due stagioni ed annida.
Ciattarùn	<i>Emberiza miliaria</i> . . .	Sedentario.
Cigno sarvegò	<i>Cygnus muscus</i>	Accidentale in primavera ed autunno.
Cinello rosso	<i>Anas rubra</i>	Piuttosto raro in primavera.
Ciurlo de mà, o Tantalò.	<i>Ibis falcinellus</i>	Passa in primavera, in autunno non si veggono che giovani.
Ciurloito	<i>Numenius tenuirostris</i> .	Raro in inverno e primavera.
Colasso	<i>Columba palumbus</i> . . .	Annida ai monti ed è abundantissimo il passaggio autunnale.
Colimbo	<i>Colymbus septentrionalis</i> .	Di passaggio in inverno, comuni i giovani, rarissimi gli adulti.
— grosso	— <i>glacialis</i>	Casuale un giovane nel 1843.
— mezzan	— <i>arcticus</i>	Comuni i giovani, rari gli adulti.
Collo verde	<i>Anas boschas</i>	Comune ed abbondante in inverno.
Combo sarvegò	<i>Columba oenas</i>	Annida a' monti ed è numerosissimo nel passaggio autunnale.
— da rocche	— <i>livia</i>	Più raro dell'antecedente.
Cornaggia sceneha . . .	<i>Corvus cornix</i>	Soggiorna a' monti ed è casuale al litorale.
Cornagetta	— <i>monedula</i>	Alquanto rara.
Crovo	— <i>frugilegus</i>	Comune in autunno e nei freddi inverni.
— de mà negro	<i>Puffinus arcticus</i> . . .	Comune in inverno ed estate.

NOME VOLGARE	NOME SCIENTIFICO	OSSERVAZIONI
Crovo de mà negro .	<i>Puffinus obscurus</i> . . .	Due individui ne avemmo, uno nell'agosto, l'altro in settembre 1843.
— de mà senetu .	— <i>cinereus</i>	Comunissimo in estate ed autunno.
— du becco gaon.	<i>Fregilus graulus</i> . . .	Sedentario a' monti.
— du becco russo.	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i> .	Come il precedente.
— impej	<i>Corvus corax</i>	Sedentario.
Cas lunga	<i>Anas acuta</i>	Comoe io primavera.
— rossa a peto bleu	<i>Lusciola cyaneola</i> . . .	Di passaggio in primavera, rara in autunno.
— rossa moa. . .	— <i>Thitys</i>	Permanente.
— rossa montagnaha.	— <i>phoenicurus</i> . . .	Di passaggio in primavera.
Cusurron o Merlo muntan.	<i>Turdus saxatilis</i> . . .	Annida e migra in autunno.
Cücco	<i>Cuculus caucurus</i> . . .	Annida, è comune e migra.
— du süffo. . .	— <i>gladistrius</i> . . .	Passa quasi sempre a primavera.
Cü giasco d'aia . . .	<i>Hirundo orbica</i>	Annida numeroso.
— de terra. . . .	<i>Saxicola oenanthe</i> . . .	Annida in copia e parte in autunno.
Dügo o Cravà	<i>Otus bobo</i>	Sedentario.
Fanetto	<i>Fringilla canabina</i> . .	Permanente e comoe.
— corso	— <i>iliaria</i>	Piuttosto raro.
— de muntagna .	— <i>flavirostris</i> . . .	Comale.
Fareo de padù	<i>Circus rufos</i>	Alcuni anni sbbondante, altri scarso.
— mangis vespe .	<i>Pernia spivorus</i>	Da qualche anno sbbonde ambe stagioni.
— pellegrin	<i>Falco communis</i> . . .	Soggiorna tra dirupi di Portofino e viaggia in primavera.

NOME VOLOARE	NOME SCIENTIFICO	OSSERVAZIONI
Fareo senein	<i>Circus cintraceus</i> . . .	Passa in primavera ed autunno.
— senein	— <i>cyaneus</i>	Come il precedente.
Farchetto di pè rusci .	<i>Falco rufipes</i>	Quando più, quando meno in primavera.
— di piccin	— <i>acsalon</i>	In primavera ed autunno, piuttosto raro.
— gianco	<i>Circus pallidus</i>	Alcuni anni abbonda, altri è scarso.
— scùo	<i>Falco subbuteo</i>	Abbonda in primavera più che in autunno.
Franggiù	<i>Salicaria aquatica</i> . . .	Comunissimo.
— grixa	— <i>locustella</i>	È meno abbondante del precedente.
Forapagge	— <i>phragmitis</i>	Abbonda entrambe stagioni.
Frangulin	<i>Tetrao lagopus</i>	Sedentario.
Franguello	<i>Fringilla coelebs</i>	Come il precedente.
— da neve	— <i>nivalis</i>	Casuale al litorale, sedentario nell'Alpi.
— montagna	— <i>monti fringilla</i>	Numeroso in inverno, annida a' monti.
Franguelletto de mà . .	<i>Thalassidroma pelagica</i> .	Comune in primavera a tutta estate.
Fruxiù	<i>Coereba vulgaris</i>	Annida e viaggia ora in maggiore, ora in minor numero.
Fulga	<i>Fulica atra</i>	Comune in primavera ed autunno.
— da cresta	— <i>eristata</i>	Casuale.
Gobbias	<i>Lestris parasita</i>	Casuale.
— negro	— <i>pomarina</i>	Qualche individuo tutti gli anni in primavera ed estate.
Gallinla sultanha	<i>Porphyrio hyacinthinus</i> .	Casuale.
Gallinetta grisa	<i>Gallinula porzana</i>	Comune in primavera ed autunno.

NOME VOLGARE	NOME SCIENTIFICO	OSSERVAZIONI
Gallinetta grossa . . .	<i>Ballus aquaticus</i> . . .	Abbonda in primavera e qualche individuo si ha tutte le stagioni.
— grossa da lacca.	<i>Gallinula chloropus</i> . .	Comune entrambe stagioni.
— mezanha	— <i>pusilla</i>	Di passaggio in primavera.
— pierinha	— <i>Baillonii</i>	Come il precedente.
Galletto de marzo . . .	<i>Upupa epops</i>	Numeroso nel passaggio e qualche copia annida.
Gallo de montagna . .	<i>Tetrao tetrix</i>	Sedentario.
— grosso de montagna.	— <i>urogallus</i>	Casuale nel 1852.
Garganella	<i>Anas querquedula</i> . . .	Comune in aprile e maggio.
Garbè	<i>Oriolus galbula</i>	Di passaggio abbondante in primavera, più scarso in autunno.
Gazzanla	<i>Garrulus glandarius</i> . .	Annida ed abbonda tutte le stagioni.
Ginnetta	<i>Motacilla flava</i>	Comune ed annida.
Ginnetta cù de setrùn .	— <i>Rayi</i>	Assai rara in primavera, specie ben distinta dall'antecedente, principalmente dalla misura dei tarsi.
Gizeò da testa rossa.	<i>Charadrius cantinnus</i> .	Alquanto rara in primavera ed autunno.
— de l'èugio d'on.	— <i>minor</i>	Annida presso i torrenti ed è sedentario.
— du teston	— <i>hiaticula</i>	Come il precedente.
Giùgo-giùgn.	<i>Sylvia orpheus</i>	Annida e migra in settembre.
Goa	<i>Corvus corone</i>	Viaggia in inverno numeroso e qualche copia è sedentaria.
Grivea	<i>Alauda arvensis</i>	Soggiorna a' monti e passa numerosa in inverno.
— de Corsega . . .	— <i>cantarella</i>	Abbonda ne' freddi inverni.
Grün	<i>Grus cinerea</i>	Comunissima.

NOME VOLGARE	NOME SCIENTIFICO	OSSERVAZIONI
Lodea du sùffo	Alauda cristata	Piuttosto rara da noi, ma sedentaria e numerosa nelle pianure d'Albenga.
Lùgan	Fringilla spinus	Abbondantissimo nel passaggio d'autunno e d'inverno.
Lùgan còrso	— citrinella	Piuttosto raro in autunno.
Magnaninhe	Sylvia provincialis . . .	Permanente ed annida.
Magran	Alca torda	Comune ne' rigidi inverni, quest'anno abbondantissimo.
— du collo rosso	Podiceps rubricollis . .	Accidentale.
— du sùffo	— cristatus	Raro in inverno.
— gianco	Carbo graculus mediterraneus.	Accidentale.
— grosso neigro	— cormoranus	Come il precedente.
— piecin	Podiceps minor	Tutte le stagioni.
— sheiavùn	— cornutus	Raro in inverno.
— iàreo	— arcticus	Alcun numero maggiore del precedente.
Marmòn frattin	Mormon arcticus	Da quando a quando se ne vede alle spiagge qualche individuo.
— frattin	— glacialis	Come l'antecedente.
Martin pescòu	Alcedo ispida	Annida e soggiorna in picciol numero.
Marseu	Vanellus cristatus . . .	Comune tutte le stagioni.
— spilorso	— squatarola	Di passaggio in primavera.
Merio	Turdus merula	Sedentario.
— ciappi	— cyanus	Come l'antecedente.
— da cna bianca	Saxicola caesia	Sedentario.
— franco	— torquata	Quando abbondante e quando scarsissimo.
— pescòu	Cinclus aquaticus	Permanente.
— rossa	Pastor roseus	In primavera adulto, in autunno qualche giovane.

NOME VOLOABE	NOME SCIENTIFICO	OSSERVAZIONI
Moetta du sùffo. . . .	Anas fuligula	In inverno e primavera.
— grisa	— marila	Accidentale.
Moettàn.	— ferla	In primavera.
Muneghetta	Parus palustris	Passa in autunno e tutto l'inverno.
Muneghinha	Recurvirostra avocetta.	Casuale in primavera.
Muneghinha	Sterna minuta	Rara in primavera ed autunno.
Mua	Silvia subalpina	Annida ed è sedentaria.
Musa grande	Numenius arquata . . .	Piuttosto rara in inverno e primavera.
Niggio reà	Milvus regia	Annida e viaggia piuttosto numeroso.
— scùo.	— niger	Annida, ma è più raro del precedente.
Nattua	Emberiza hortulana . .	Abbondantissimo entrambe stagioni.
— de levante. . . .	— melanocephala . .	Non di costante passaggio in primavera.
— di mustasci . . .	— caesia	Accidentale.
Orn ciappa	Larus argentatus . . .	Comune tutte le stagioni ed annida.
— de mla	— marinus	Più comuni i giovani.
— de spalle neigre.	— fusca	Comune tutte le stagioni ed annida.
— mezzanha	— canus	Come il precedente.
— sarvaga	Anser albifrons	Casuale.
— sarvaga	— segetum	Passa in primavera ed autunno.
Ochin capüssin	Larus capistratus . . .	Di passaggio in primavera.
— en de reusa . . .	— gelastes	Casuale.
— frattin	— ridibundus	Abbondantissimo.
— gianco.	— tridactylus	Abbona in febbraio e marzo ed annida.

NOME VOLGARE	NOME SCIENTIFICO	OSSERVAZIONI
Ochin testa negra . .	Larus melanocephalus .	Abbonda in primavera e qualche individuo in tutte le stagioni.
Ochinetto	— minutus	Qualche individuo ogni anno; fu abbondante nel 1844.
Ostregante	Haematopus ostralegus.	Tutti gli anni qualche individuo.
Otardiola	Otis tetra	Casuale ne' rigidi inverni.
Ouco bianco	Strix flammea	Annida e vi fa stabile dimora.
— testa grossa . . .	Otus brachyotus	Annida, passa in maggio ad ottobre.
Parisseua	Parus maior	Sedentaria e comunissima.
— mustascetti . . .	— biamircus	Accidentale; annidò nel 1845 lungo la Polcevera.
Parissuina	— ater	Di solo passaggio in primavera ed autunno.
Passua de passaggio . .	Passer domesticus . . .	Si vede in autunno.
— montaninla . . .	— montanus	Annida e ne abbonda il passaggio in autunno.
— nostrà	— hispanus	Sedentaria.
— sarda	— salicarius	Annida in picciol numero ed è sedentaria.
Passuùn	— petronia	Annida, sedentario ed è abbondante il passaggio.
Peccetto	Lusciola rubecula . . .	Permanente.
Pellicau	Pelecanus onocrotalus .	Casuale.
Pendulìn	Parus pendulinus . . .	Come il precedente.
Perdigioni sirùn . . .	Ardea garzetta	Alquanto raro.
— foestè	— bobolus	Casuale.
— gianco	— alba	Come l' antecedente.
— griso	— stellaris	Numeroso in primavera, più raro nell' altre stagioni.
— ueigro	— nycticorax	Abbonda in primavera, casuale in autunno.
— paggiain	— comata	Arriva a tarda primavera.

NOME VOLGARE	NOME SCIENTIFICO	OSSERVAZIONI
Perdigioni piccin . .	<i>Ardea minuta</i>	Comune in primavera, raro in autunno.
— russo	— <i>purpurea</i>	Comune in primavera ed autunno.
— senein	— <i>cinerea</i>	Raro in primavera ed autunno.
Pernix cumbra . . .	<i>Perdix graeca</i>	Comunissima e sedentaria.
— de Sardegna . .	— <i>petrosa</i>	Annida da alcuni anni, qua portata dalla Sardegna.
— russa	— <i>rubra</i>	Comunissima e sedentaria.
Pernixotto de mè . .	<i>Glareola pratincola</i> . .	Comune in maggio.
Perruchetto	<i>Anas creera</i>	Arriva in inverno abbondante.
Petronella	<i>Alauda arborea</i>	Annida e soggiorna abbondante.
Picunno	<i>Picus medius</i>	Casale nell'agosto del 1843.
— negro	— <i>martini</i>	Accidentale.
— o Picco	— <i>major</i>	Sedentario.
— senein	— <i>canus</i>	Raro.
— verde	— <i>viridis</i>	Sedentario.
Picunno	— <i>minor</i>	Come il precedente.
Pignnetto	<i>Tringa minuta</i>	Comune in maggio, raro in autunno.
Pitta-agni o picnzin de mûgia.	<i>Tichodroma muraria</i> . .	Annida a' monti, ove soggiorna.
Pitta furnigue	<i>Iuxa torquilla</i>	Annida in gran copia ed alcuni ciavernano.
Pitta muscin	<i>Salicaria cisticola</i> . . .	Sedentario.
Pittinazomuntagniu o ciù elù	<i>Sitta europaea</i>	Sedentario.
Quaglia	<i>Coturnix vulgaris</i> . . .	Annida in iscarso numero, ma n'è comune il passaggio.
Quattr' cuggi	<i>Anser clangula</i>	In primavera, comuni i giovani.
Rampeggia	<i>Certhia familiaris</i> . . .	Permanente.
Retin	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Sedentario e comunissimo.

NOME VOLGARE	NOME SCIENTIFICO	OSSERVAZIONI
Requingio	<i>Crex pratensis</i>	Comune ambe le stagioni.
Roudaniola	<i>Hirundo rustica</i>	Annida numerosissima e parte in autunno.
— de mà	<i>Sterna cantiaca</i>	Di passo non comune in primavera ed autunno.
— de mà	— <i>hirundo</i>	Comune.
— de mà	— <i>leucopareja</i>	Varli individui furono presi nel 1840 e 43.
— de mà	— <i>macrura</i>	Casuale.
— cua bianca	— <i>paradisea</i>	Casuale in primavera.
— de mà grossa	— <i>caspia</i>	Casuale.
— sampe neigre	— <i>anglica</i>	Di passaggio in prim. ed autun.
— seneinha	— <i>leucoptera</i>	Comunissima.
— du cù russo	<i>Hirundo rufula</i>	Giugne sul tardo autunno ed in iscarso numero.
Rundin	<i>Cypselus melba</i>	Giugne scarso nell'inverno.
Rustigneu d' Africa . .	<i>Salicaria galactodes</i> . .	Accidentale.
— da caune	— <i>arundinaceu</i>	Comune in primavera, raro in autunno.
— da sarxi	— <i>Luscinoides</i>	Di passaggio maggiore in primavera e minore in autunno.
— de padù	— <i>cettii</i>	Passa a primavera ed autunno.
— de padù	— <i>palustris</i>	In primavera raro.
— lumbardo	— <i>turdina</i>	Abbonda in aprile, è più raro in autunno.
Ruscigneu	<i>Lusciola luscinia</i>	Comunissimo ed annida.
Ruscaciè dai Nizzardi .	<i>Cathartes peregrinator.</i>	Abita i monti della contea di Nizza.
Scappaxio da gua giavea.	<i>Saxicola aurita</i>	Annida in iscarso numero e parte in autunno.
— da gua negra	— <i>stapazina</i>	Como l'antecedente.
Sciaccia nissene	<i>Caryocatactes caryocatactes.</i>	Fu abbondantissimo nel settembre 1843 ed annunzia sempre un rigido inverno.

NOME VOLGARE	NOME SCIENTIFICO	OSSERVAZIONI
Seiguùn	<i>Pyrrhula vulgaris</i> . . .	Annida a' monti e scende in inverno alle spiagge.
Scuriattùn o Testùn . .	<i>Oedinemus crepitans</i> . .	Comune primavera ed autunno, qualche individuo vi soggiorna.
Seneento	<i>Hirundo riparia</i> . . .	Annida e qualcuno sverna sulle oostre spiagge.
Seneentùn	— <i>ropestris</i> . . .	Giunge il primo per annidare a' monti.
Serapico	<i>Nunemus phaeopus</i> . .	Comune nelle due stagioni.
Serenka	<i>Merops apiaster</i> . . .	Passa nelle due stagioni, annida in Monferrato.
— foëstea	— <i>persica</i> . . .	Casuale nel 1834.
Serenùn	<i>Coracias garrula</i> . . .	Passa a primavera, di rado in autunno e qualche volta annida.
Serretta	<i>Mergua serrator</i> . . .	Comuni i giovani in inverno e primavera.
Sia boschiùha o strappua .	<i>Emberiza schoeniculoides</i> .	S' incontra ne' rigidi inverni.
— da ranne	— <i>schoeniculus</i> . .	Di passaggio numeroso in autunno, che protrae tutto inverno a seconda del maggior freddo.
— da neve	<i>Plectrophanes nivalis</i> .	Accidentale in inverno e sempre giovani.
— muntagnùha	<i>Emberiza cirius</i> . . .	Annida, numerosa nel passaggio, molte sedentarie.
— nostrà	— <i>cia</i>	Annida, numerosa nel passo e molte sedentarie.
— pagura	— <i>citrinella</i> . . .	Come l' antecedente.
Siaeo	<i>Pyrrhula serinus</i> . . .	Annida e passa numeroso.
Siaùn	<i>Emberiza palustris</i> . .	Assai rari in primavera, in autunno qualche giovane.
Sietùn	<i>Falco cenchris</i> . . .	In primavera ed autunno raro.

NOME VOLGARE	NOME SCIENTIFICO	OSSERVAZIONI
Sittua	Falco tinnunculus . . .	Permanente.
— grigia	Astur nisus	Annida a' monti e migra in autunno.
Son	Emberiza pusilla, Durazzi, Bonap.	Se ne prende qualche individuo ogni anno lungo le due riviere.
Sigheugna ginna . . .	Ciconia alba	Passa in entrambe stagioni.
— oigra	— nigra	Rarissima in livrea adulta, sempre giovani nelle consuete stagioni.
— o gambe lunghe	Himantopus melanocephalus	Si vede alcuni anni in primavera, è raro nell'autunno.
Simma-costi	Saxicola rubetra . . .	Di passaggio in primavera.
Si-si	Anthus aquaticus . . .	Sedentario e comune in tutte le stagioni.
— da gua rossa . . .	— rufularis	Annidò, ma è assai rara.
— da proù	— pratensis	Abbonda nella passata autunnale, ed è sedentario.
Sivetta	Sylvia noctua	Sedentario, ma piuttosto raro.
— testa grossa . . .	— Tengmalmi	Più rara della precedente, né so se v'abbia oido.
Smerga	Mergus merganser . . .	Di passo ne' freddi inverni, più comuni i giovani.
— bianco	— albellus	Qualche anno abbonda ne' rigidi inverni, in altri è scarso o nullo.
Spatola	Platola leucorodia . . .	Casuale.
Sparvè	Astur palumbarius . . .	Come la precedente.
Spia de nottuan . . .	Anthus arboreus	Soggiorna ed è abbondante nel passaggio.
Spilorsin	Tringa Temminckii . . .	Comune in maggio, raro in autunno.
Spilorso	Phalaropus cinereus . .	Casuale nell'agosto del 1843.
Spilorso	— rufescens	Più individui furono presi del 1843 in poi.

NOME VOLGARE	NOME SCIENTIFICO	OSSERVAZIONI
Spilorso da gamba lunga	<i>Totanus glottis</i>	Di passaggio entrambe stagioni.
— da sceuggio. .	<i>Tringa hypoleucos</i> . .	Abbondante in primavera, più raro in autunno.
— di mütti. . . .	— <i>pugnax</i>	Come l'antecedente.
— da cò-cò . . .	<i>Totanus calidris</i>	Si vede in maggio, più raro in autunno.
— da cù gianco .	— <i>ochropus</i>	Di passaggio in primavera.
— da tri-tri . . .	<i>Tringa cinclus</i>	Passa in primavera ed autunno.
— fuvè grixo. . .	<i>Totanus stagnatilis</i> . .	Passa in primavera.
— femmina du cù gianco	— <i>glareola</i>	Vedesi in maggio, più raro in autunno, e qualcuno v'annida.
— grixiàn	<i>Tringa subarquata</i> . .	Numerosissimo in maggio e giugno.
— mon.	<i>Totanus fuscus</i>	Di passaggio in primavera ed autunno.
— piccin	<i>Tringa platyrhynchos</i> .	Casuale.
— rasso	— <i>canutus</i>	Piuttosto raro in primavera e più raro in autunno.
— scüo.	— <i>maritima</i>	Di passaggio in primavera.
— sencin.	— <i>arenaria</i>	Se passa qualche numero in primavera ed autunno.
Sterna	<i>Perdix cinerea</i>	Permanente, e numerosissima nel passaggio.
Sturnello	<i>Sturnus vulgaris</i>	Numerosissimo entrambe stagioni ed annida.
Tersolun	<i>Alauda brachydactyla</i> .	Passa in primavera, ma non si vede in autunno.
Testa de gatto	<i>Otus otus</i>	Annida ed è abbondante il passaggio in autunno più che in primavera.
— d'ou	<i>Regulus cristatus</i> . . .	Comune in inverno al litorale, sedentario n' monti.
— d'ou säffetm. .	— <i>ignicapillus</i>	Come il precedente.

NOME VULGARE	NOME SCIENTIFICO	OSSERVAZIONI
Testa negra montagnola . . .	<i>Sylvia melanocephala</i> .	Permanente e comunissima.
— negra	— <i>atricapilla</i> . . .	Permanente.
— russa	<i>Anas pénelope</i>	Di passo in autunno fino a tutta primavera.
Testuotto biundo . .	<i>Cursorius europaeus</i> .	Casuale.
— de l'ünme . .	<i>Charadrius pluvialis</i> .	Più abbondante in primavera che in autunno.
— de l'euggio grosso	— <i>morieuillus</i> . .	Assai più raro dell'antecedente.
Turdeua o Turdeua nostra	<i>Turdus viscivorus</i> . .	Abbondante di passaggio, annida ed è sedentario.
Turdeua corsesca . .	— <i>pilaris</i>	Di passaggio durante tutto l'inverno.
Turdu corsesco	— <i>iliacus</i>	Come la precedente.
— di piccin	— <i>solitarius</i> ant minor	Casuale nell'autunno del 1843.
— nostra	— <i>musculus</i>	Annida ed è numeroso nel passaggio che protrae da autunno a tutto marzo.
Turtua	<i>Columba turtur</i> . . .	Numerosissima ed annida.
Tui-tui	<i>Ficedula sibilatrix</i> . .	Di passaggio in primavera ed autunno, annida.
Verdün	<i>Fringilla chloris</i> . . .	Comune ed annida.
— bastardu o verdunetto .	— <i>incerta</i>	Assai raro in primavera ed autunno.
Volta sasci	<i>Streptopelia interpres</i> .	Piuttosto raro.

CATALOGO SCIENTIFICO

UCCELLI DI RAPINA.

FALCHI NOBILI.

1. *Falco communis Gmel.*
2. — *subbuteo Linn.*
3. — *Eleonorae Gené. (1)*
4. — *acesalon Gmel.*
5. — *tinnuncius Linn.*
6. — *cenchris Naumann.*
7. — *rufipes Bezecke.*

ASTORI.

8. *Asiur palumbarius Cuvier.*
9. — *nissus Cuvier.*

FALCHI DI PADULE.

10. *Circus rufus Brisson.*
11. — *cyaneus Bechstein.*
12. — *cinereus Montagu.*
13. — *pallidus Sykes.*

AQUILE propriamente dette

14. *Aquila fulva Meger (2)*
15. — *uervia Schw. (3)*
16. — *pernis Bechm. (1)*

AQUILE PESCATRICI.

17. *Haliaeetus albicilla Brisson.*
18. *Pandion haliaetus Linn.*

POIANE.

19. *Buteo vulgaris Willughbiv.*
20. — *lagopus Cuv.*

FALCO PECCHIAFUGLO.

21. *Peris spivorus Cuv.*

CISCAETO.

22. *Circetus gallicus Cuv.*

MILVI.

23. *Milvus regalis Brisson.*
24. — *niger Briss.*

UCCELLI DI PREDA. AVOLTOI.

25. *Chathartes peregrinator Lemm.*

AVOLTOI propriamente detti

26. *Vultur fulvus Briss.*
27. — *cinereus Gmel.*

GIPAEI.

28. *Gypaetos barbatus Cuvier.*

UCCELLI DI PREDA NOTTURNI.

29. *Otus bubo Süssld.*

30. *Otus otus* Cuv.
 31. — *brachyotus* Cuv.
 32. — *Scops* Ray.

BARRAGIANNI O CIVETTE.

33. *Strix flammea* Linn.
 34. — *noctua* Retzius.
 35. — *aluco* Linn.
 36. — *Tengmalmi* Gmel.

BONINELLE.

37. *Hirundo rustica* Linn.
 38. — *rufula* Temm.
 39. — *orbica* Linn.
 40. — *riparia* Linn.
 41. — *rupestris* Scopoli.

BONDONI.

42. *Gypselus apus* Illiger.
 43. — *melba* Illiger.

MIGNACAPPE.

44. *Caprimulgus europaeus* Linn.

VELLE.

45. *Lanius excubitor* Linn.
 46. — *meridionalis* Temm.
 47. — *minor* Gmel.
 48. — *rufus* Briss.
 49. — *collurio* Linn.

PAGLIA-MOSCHE.

50. *Muscicapa grisola* Linn.
 51. — *atricapilla* Linn.
 52. — *albicollis* Temm.
 53. — *parva* Brest.

SILVIE.

54. *Silvia uisoria* Bechst. (?)

55. *Silvia cioerea* Latham.
 56. — *cooapiellata* Marmora. (?)
 57. — *curruca* Latham.
 58. — *subalpina* Bonel.
 59. — *provincialis* Temm.
 60. — *sarda* Marmora.
 61. — *melanocephala* Luth.
 62. — *orphea* Temm.
 63. — *atricapilla* Luth.
 64. — *hortensis* Bechst.

BECCHIPINI.

65. *Ficedula trochilus* Keiserl.
 66. — *rufa* Keys.
 67. — *Bonellii* Keys.
 68. — *sibilatrix* Keys.
 69. — *ambigua* Schlegel. (?)
 70. — *hypoleis* Keys.
 71. — *icterina* Vieill. (?)

SALICIAUOLE.

72. *Salicaria-turdina* Meyer.
 73. — *arundinacea* Selby.
 74. — *palustris* Gould.
 75. — *phragmitis* Selby.
 76. — *aquatica* Gould.
 77. — *locustella* Selby.
 78. — *luscionides* Savi.
 79. — *galactodes* Temm.
 80. — *melanocephala* Temm. (?)
 81. — *Cetti* Marmora.
 82. — *cisticola* Temm.

COCC ROSSE.

83. *Lusciola luscinia* Keys.
 84. — *phoeniceus* Keys.
 85. — *thüya* Keys.
 86. — *rubecula* Keys.
 87. — *cyaneola* Meyer.

SASSAIUOLE.

88. *Saxicola oenanthe* Bechst.

89. *Saxicola staspazina Temm.* (10)

90. — *aorita Temm.*

91. — *carhionans Temm.*

92. — *rubetra Bechst.*

93. — *ruficola Bechst.*

PISPOLE.

94. *Anthus aquaticus Bechst.*

95. — *pratensis Bechst.*

96. — *rofigularis Bechst.*

97. — *Richardii Verlot.*

98. — *campestris Bechst.*

99. — *arbores Bechst.*

CODICINZOLE.

100. *Motacilla alba Linn.*

101. — *lugubris Temm.*

102. — *boarula Lath.*

103. — *flava Linn.*

104. — *Rayi Gould.*

105. — *melanocephala et cinerea capilla Licht.*

TIRAI O MEALI.

106. *Turdus viscivorus Linn.*

107. — *pilaris Linn.*

108. — *iliacus Linn.*

109. — *musicus Linn.*

110. — *solitarius Wils. minor Lath.* (11)

111. — *torquatus Linn.*

112. — *merula Lin.*

113. — *saxatilis Lin.*

114. — *cyaneus Lin.*

RIGOGOLO.

115. *Oriolus galbula Lin.*

MERLO ACQUATOLE.

116. *Cinclus aquaticus Bechst.*

ACCENTORI.

117. *Accentor alpinus Bechst.*

118. — *modularis Cuv.*

RE OI MACCHIA.

119. *Troglodytes troglodites Cuv.*

REGOLI.

120. *Regulus cristatus Willug.*

121. — *ignicapillus Naumann.*

CINCE.

122. *Parus maior Lin.*

123. — *palestris Lin.*

124. — *ater Lin.*

125. — *cristatus Lin.*

126. — *coeruleus Lin.*

127. — *candatus Lin.*

128. — *biarmicus Lin.*

129. — *pendulions Lin.*

CEAZIE.

130. *Certhia familiaris Lin.*

TICODROMI.

131. *Tichodroma muraria Miger.*

SITTE.

132. *Sitta europaea Lin.*

PICCHI.

133. *Picus martius Lin.*

134. — *viridis Lin.*

135. — *canus Gmelin.*

136. — *maior Lin.*

137. — *medius Lin.*

138. — *minor Lin.*

TORCHOLLE.

139. *Yunx torquilla* *Lin.*

CUCULI.

140. *Cuculus canorus* *Lin.*

141. — *glandarius* *Lin.*

UPUPE.

142. *Upupa epops* *Lin.*

ALCEDINI.

143. *Alcedo ispida* *Lin.*

MEROPI.

144. *Merops apiaster* *Lin.*

145. — *persica* *Pallas.*

CORVI.

146. *Corvus corax* *Lin.*

147. — *corone* *Gmel.*

148. — *cornix* *Lin.*

149. — *frugilegus* *Lin.*

150. — *monedula* *Lin.*

PICA.

151. *Pica varia* *Gessner.*

NUCIFRAGA.

152. *Caryocatactes caryocatactes* *Cuv.*

GAZZE.

153. *Garrulus glandarius* *Cuv.*

CORVUS CORALLINUS.

154. *Pyrrhonorax pyrrhonorax* *Cuv.*

CORACIA DI MONTAGNA.

155. *Fregilus graculus* *Cuv.*

GAZZA MARINA.

156. *Coracias garrula* *Lin.*

GASCELLO.

157. *Bombyella garrula* *Vieill.* (12)

STORNI.

158. *Sturnus vulgaris* *Lin.*

STORNO MARINO.

159. *Pastor roseus* *Jamm.*

ALLODOLE.

160. *Alauda arvensis* *Lin.*

161. — *cantarella* *Bonap.*

162. — *eristata* *Lin.*

163. — *arborea* *Lin.*

164. — *brachydactyla* *Leister.*

165. — *calandra* *Lin.*

FRINGUELLI.

166. *Fringilla coelebs* *Lin.*

167. — *montifringilla* *Lin.*

168. — *nivalis* *Brisson.*

169. — *chloris* *Illiger.*

170. — *lacerta* *Risso.*

171. — *citrinella* *Lin.*

172. — *cazembini* *Lin.*

173. — *flavirostris* *Lin.*

174. — *linaria* *Lin.*

175. — *carduella* *Lin.*

176. — *spinus* *Lin.*

PASSERI.

177. *Passer domesticus* *Gessner.*

178. *Passer cisalpinus Temm.*
 179. — *salicarius Keys.*
 180. — *moutanus Aldrov.*
 181. — *petronia Lin.*

FRASONI.

182. *Coccothraustes vulgaris Pallas.*

PIRELLI.

183. *Pyrrula vulgaris Temm.*
 184. — *serinus Keys.*

LOSTIE.

185. *Loxia pytiopsittacus Bechst.*
 186. — *curvirostra Lin.*

ZIGOLI.

187. *Emberiza citrinella Lin.*
 188. — *cirlus Lin.*
 189. — *hortulana Lin.*
 190. — *caesia Cretschk.*
 191. — *cin Lin.*
 192. — *pithyornus Pallas. (12)*
 193. — *schoeniculus Lin.*
 194. — *schoeniculoides Bechm ? (13)*
 195. — *palustris Sav.*
 196. — *pusilla Pall. (13)*
 197. — *milivaria Lin.*
 198. — *melanocephala Scop.*

ZIGOLO DELLA NEVE.

199. *Plectrophanes uivialis Meyer.*

GALLINACCI COLOMBE.

200. *Columba palumbus Lin.*
 201. — *Oenas Gmel.*
 202. — *livin Brisson.*
 203. — *turtur Lin.*

GALLINACCI propriamente detti

204. *Tetrax urogallus Lin.*
 205. — *tetris Lin.*
 206. — *lagopus Temm.*

PERNICE.

207. *Perdix rubra Brisson.*
 208. — *graeca Briss.*
 209. — *petrosa Lath.*
 210. — *cimera Briss.*

COTURNICE.

211. *Coturnix vulgaris Klein.*
 212. *Hemipodius lechydromus Temm.*
 213. *Pterocles setarius Steph. (14)*

OTARDE.

214. *Otis tarda Lin.*
 215. — *tetrax Lin.*

SCORRIDORE.

216. *Cursorius europaeus Lath.*

PERNICE DI MAR.

217. *Glareola pratineola Leach.*

STRELLATORE.

218. *Oedienemus crepitans Temm.*

PIVIZZI.

219. *Charadrius pluvialis Lin.*
 220. — *morinellus Lin.*
 221. — *contianus Latham.*
 222. — *hiaticula Lin.*
 223. — *minor Meyer.*

PAVONCELLE.

224. *Vanellus cristatus Meyer.*
 225. — *squatarola Gmel.*

VOLTA PIETRE.

226. *Streptopus interpres Illig.*

BECCACCIA DI MARE.

227. *Macdonatus ostralegus Lin.*

BECCACCIE.

228. *Scolopax rusticola Lin.*
 229. — *maior Gmel.*
 230. — *gallinago Lin.*
 231. — *Brehmi Kaup.*
 232. — *gallinula Lin.*

PITTINE.

233. *Limosa melanura Leisler.*
 234. — *rufa Briss.*

PIOVANELLI.

235. *Tringa canutus Lin.*
 236. — *maritima Brünnich.*
 237. — *subarquata Temm.*
 238. — *cinclus Lin.*
 239. — *minuta Leisler.*
 240. — *Temminckii Leisl.*
 241. — *platyrhynchos Temm.*
 242. — *arcuaria Lin.*
 243. — *pugnax Lin.*
 244. — *hypoleucos Lin.*

CAVALIERE.

245. *Totanus fuscus Leisler.*
 246. — *glottis Bechst.*
 247. — *stagnatilis Bechst.*
 248. — *calidris Bechst.*
 249. — *glareola Temm.*
 250. — *ochropus Temm.*

FALASCHI.

251. *Phalaropus cinereus Brisson.*
 252. — *rufoescens Briss.*

CHIERLI.

253. *Numenius arquata Latham.*
 254. — *phaeopus Lath.*
 255. — *tenuirostris Vieill.*

AVOCETTA.

256. *Recurvirostra avocetta Lin.*

CAVALIERE D'ITALIA.

257. *Himantopus melanopterus Mey.*

AIRONI.

258. *Ardea cinerea Lin.*
 259. — *purpurea Lin.*
 260. — *alba Lin.*
 261. — *garzetta Lin.*
 262. — *comata Pallas.*
 263. — *bubalus Cuv.*
 264. — *cycticorax Lin.*
 265. — *stellaris Lin.*
 266. — *minuta Lin.*

CICOONE.

267. *Ciconia alba Briss.*
 268. — *nigra Gessner.*

TANTALO.

269. *Ibis falcinellus Temm.*

GRUC.

270. *Grus cinerea Bechst.*

SCATOLA.

271. *Platalea leucorodia Lin.*

FENICOTTERO.

272. *Phoenicopterus antiquorum Tem.* ⁽¹⁷⁾

FOLAGRE.

273. *Fulica atra Lin.*274. — *cristata Gmel.*

POLLO SULTANO.

275. *Porphyrio antiquorum Bonp.*

GALLINELLE PALUSTRI.

276. *Gallinula chloropus Aldrov.*277. *Gallinula porzana Latham.*278. — *pusilla Bechst.*279. — *Bailloni Temm.*

RE DI QUAGLIE.

280. *Crex pratensis Bechst.*

RILLO.

281. *Rallus aquaticus Lin.*

UCCELLI ACQUATICI.

TIFFOLOSI.

282. *Podiceps cristatus Lath.*283. — *rubricollis Lath.*284. — *cornutus Lath.*285. — *auritus Lath.*286. — *minor Lath.*

COLIMBI.

287. *Columbus glacialis Lin.*288. — *arcticus Lin.*289. — *septentrionalis Lin.*

ALCER.

290. *Alca torda Lin.*

PICHE DI MARE.

291. *Mormon arcticus Illiger.*292. — *glacialis Leach.*

OCCE.

293. *Anser segetum Bechst.*294. — *albifrons Bechst.*

CIGNI.

295. *Cygnus musicus Bechst.*

ANATRE.

296. *Anas boschas Lin.*297. — *crecca Lin.*298. — *querquedula Lin.*299. — *penelope Lin.*300. — *strepera Gessner.* ⁽¹⁸⁾301. — *acota Lin.*302. — *clypeuta Lin.*303. — *tudorea Lin.* ⁽¹⁹⁾304. — *fusa Lin.*305. — *nigra Lin.*306. — *meria Pallav.* ⁽²⁰⁾307. — *clangula Lin.*308. — *foligula Lin.*309. — *marila Lin.*310. — *ferina Lin.*311. — *nyroen Gùldenst.* ⁽²¹⁾312. — *rufina Pallav.*

MERGHI.

313. *Mergus merganser Lin.*

314. *Mergus serrator* Lin.315. — *albellus* Lin.

PELICANI.

316. *Pelecanus onocrotalus* Lin.

CORMORANI.

317. *Carbo cormoranus* Meyer.318. — *graculus mediterraneus* Puy-
rau.

GARBANI.

319. *Larus marinus* Lin.320. — *fuscus* Lin.321. — *argentatus* Brunn.322. — *canus* Lin.323. — *tridaetylus* Lin.324. — *ridibundus* Lin.325. — *capistratus* Temm.326. — *gelastus* Lichtensl.327. — *melanocephalus* Natter.328. — *minutus* Pallas.

RONDINI DI MARE.

329. *Sterna caspia* Pallas.330. *Sterna cantiaca* Gmel.331. — *hirundo* Lin.332. — *macrura* Naumann.333. — *minuta* Lin.334. — *paradisus* Brünn.335. — *anglica* Montagn.336. — *leucoplera* Meissner.337. — *leucopareia* Natter.

PROCELLARIE.

338. *Puffinus cinereus* Temm.339. — *arcticus* Faber.340. — *obscurus* Boie.

UCCELLI DI TEMPESTA.

341. *Thalassidroma pelagica* Vigors.

STERCORARI.

342. *Lestris pomarina* Temm.343. — *parasita* Boie.

(*) Casale nel 1854.

(*) Non osando determinare le differenze che trovansi in alcune Aquile riferite fin' ora alla reale, io rimetto al giudizio della sezione Zoologica del nostro congresso, gli individui di parecchie Aquile, che per i loro caratteri mi paiono degni di particolare osservazione a bene stabilirne la specie.

(*) Noi abbiamo di frequente gli individui a macchie di questa specie, e rarissimi quelli di colore uniforme, forse perchè da noi non viaggiano che i giovani. Però lungo i boschi del Ticino, dove è la specie sedentaria, ebbi luogo a convincermi con molte spoglie avute dell' una e dell' altra piuma, non poter essere considerate sì fatte livree specie differenti.

(*) Casale il 4 settembre 1828.

- (¹) Casuale.
- (²) In poco numero sia sedentaria.
- (³) Sempre fu confusa da noi colla *hypoleis*; ma da molti anni io propoetevo a' rannuciatori di stindere le varie *Ficedulae* a questa affini, poichè io posso vi abbia ancora un'altra specie, che per mancanza di esatte notizie, non saprei a quale delle classificate dallo Schlegel debbasi riferire.
- (⁴) Non so come il sig. Schlegel nella sua rivista critica non abbia voluto ammettere questa specie riconosciuta dal Gould, e da Boiss. Essa è assai bene determinata e discernibile a prima vista, da non potersi confondere alla *Trochilus*: aoi tutti gli anni in primavera ed autunno la vediamo di passaggio ed annida su' nostri monti.
- (⁵) Rara in primavera, rarissima in autunno.
- (⁶) Tenuto dietro alle varie mute della presente specie, e della *Saxicola aurita*, si in abito di nozze, come nelle livree giovanile, ed autunnale, dovetti confermarci nell'idea della assoluta differenza che esiste tra di esse. Le uova poi tolgono ogni dubbio. Quello della *Stapaz*, di perfetto colore riletro chiaro, o a meglio esprimersi acqua di mare, è quasi rotondo: quello dell' *Anr.* invece è oblungo e bianco, con piccole rare macchie scure rossiccie sulla sommità acuta, ed un cerchio di simili macchie assai fitte alla estremità rotonda.
- (⁷) La sua minor dimensione lo fa distinguere facilmente dal *Muscus*. Egli ancora pure delle macchie scure alla pancia ed ai fianchi, e del giallo rossastro sotto le ali. Tenni vivo più mesi un individuo, ed il suo canto era pure diverso da quello del *Muscus*; nè mai fece sentire la frequente voce d'appello del *Zip.*: cantava di notte a quando a quando con rigolo molto soave.
- (⁸) Da molti anni non più vista.
- (⁹) Casuale nel dicembre 1844 a Savona. Un individuo affine a questa *Emb.* fu pure preso a Savona, ed altri a Genova, i quali penso di sottoporre al giudizio degli Scienziati, perchè mi sia consentita una nuova specie, che io diviso di dedicare al valente autore della rivista critica degli Uccelli d'Europa, sig. Schlegel. Nè posso convenire col principe di Canino, che tali individui sieno giovani, o femmine della *Pithyornus*. Ho confrontati coo essa gli individui medesimi, e tranne la macchia bianca su la nuca, essi differiscono primieramente per la dimensione assai più piccola, pel becco sottile e conico, poi per linea bianca che passa al disopra degli occhi, ed altra, che dall'angolo del becco va alla regione del collo: la gola è bianca sparsa di rare macchie scure, e solcata da linea nera assai marrata, che parte dal disotto del becco: il petto e i fianchi cinti di macchie rossastre, le parti inferiori d'oro bianco perfetto; e le superiori pure sono rossastre, variate di nere macchie longitudinali: due bande bianche traversano le estremità delle piccole copritrici: i piedi sono chiaro carminini.
- (¹⁰) Lunghezza totale dal becco all'estremità della coda, cinque pollici e sei linee; la *Schaniusculus* invece sei pollici, e due linee. Sospetto che questa specie sia stata descritta dal Brehm, e forse non ricevuta per la troppa sua facilità nel creare specie nuove. Questa però non gli si può rifiutare, poichè la sua piccolezza, la mancanza del arco alla testa ed alla gola, la lunghezza delle gambe, maggiore in questa di quella, ed il colore delle stesse in corneo chiaro, quando nella *Schaniusculus* sono nerastre, non lasciano esitare di ammetterla definitivamente. Il suo passaggio aoi è costante, ma negli inverni freddi e sempre in dicembre.

(15) Il sig. Schlegel ci fa conoscere definitivamente questa *Emab.* che Buonap. diede per nuova specie, *nomadola Durazzii*; abbenchè fosse diversa la mia opinione, convinto che questo gentile uccelletto dovea essere riportato alla *Lesbia* del Buffon. Era difficil a riconoscersi i caratteri che Buonap. di essa diede nella tav. della Faun. (fasc. xxvi), per esserne state errate le proporzioni del corpo, la forma del becco, esagerati i colori e male espresse le macchie del petto. Se il sig. Schlegel avesse avuto per avventura il nostro primo catalogo, quantunque rozza vi sia stata figurata, pure di leggieri vi avrebbe riconosciuto questa specie, poichè più precisi erano i caratteri ivi espressi, quanto lo consentì la mediocre litografia. Questa *Emab.* fu predata più volte in Genova, Savona e Nizza, ov'è conosciuta dai cacciatori pel suo passaggio in piccolissimi voli, e mai in compagnia d'altre del suo genere, sempre nel mese di dicembre. Un individuo avuto dall'abate Marietti di Milano, fu predato nella Svizzera, l'altro presentato al Congresso Milanese dal sig. Lanfossi sotto il suo vero nome di *Puilla*, fu preso nel Bresciano, e quello descritto dallo Schlegel presso di Leida. Da ciò si rileva che questa specie ancor rara nelle collezioni dilata assai la sua corso, e che ricerche accurate, ora che è ben conosciuta, la faranno rinvenire in molti altri luoghi.

(16) Accidentale nella contea di Nizza.

(17) Casuale in occasione di qualche uragano.

(18) In primavera piuttosto rara.

(19) Casuale.

(20) Accidentale.

(21) In alcuni anni fu abundantissima, ora è assai rara.



PLATE 11



Turdus migratorius (L.)
M. L. S. 1911



C.

1.
2.
3.



3. *Empidonax traillii* *Empidonax traillii*

MAMMIFERI

Noi possediamo la maggior parte delle specie proprie all'Italia boreale, sebbene manchino tra noi quelle veramente alpine, quali sono lo Stambecco, l'Orso, la Marmotta, come pure alcune altre della famiglia dei Muridi particolari alla Lombardia. L'unica che presenti un qualche pericolo è il Lupo, il quale però suol essere raro, e confinato negli alti boschi dell'Apennino, dai quali discende raramente nel verno. Assisi sulle sponde del Mediterraneo percorrono il nostro mare due specie di Foche, e tre di Cetacci.

Carnivori. — *Canis lupus*, L., volg. Lupo.

Vulpes vulgaris, Br., volg. Vurpe.

— *melanogastra*, Bp., volg. Vurpe.

Lynx vulgaris, Boitard., volg. Lince. Da dodici anni circa compare la Lince nelle alte valli delle Alpi marittime.

Lutra vulgaris, Erxleb., volg. Lùdria.

Mustela vulgaris, Br., volg. Bellua.

Putorius vulgaris, Cuv., volg. Gatto-spuzzo, raro.

Martes vulgaris, Gray., volg. Martua.

— *foina*, Bell., volg. Fuin.

Meles taxus, Schreb., volg. Tascio.

- Pinnipedi.** — *Phoca vitulina*, L., volg. Vitello mariu.
Pelagia monachus, Cuv., volg. Vitello marin.
- Ruminanti.** — *Rupicapra capretta*, Bp., volg. Camüscio. Nelle alte montagne delle Alpi marittime, riviera di Ponente.
- Chiroterri.** — *Dysopes Cestoni*, Bp., volg. Ratto-penügo, raro.
Plecotus auritus, Bp., volg. Ratto-penügo.
Myotis murinus, Gray., volg. Ratto-penügo.
— *Daubentoni*, Bp., volg. Ratto-penügo.
Vespertilio serotinus, Daubent., volg. Ratto-penügo.
Rhinolophus ferrum equinum, Leach., volg. Ratto-penügo.
- Insettivori.** — *Talpa caeca*, Savi, volg. Tarpa, topa.
— *europæa*, L., volg. Tarpa, topa.
Sorex araneus, L., volg. Mûsangan.
Crossopus ciliatus, Wagl., volg. Ratto d'ægua.
Erinaceus Europæus, L., volg. Risscu.
- Rosicanti.** — *Sciurus vulgaris*, L., volg. Sciurnua, Viuvéra o Vivéra.
Sciurus italicus, Bp., volg. Sciurnua, Viuvéra o Vivéra.
Mus decumanus, Pall., volg. Ratto de cuniggio.
— *musculus*, L., volg. Ratto de casa.
— *sylvaticus*, L., volg. Ratto de campagna.
Myoxus glis, Schreb., volg. Gi.
— *nitela*, Schreb., volg. Gi, rarissimo.
— *avellanarius*, Desm., volg. Nissuin.
- Arvicola** Savi, Selys.
- Lepus timidus*, L., volg. Levre.
— *variabilis*, Pall., volg. Levre gianca. Nelle alte montagne, riviera di Ponente.
— *cuniculus*, L., volg. Cuniggio. Abita selvaggio nell'isola Gallinaria presso Albenga, dove si è scavato numerosi covili.
- Cetacci.** — *Delphinus delphis*, L., volg. Delfin.
Physeter macrocephalus, L., volg. cao d'euggia, cua d'euggio.
Balenoptera musculus, Cuv., volg. Balenka.





